

Die Cestoden der Vögel.

Von

Dr. O. Fuhrmann in Neuchâtel.

I. Allgemeiner Teil.

Bei keiner Wirbeltiergruppe finden wir eine so reichhaltige und zahlreiche Cestoden-Fauna wie in der Klasse der Vögel. Der Umstand, daß die so zahlreichen Arten nur dem Äußern nach und meist sehr mangelhaft beschrieben waren, veranlaßte mich vor 11 Jahren, mich speziell mit den Taenien der Vögel zu beschäftigen.

Die nachfolgenden Zeilen sind eine Zusammenfassung elfjähriger Untersuchungen und sind nicht etwa, wie es vielleicht den Anschein haben könnte, eine einfache Zusammenstellung der Literatur — eine neue Auflage eines Kapitels des den Helminthologen so wertvollen Compendiums der Helminthologie von O. von LINSTOW. Es enthält die Arbeit vor allem das systematische und faunistische Resultat der Untersuchung eines riesigen Materials, wie es bis jetzt wohl kaum in den Händen eines einzelnen Helminthologen war. Diese auf so breiter Basis ausgeführte Untersuchung war natürlich nur dadurch möglich, daß die Herren Direktoren der Museen mir mit sehr großer Zuvorkommenheit die zahlreichen Typen und oft sehr reichen, größtenteils unbestimmten Sammlungen von Vogelcestoden ihrer Museen zur Bearbeitung übersandten.

Es wurden untersucht vor allem die sehr großen und wichtigen helminthologischen Sammlungen des k. k. Hofmuseums in Wien, des Museums für Naturkunde von Berlin, dann die ziemlich bedeutenden Sammlungen des Museo civico di Storia naturale von Genua, der Museen von München, Stuttgart, Greifswald, Hamburg, Kopenhagen, Genf, Toulouse, Paris und London.

Von Privatsammlungen erhielt ich zur Untersuchung die reiche Cestoden-Sammlung von Herrn Prof. LOOSS aus Cairo, die auf einer Expedition nach dem weißen Nil gesammelten Materialien von Prof. L. A. JÄGERSKIÖLD (Upsala), außerdem die Cestoden-Sammlung meines Freundes Dr. K. WOLFFHÜGEL, sowie Vogeltaenien von den Herren Dr. W. CLERC, Prof. KRABBE, Prof. LÖNNBERG, Dr. LUTZ (San Paolo), Prof. SHIPLEY, Prof. STUDER und meinem leider so früh verstorbenen Freunde Dr. W. VOLZ.

Den Herren Direktoren der Museen sowie den obengenannten Zoologen meinen verbindlichsten Dank für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen und ihre wertvolle Unterstützung.

Die ersten brauchbaren Kenntnisse über Vogelcestoden finden wir in den für ihre Zeit trefflichen Arbeiten von BLOCH (1782) und von Pastor GOEZE (1782). Der letztere Autor beschrieb bereits eingehend 14 Arten von Taenien dieser Vertebraten-Gruppe. Im Jahre 1819 gab dann der Vater der Helminthologie C. A. RUDOLPHI seine *Entozoorum Synopsis* heraus, nachdem er bereits 1809 eine große Arbeit über die Naturgeschichte der parasitischen Würmer veröffentlicht hatte. Erstere Arbeit enthält eine gründliche Zusammenstellung des bis dahin über die Helminthen Bekannten, und RUDOLPHI charakterisiert in dieser Arbeit 54 sichere und erwähnt 30 unsichere Vogeltaenien-Arten, von welchen die meisten von ihm selbst aufgestellt wurden. 31 Jahre später gab dann C. M. DIESING in seinem *Systema Helminthum* eine neue Zusammenstellung des über die Helminthen Bekannten. In der Zwischenzeit von 1819 bis 1850 waren zahlreiche Forscher tätig gewesen, unsere Kenntnisse über die Parasiten zu vermehren, so daß wir eine bedeutende Vermehrung der Arten auch für die Vogelcestoden konstatieren können. DIESING charakterisiert die Arten und gibt die Synonymie und Literatur von 81 sichern und 28 fraglichen Taenien der Vögel an. Im Jahre 1878 und dann in einem Nachtrag 1889 gab O. v. LINSTOW in seinem *Compendium der Helminthologie* ein neues Verzeichnis der bekannten Helminthen, die im tierischen Körper leben, angeordnet nach ihren Wohntieren, unter Angabe der Organe, in denen sie gefunden wurden. Es ist dies eine neue vervollständigte Auflage des letzten Kapitels des *Systema Helminthum* von C. M. DIESING. Wir finden in der Arbeit von v. LINSTOW ca. 230 Vogelcestoden-Arten aus etwa 340 Vogelspecies angegeben.

Viele der von diesem Autor angeführten Taenien-Arten müssen

auf Grund unserer Untersuchungen als Synonyme eingezogen, andere wegen mangelnder Beschreibung für immer ausgeschieden werden. Trotzdem ist die Zahl der heute bekannten Vogelcestoden auf ca. 500 angestiegen, und die Zahl der Vögel, aus welchen Cestoden bekannt, hat sich namentlich durch die Untersuchung der reichen Materialien, welche mir zur Verfügung gestellt wurden, um etwa 200 Arten vermehrt. Es ist deshalb angezeigt, eine neue, gründlich revidierte Zusammenstellung der systematischen und faunistischen Kenntnisse über die Vogelcestoden zu geben, dies um so mehr, als bis vor kurzem noch sämtliche Taenien der Vögel unter dem Gattungsnamen *Taenia* figurierten. Nun sind aber seit einigen Jahren von verschiedenen Autoren alte und neue Arten (unsere Untersuchungen ausgeschlossen, etwa 150 Species) in zahlreichen Genera untergebracht worden. Unsere elfjährigen Untersuchungen haben uns erlaubt, fast alle übrigen Vogelcestoden (ca. 300), mit Ausnahme von 50 ungenügend bekannten Arten, in 50 verschiedenen Genera unterzubringen, so daß jetzt fast sämtliche Vogeltaenien eine bestimmte, gut charakterisierte Stellung im System besitzen.

Da die Zahl der Vogelarten etwa 12000 beträgt und erst aus etwa 540 Vögeln Cestoden bekannt sind, steht zu erwarten, daß noch eine sehr große Zahl von neuen Species gefunden werden wird, um so mehr als die Avifauna der außereuropäischen Erdteile, mit Ausnahme von Südamerika, woselbst OLFERS und NATTERER sehr eifrig gesammelt haben, helminthologisch noch sehr wenig untersucht ist.

Betrachtet man die Verteilung der zahlreichen Taenien-Arten in den verschiedenen Vogelgruppen, so beobachtet man die sehr charakteristische Erscheinung, daß eine bestimmte Art immer nur in einer bestimmten Vogelgruppe vorkommt und so für dieselbe typisch ist. Dieser Umstand erleichtert natürlich die Bestimmung der Taenien der Vögel bedeutend und ist der Grund, daß auch die älteren Autoren, trotzdem die Beschreibung der Arten eine höchst mangelhafte war, dieselben meist richtig bestimmen konnten. Man findet allerdings in den helminthologischen Sammlungen sehr häufig eine Benennung, sogar von Spezialisten bestimmter Arten, welche zeigt, daß man sich auf die Spezialisierung des Wohnortes etwas zu sehr verlassen und namentlich aber zu wenig im Auge behielt.

wie wenig vollständig unsere Kenntnisse der Parasitenfauna der Vögel ist.

Wir treffen andererseits in der Literatur zahlreiche Fälle, wo der Zoologe, auf mangelhafte Artbeschreibungen allein sich stützend, aus einer Vogelgruppe Arten signalisiert hat, welche für eine andere Vogelgruppe charakteristisch sind. Diese Fälle, weil sie von gewisser Bedeutung, indem sie unserer Erfahrung und dem von uns oben aufgestellten Satze der Spezialisierung des Wohnorts widersprechen, sollen hier kurz besprochen werden. Dabei sollen nur diejenigen erwähnt und einer Kritik unterzogen werden, welche in der neuern Literatur, in v. LINSTOW'S Compendium der Helminthologie und später, zitiert wurden, und zwar deshalb, weil die ganz alten diesbezüglichen Angaben ganz wertlos sind.

Zunächst sei zweier Fälle Erwähnung getan, in welchen ein Säugetiercestode in einem Vogel und umgekehrt eine Vogeltaenie beim Menschen beobachtet wurde.

Es berichtet LEONARDI 1898 von einem Fall von *Taenia medio-canellata* in *Himantopus candidus*, den dann aber TAROZZI 1899 dahin berichtigte, daß er zeigte, daß die vermeintliche Menschentaenie eine typische Taenie des betreffenden Vogels, nämlich *Acoleus vaginatus*, war. Wie man diese beiden Arten verwechseln kann, ist mir allerdings unerklärlich.

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei *Hymenolepis lanceolata* der Gans, welche von ZSCHOKKE (1902) als Parasit des *Homo sapiens* beschrieben wurde. Dieser höchst eigentümliche Befund hätte es sehr wünschenswert gemacht, über die nähern Umstände des Fundes ganz genaue Angaben zu besitzen, die aber leider nicht gegeben wurden. Meiner Ansicht nach beruht dieser Befund auf einem Irrtum, denn es scheint mir, wie alle bis jetzt bekannten faunistischen Tatsachen beweisen, unmöglich, daß eine Vogelcestoden-Larve sich im Menschen entwickeln kann. *Hymenolepis lanceolata* kommt in Entenvögeln vor und ist daselbst nur in ganz wenigen Arten gefunden worden. Bei seinem Vorkommen in Lamellirostres ist auffallend, daß diese Art sehr häufig in der Gans, nie in *Anas boschas* (nur NITSCH zitiert einen mir fraglich scheinenden Fall) gefunden wurde, obwohl diese beiden Haustiere unter ganz gleichen Bedingungen leben und sich sehr ähnlich ernähren. Die in Crustaceen lebende Larve verlangt also ganz bestimmte Entwicklungsbedingungen, welche gewiß nicht in der Gans und im Menschen dieselben sind.

ZSCHOKKE stützt die Möglichkeit seines Befundes auf die Be-

hauptung, daß „im Laufe der letzten Jahre eine Reihe von Taenien, die man typisch für Säuger ansah, in Vögeln und umgekehrt Vogelcestoden in Säugetieren entdeckt worden“. Diese Behauptung ist ungenau; richtig ist nur, daß wir dieselben Cestoden-Genera in Vögeln und Säugetieren antreffen können, aber kein einziger Fall ist bekannt, wo eine bestimmte Art zugleich in einem Vogel und einem Säugetier vorkam. Ersteres ist keineswegs verwunderlich, letzteres aber wäre um so mehr unwahrscheinlich, als wir, wie wir sehen werden, nicht einmal unter den Cestoden der Vögel sichere Fälle kennen, wo eine bestimmte Art in zwei oder mehreren verschiedenen, systematisch scharf getrennten Vogelgruppen vorkommt.

Die diesbezüglichen in der Literatur zitierten Fälle sind, wie schon oben gesagt, zwar ziemlich zahlreich, sie sollen hier kurz besprochen werden, zum Teil auf Grund eigener Kontrolle der betreffenden Fälle.

1. *Tetrabothrius cylindraceus* RUD. wurde in *Larus* und *Uria troile* gefunden. Da die *Laridae* und *Alcidae* jetzt als *Lariformes* zusammengestellt werden, hat dieser Befund nichts Auffallendes, wie es anfangs scheinen könnte.

2. Anders steht es mit dem Falle von *Tetrabothrius macrocephalus* RUD., welcher typisch ist für *Podicipediformes*, aber auch in *Rhyacophilus glareola*, *Larus tridactylus* und *Uria troile* gefunden worden sein soll. Aus *Charadriiformes* kennen wir keine *Tetrabothrius*-Art, mit welcher eine Verwechslung vorliegen könnte, und die von COBBOLD stammende Angabe seines Vorkommens in *Rhyacophilus* kann wohl sicher als falsche Bestimmung taxiert werden, denn auch andere Arten von Vogeltaenien dieses Autors sind sicher ganz falsch bestimmt, wie aus den Zeichnungen des Autors ersichtlich. Was nun das Vorkommen in *Lariformes* (*Larus* und *Uria*) anbetrifft, so kann es sich sehr wohl um eine Verwechslung mit *T. erostris* LÖNNBERG handeln, welche wie *T. macrocephalus* stark entwickelte Öhrchen an den Saugnäpfen hat.

Diese meine Vermutung hat sich vollkommen bestätigt, indem die Nachuntersuchung des Materials von *Tetrabothrius macrocephalus* aus *Larus* gezeigt hat, daß der betreffende Cestode *T. erostris* LÖNNBERG war.

3. *Tetrabothrius porrigens* MOLIN wurde in *Nyctiardea nycticorax* gefunden und soll nach STOSSICH auch in *Larus* vorkommen; seine

kurze Beschreibung scheint aber zu zeigen, daß es sich um junge Exemplare von *T. cylindraceus* oder *T. erostris* handelt.

4. Interessant ist das von mir konstatierte Vorkommen von *Davainea struthionis* in *Struthio* und *Rhea* bei Materialien, welche aus dem Museum für Naturkunde in Berlin stammen. Auf meine Anfrage bei Herrn Dr. A. COLLIN, dem Vorsteher der helminthologischen Sammlung, schreibt mir derselbe, daß die *Davainea struthionis* in einer *Rhea americana* gefunden wurde, welche von OLFERS und SELLO (ca. 1821) wohl sicher wild erlegt wurden. Fassen wir *Struthio* und *Rhea* nur als Familien ein und derselben Vogelordnung auf, so spricht der obige Fund nicht gegen die aufgestellte Behauptung, daß bestimmte Taenien-Arten immer nur in einer Vogelgruppe vorkommen. Anders aber liegen die Verhältnisse, wenn wir *Rhea* und *Struthio*, wie gewisse Vogelsystematiker, als die Vertreter verschiedener Ordnungen auffassen. Dazu kommt noch als interessante Tatsache, falls obiger Fund seine Richtigkeit hat, daß *Rhea* und *Struthio* geographisch scharf voneinander getrennt sind.

5. *Davainea cesticillus* (MOLIN) aus *Gallus* wird von v. LINSTOW auch aus *Houbara undulata* erwähnt; die Einsicht in das betreffende Material, das sich im Museum von Stuttgart findet, hat gezeigt, daß es sich um *Idiogenes otidis* KRABBE handelt.

6. *Davainea crassula* (RUD.), eine Tauben-*Davainea*, soll auch in *Anas boschas*, ja sogar in *Psittacus* vorkommen; da man *D. crassula* aber nur den Haken nach kannte (KRABBE, 1869), so haben diese Bestimmungen bei der großen Ähnlichkeit der *Davainea*-Haken keine Bedeutung.

7. *Taenia filiformis* RUD., welche eigentlich *T. longissima* GOEZE zu nennen, wurde in einem Papagei gefunden und ist sehr unvollständig beschrieben worden, so daß dieselbe zu den Species inquirendae gehört. Diese Art soll nun nach einem spätern Autor auch in *Gallirex* vorkommen, eine Angabe, die natürlich ganz wertlos, da weder der Typus noch eine richtige Beschreibung existiert.

8. Aus *Oriolus galbula* L. wurde die für Spechte typische *Davainea frontina* (DUJ.) signalisiert; Untersuchung des diesbezüglichen Materials hat aber gezeigt, daß es sich um *Davainea compacta* CLERC handelt.

9. *Monopylidium infundibuliforme* (GOEZE) oder richtiger *M. infundibulum* (BLOCH), welche typisch ist für gewisse Galliformes, ist auch in *Anas boschas*, *Goura*, *Columba livia* dom. und sogar in *Fringilla domestica* gefunden worden. Diese Angaben stammen von

BELLINGHAM 1844 und MEGNIN 1881 und sind absolut wertlos, da die Bestimmungen dieser Autoren durchaus unzuverlässig sind.

10. Die Angabe, daß *Monopylidium crateriforme* (GOEZE) außer in *Picus* auch in *Merops* und *Upupa* vorkommt, stammt von BREMSER und DIESING und ist wohl unzutreffend.

11. *Anonchotaenia* (*Amerina*) *longiovata* FUHRMANN soll nach unsern Angaben in *Passeriformes* und in *Plegadis* vorkommen; ich glaube aber, daß hier vielleicht eine Etikettenverwechslung vor sich gegangen, und es ist deshalb hinter *Plegadis* als Wirt für obige Taenie ein Fragezeichen zu setzen, das in der betreffenden Arbeit (1901 c) aus Versehen vergessen wurde. Die Arten des Genus *Anonchotaenia* sind äußerlich und anatomisch so ähnlich, daß es auch möglich ist, daß es sich um 2 naheverwandte Arten handelt, was aber wegen Mangel an Material nicht eruiert werden konnte.

12. *Hymenolepis lanceolata*, welche in mehreren *Anseriformes* ein charakteristischer Parasit ist, soll auch in *Podiceps* und *Phoenicopterus* vorkommen. Wie ich am Originalmaterial nachweisen konnte, ist die *H. lanceolata* aus *Podiceps* nichts anderes als der interessante getrenntgeschlechtliche Cestode *Dioicocestus aspera* (MEHLIS), mit welchem *H. lanceolata* äußerlich große Ähnlichkeit hat, während die *H. lanceolata* aus *Phoenicopterus* identisch ist mit *Amabilia lamelligera* (OWEN). Vielfach werden zwar die *Phoenicopteri* zu den *Lamellirostres* gestellt; dann wäre das Vorkommen von *H. lanceolata*, wenn der Wirklichkeit entsprechend, hier nicht zu erwähnen. Diese systematische Stellung ist aber nicht den Tatsachen entsprechend, denn diese Vogelgruppe gehört eher in die Nähe der *Ciconiiformes* und zeigt übrigens eine ihr ganz eigene Cestoden-Fauna.

13. *Hymenolepis anatina* und *Diorchis acuminata* sind beide von CLERC 1903 in *Anseriformes* und in einer *Fulica atra* gefunden worden. Der Umstand, daß in gleichen *Ralliformes* 2 Taenien-Arten, von welchen namentlich die erstere ein sehr verbreiteter typischer Entenvogelcestode ist, konstatiert wurden, macht es mir nicht unwahrscheinlich, daß hier eine falsche Etikettierung oder eine Etikettenverwechslung vorliegt, was bei den oft schwierigen Verhältnissen, unter welchen der Autor seine reiche Vogelcestodensammlung anlegte, nicht ausgeschlossen zu sein scheint.

14. *Hymenolepis tenuirostris* RUD. ist ein Cestode der *Anseriformes*, soll aber auch in *Larus tridactylus* einmal gefunden worden sein. Dieser Befund stammt, wie der von *Tetrabothis macropcephalus* RUD. aus eben demselben Vogel, von v. MARENZELLER (s. COMINI,

1887), welcher die Würmer der internationalen Polarfahrt 1882/83 bearbeitete. Daß zugleich in derselben *Larus*-Art 2 Cestoden von andern Vogelgruppen gefunden wurden, erlaubte die Richtigkeit der Bestimmung anzuzweifeln, und es hat auch die Untersuchung des betreffenden Materials, das ich der Güte des Herrn Prof. v. MARENZELLER verdanke, gezeigt, daß *H. tenuirostris* nichts anderes als *Anomotaenia micracantha* (KRABBE), während *T. macrocephalus*, wie schon oben bemerkt, *T. erostris* ist.

15. *Hymenolepis microsoma* CREPLIN, welche sonst im Anseriformes vorkommt, ist nach KRABBE (1869, p. 298) von PAFF u. ORLICK auch in *Larus glaucus* aufgefunden worden. Diese Bestimmung beruht auf Beobachtung der Haken, welche nach KRABBE 0,035—0,061 mm lang sind. Diese große Variabilität in der Länge sowie die ebenso bedeutende Variabilität der Form, welche aus den minutiösen Hakenzeichnungen der trefflichen und unentbehrlichen Arbeit KRABBE'S hervorgeht, macht es mir wahrscheinlich, daß wir es nicht mit 1, sondern mit 2 verschiedenen Arten zu tun haben. Die anatomische Untersuchung würde hier Aufklärung verschaffen.

16. *Hymenolepis villosa* (BLOCH) ist eine überaus typische Taenie, welche häufig in Otidiformes gefunden wurde, sie wird aber ebenfalls aus *Tetraogallus* signalisiert, und ich hatte selbst einmal Material in Händen, welches aus *Gallus* stammte (Museum Berlin) und mit *H. villosa* identisch schien. Leider war das Material nicht besonders gut erhalten. CLERC 1906a, der die Art genauer untersucht hat, findet zwei Formen; bei der einen ist der Uterus ein transversaler Schlauch, der häufig seitlich angeschwollen und nach hinten umgebogen, während in der zweiten Form, welche aus meiner Sammlung stammt und unbekannter Herkunft ist, der Uterus ziemlich stark verzweigt und zugleich seitlich nach vorn umgebogen (s. CLERC, fig. 15 u. 16). CLERC glaubt, daß diese verschiedene Biegung des Uterus durch verschiedene Streckung der Proglottis zustande gekommen, doch zeigt ein Vergleich der beiden Figuren, daß bei beiden Cestoden die Länge der Proglottis dieselbe ist, also beide den gleichen Kontraktionszustand zeigen. CLERC gibt an, daß das Material, das ich ihm zur Einsicht gab, aus Afrika stammt, dies ist, wie eine Nachfrage ergab, nicht richtig; ebenso ist der Name des Wirtes dieses Materials nicht bekannt, so daß es nicht unmöglich, daß der betreffende Cestode aus einem Vertreter der Galliformes stammt und hier also vielleicht 2 verschiedene Arten vorliegen. Die mir zur Verfügung stehenden, wegen des mangel-

haften Erhaltungszustandes nicht sehr guten Präparate von *H. villosa* aus dem Huhn zeigen, wenn auch nicht deutlich, eine ähnliche Biegung des Uterus, wie sie CLERC in fig. 16 (s. oben) zeichnet. Es bedarf aber neuen Materials, und namentlich auch der Untersuchung der Haken, um zu entscheiden, ob wir es mit 1 oder 2 verschiedenen äußerlich ähnlichen Arten zu tun haben. Die *H. villosa* aus *Tetraogallus* ist wohl eine besondere Art, da die Haken nach KRABBE nur 0,011 statt 0,024—0,026 mm lang sind.

17. *Hymenolepis serpentulus* (SCHRANK) ist ein typischer Cestode der *Corvidae*, soll aber auch nach v. LINSTOW in *Dendrocopus major*, einem Specht, vorkommen. Nach FÜRBRINGER gehören die Pici mit den Passeres in die Gruppe der Pico-Passeriformes. Der FÜRBRINGER'schen Klassifikation der Vögel folgend, hätte die Angabe des Vorkommens von *H. serpentulus* in einem *Picus* nichts Besonderes, doch ist die ganze Cestoden-Fauna dieser Vögel total verschieden von derjenigen der Passeriformes. Sehen wir uns die Zeichnung der Haken an, die v. LINSTOW von der betreffenden *H. serpentulus* gibt, so bemerken wir, daß sie eine andere Form haben als die typischen Haken obiger Taenie, indem der Hakenteil bei der v. LINSTOW'schen Form ziemlich bedeutend kürzer, d. h. gleichlang wie der vordere Hebelarm, ist. Es kann sich also hier sehr wohl um eine andere Art handeln. Die Angabe, daß derselbe Cestode auch in *Dendrocopus leuconotus* vorkommt, wird wohl auf demselben Irrtum beruhen.

18. *Aploparaksis filum*, ein häufiger Parasit zahlreicher Charadriiformes, ist von LÖNNBERG auch aus *Polyborus tharus* (Accipitres) erwähnt worden, doch handelt es sich wohl hier um einen mit dem Wirt gefressenen Cestoden des Raubvogels. Derartige Fälle sind mehrere bekannt; so hat man *Hym. fringillarum*, *T. undulata* usw. in verschiedenen Raubvögeln gefunden.

19. *Ophryocotyle proteus* FRIIS wird von LÖNNBERG (1890) außer aus *Tringa* und *Charadrius* auch aus *Larus canus* erwähnt. Wie weit diese Angabe richtig, läßt sich bei der mangelhaften Kenntnis dieser Formen nicht beurteilen, übrigens ist dies nicht unmöglich und unserer Behauptung nicht widersprechend, da Lari und Charadrii zusammengehören und nach der neuern Systematik die Gruppe der Charadriiformes bilden.

20. *Fimbriaria fasciolaris* (PALLAS) ist in Entenvögeln gefunden worden, soll aber auch nach CREPLIN und MOLIN im Huhne vorkommen. Die diesbezüglichen Angaben scheinen auch WOLFFHÜGEL

1900 etwas wunderbar, auf jeden Fall liegt kein Beweis für die Richtigkeit dieser alten Beobachtung vor.

21. Die Angaben von *Biuterina trapezoides* FUHRMANN aus *Caprimulgus* sp. und von *Biuterina longiceps* (RUD.) aus *Cairina moschata* sind wohl auf Etikettenverwechslung zurückzuführen.

Dies wären alle Fälle, in welchen eine Cestoden-Art zwei verschiedene Vogelgruppen bewohnt. Bei fast allen haben wir wahrscheinlich machen oder sicher nachweisen können, daß es sich um einen Irrtum handelt. Der Umstand, das alle diese Ausnahmefälle (mit Ausnahme von *H. villosa*) nur in der Einzahl beobachtet wurden, scheint mir unsere Annahme von der Unrichtigkeit der Bestimmung der betreffenden Cestoden noch zu bestätigen.

Ebenfalls für unsere Behauptung der scharfen Trennung der Taenien-Fauna der einzelnen Vogelgruppen spricht der Umstand, daß in dem sehr großen Material, daß ich dank dem Entgegenkommen der Museen erhielt, mir nicht ein sicherer Fall vorgekommen ist, der für die Unrichtigkeit des von mir aufgestellten Satzes spräche. Nur zwei Befunde schienen dagegen zu sprechen: ich fand nämlich einmal in zwei Gläsern, das eine mit *Gallus*, das andere mit *Struthio* (Süd-Afrika) etikettiert, im erstern *Triaenophorus nodulosus*, im zweiten *Hymenolepis villosa*. Genaue Erkundigungen ergaben, daß es sich im ersten Falle um eine Etikettenverwechslung handelte; im zweiten Falle zeigte der Zettel, der im Glase lag, daß Cestoden unbekannter Herkunft und aus unbekanntem Wirte vorlagen.

Um derartige Verwechslungen wird es sich wohl auch in einigen der oben zitierten Fälle handeln, da das von einem Helminthologen untersuchte Material meist nicht von ihm selbst gesammelt ist.

Nur der Fall von *H. villosa*, die in Oditiformes und auch in Galliformes gefunden worden, scheint wirklich zu bestehen, wenn nicht, wie wir oben näher auseinandersetzen, vielleicht auch hier 2 verschiedene Arten vorliegen.

Es kann also der Satz gelten: Die verschiedenen Arten von Vogeltaenien bewohnen immer nur 1 der 26 von uns unterschiedenen Vogelgruppen.

Könnte man alle Angaben der Autoren auf ihre Richtigkeit prüfen, so würde sich wohl ergeben, daß die meisten Arten sich in bezug auf den Wohnort noch viel weiter spezialisieren. Zur Bestätigung dieser Behauptung können bereits jetzt sehr zahlreiche Tatsachen angeführt werden; sie sind aus dem faunistischen Teil leicht zu ersehen.

Allgemeine Bemerkungen über die Cestoden der verschiedenen Vogelgruppen.

Ich glaube, daß es von einem gewissen Interesse für die Übersicht über den heutigen Stand unserer Kenntnisse und auch für die in weiterer Zukunft in Aussicht stehende Bereicherung an Vogelcestoden-Arten ist, eine tabellarische Zusammenstellung zu geben, welche für jede Vogelgruppe angibt, in wieviel Vogelarten Cestoden gefunden und wieviel Cestoden-Species bis jetzt in den betreffenden Vogelgruppen konstatiert wurden.

Vogelgruppen	Zahl der Arten der Vogelgruppe ca.	Zahl der Arten, in welchen Taenien gefunden wurden	Zahl der Taenien- arten, welche in den unter- suchten Vögeln gefunden wurden
Struthioniformes	3	2	1
Rheiformes	3	1	3
Casuariformes	13	1	2
Apterygiformes	6	2	3
Crypturiformes	65	6	5
Galliformes	350	22	43
Ralliformes	190	4	5
Gruiformes	30	2	3
Otidiformes	30	3	5
Charadriiformes	260	82	86
Lari	150	25	22
Columbiformes	420	19	18
Podicipediformes	45	9	16
Procellariiformes	120	14	7
Aptenodytiformes	18	3	4
Steganopodes	68	7	3
Ciconiiformes	150	27	32
Phoenicopter	6	1	5
Accipitres	400	36	15
Anseriformes	200	52	71
Psittaciformes	440	22	10
Coccygiformes	300	9	8
Coraciiformes	450	24	19
Strigiformes	200	9	3
Pici	500	18	13
Passeriformes	7800	144	93
	<u>12000</u>	<u>544</u>	<u>495</u>

Nach dieser Zusammenstellung, welche uns namentlich vor Augen führt, wie unvollständig noch unsere Kenntnisse der Cestoden-Fauna der Vögel ist, wollen wir kurz die Taenien-Fauna der einzelnen Vogelgruppen betrachten, um zu sehen, ob sich dieselben nicht mehr oder weniger durch ihre Cestoden-Fauna charakterisieren lassen.

Aus der Gruppe der Ratitae, welche die Struthioniformes, Rheiformes, Casuariformes und Apterygiformes umfaßt, kennen wir namentlich Vertreter (5 Arten) der *Davaineinae*, und nur in den Apterygiformes wurden 3 Arten gefunden, welche andern Genera angehören.

Die gleiche Eigentümlichkeit der Zusammenstellung der Taenien-Fauna treffen wir bei den Crypturiformes, wo von 5 Cestoden-Arten 4 Davaineen sind.

Auch in der großen Gruppe der Galliformes haben wir neben 1 Anoplocephaliden und einigen *Dilepididae* eine sehr große Zahl von *Davaineinae* (23 Arten) und diesen durch die eigentümlichen Uterusverhältnisse naheverwandte Taenien-Arten.

Diese 6 alten Vogelgruppen zeigen im Gegensatz zu allen übrigen ein bedeutendes Vorwiegen der *Davaineinae*, unter welchen ich die Vertreter der Genera *Ophryocotyle* und *Davainea*, namentlich auf Grund des Baues ihres Scolex, als eine der ältesten Vogelcestoden-Gruppen auffasse. Diese Auffassung findet, wie wir eben gesehen, eine Stütze im Wohnorte dieser Cestoden.

Die Ralliformes, Gruiformes und Otidiformes werden bei GADOW zusammengefaßt unter dem Ordnungsnamen Gruiformes, da aber jede der obigen Gruppen ihre ganz besondere Cestoden-Fauna beherbergt, habe ich die Gruppen getrennt aufgeführt. Sie haben wohl hauptsächlich infolge der geringen Zahl der untersuchten Vertreter nur ganz wenige Cestoden, und diese zeigen nichts besonders Charakteristisches.

Ganz unvollständig sind unsere Kenntnisse der Parasitenfauna der Ralliformes, indem von 190 Arten nur in 4 Cestoden gefunden wurden, unter welchen, was mir auffallend scheint, kein Vertreter der *Davaineinae* sich findet, obwohl diese Vogelgruppe alt sein soll.

Bei den Gruiformes sind nur 2 Arten, aus welchen Taenien bekannt wurden. Zwei derselben sind Davaineen, die 3. Art eine *Dilepis*.

Bei den Otidiformes, welche zu den Charadriiformes überführen und von FÜRBRINGER direkt in diese Gruppe gestellt werden, finden sich 2 *Idiogeninae* und 3 *Hymenolepis*-Arten. Mit den Charadriiformes

haben sie keine Cestoden gemeinsam, auch scheinen die *Davaineidae* in ersterer Gruppe vorwiegender zu sein als bei den Charadriiformes.

In der Gruppe der Charadriiformes werden die Charadrii und Lari zusammengestellt. Da diese beiden Gruppen keine Parasiten gemeinsam haben, sind sie im faunistischen Teil getrennt aufgeführt worden. Aus der Gruppe der Charadrii ist die größte Zahl von Taenien bekannt, was sich wohl aus ihrer Ernährungsweise erklärt, welche eine Infektion mit Cestoden-Larven sehr erleichtert.

Von den 86 bekannten Arten gehören die meisten den *Dilepididae* und *Hymenolepididae* an, und namentlich sind die Genera *Anomotaenia*, *Choanotaenia*, *Dilepis*, *Hymenolepis* und *Aploparaksis* reich vertreten. Die meisten Arten des Genus *Monopylidium* finden sich in den Charadrii, während eigentliche *Davainea*-Arten nur 2 gefunden wurden. Die Mehrzahl der *Acoleinae*, dieser eigentümlichen Cestoden-Formen, bewohnen diese Vogelgruppe. Ebenso treffen wir hier 2 Arten des interessanten Genus *Ophryocotyle*, welches zu den Davaineiden gehört.

Die Lari scheinen merkwürdigerweise weniger reich an Parasiten zu sein, doch sind es fast dieselben Genera von Taenien wie bei den Charadrii, welche auch hier am reichsten vertreten sind. Es sind dies *Anomotaenia*, *Choanotaenia*, *Hymenolepis*. Von *Dilepis* und *Aploparaksis* ist nur je eine Art vorhanden, während die betreffenden Genera bei den Charadrii zusammen durch 12 Species repräsentiert sind. Es fehlen vollkommen die *Davainea*-Arten, die in Charadrii ebenfalls gut vertretenen *Monopylidium*-Arten und namentlich die *Acoleinae*. Typisch ist das Vorhandensein von *Tetrabothrius*-Arten.

So unterscheidet sich also die Helminthen-Fauna der Charadrii und Lari ziemlich scharf, und zwar unterscheiden sie sich nicht nur durch die verschiedene Artzusammensetzung, sondern auch durch das Vorhandensein verschiedener Genera, welche sei es den Charadrii, sei es den Lari fehlen. Die Verwandtschaft der Charadrii und Lari wird bei Betrachtung ihrer Cestoden-Fauna ersichtlich durch die ihnen gemeinsame starke Vertretung der *Dilepididae* und *Hymenolepididae*.

Daß die Alcidae zu den Laridae und nicht zu den Colymbi gehören, wird durch gemeinsame Taenien-Arten bestätigt.

Die Cestoden-Fauna der Columbiformes ist namentlich charakterisiert durch eine große Zahl von *Davaineinae* (ca. 50%), und sie scheinen deshalb parasitologisch den Galliformes und Crypturiformes sich zu nähern, während GADOW sie als mit den

Charadriiformes näher verwandt betrachtet, mit welchen sie parasitologisch absolut nichts gemeinsam haben. Nun suchen aber die meisten Ornithologen immer noch die Tauben in die Nähe der Hühner zu bringen, und auch FÜRBRINGER ist, wie GADOW sagt, nicht ganz frei von diesem Gedanken. Unsere Befunde würden die letztere Auffassung bestätigen. Nun könnte man allerdings annehmen, daß die ähnliche, vegetabilische Ernährungsweise der Galliformes und Columbiformes die Ursache ist für die ähnliche Taenien-Fauna; demgegenüber ist aber zu bemerken, daß sicher nicht mit Körnern und Pflanzen, sondern mit dem gelegentlichen Verzehren von Insecten und anderm Getier die Larven der Cestoden in den Darm der Wirtstiere gelangen, und eben dieselben Nahrungstiere sind es, welche auch den meisten andern Vögeln ihre Parasiten geben. Es ist also wohl nicht ähnliche Ernährungsweise, sondern ein tieferer phylogenetischer Grund, welcher die Zusammensetzung der Parasitenfauna bestimmt. In den Columbiformes finden wir auch mehrere Vertreter der bei den Vögeln seltenen Anoplocephaliden.

Die Podicipediformes sind parasitologisch eine sehr selbständige Gruppe, wir finden bei ihnen keine *Davaineinae*, dagegen einen Vertreter der primitivsten Cyclophylliden-Gruppe, den *Tetrabothrius macrocephalus*, und die drei nur hier vorkommenden Cestoden-Genera (*Dioicocestus*¹⁾, *Tatria* und *Schistotaenia*. Des fernern begegnen wir einer Reihe von Arten des sehr spezifizierten Genus *Hymenolepis*.

Am besten von allen Vogelgruppen sind aber die Procellariiformes charakterisiert, indem hier nur das sehr primitive Genus *Tetrabothrius* durch 7 Arten vertreten und sonst kein anderer Cestode zu treffen ist.

Systematisch sind die Procellariiformes als eine ältere Vogelgruppe angesehen, aus welcher sich vielleicht die Aptenodytiformes und Steganopodes entwickelt haben. Aus diesen beiden letztern Vogelgruppen sind nur ganz wenige Taenien bekannt. Beide besitzen *Tetrabothrius*-Arten. Die Larven der *Tetrabothrius*-Arten scheinen, nach dem Wohnort der geschlechtsreifen Tiere zu schließen, in Meerestieren, vielleicht speziell in Fischen zu hausen, weshalb wir sie in Lari und obigen Vögeln hauptsächlich finden.

Bei den Ciconiiformes finden wir vor allem zahlreiche *Dilepis-*

1) Es gibt allerdings noch eine *Dioicocestus*-Art bei einem Vertreter der Ciconiiformes.

species und mehrere *Anomotaenia*- und *Hymenolepis*-Arten vertreten. Nur in der Einzahl finden wir Vertreter der Genera *Tetrabothrius*, *Davainca*, *Dioicocestus* sowie zwei Arten des typischen Genus *Cyclus*.

Als *Raptatores* werden immer noch die *Accipitres* und *Striges* zusammengefaßt, welche nach neuern Untersuchungen vollständig voneinander zu trennen sind. In der Tat gehören die *Accipitres* in die Nähe der *Ciconiiformes*, während die *Striges* zu den *Coraciiformes* zu stellen sind. Diese Ansicht findet, wie wir nachgewiesen (1906 a), eine interessante Stütze in der Taenien-Fauna dieser Vögel, welche trotz der oft ganz identischen Ernährungsweise total verschiedene Taenien aufweist, nicht nur was die Arten, sondern auch was die Genera anbetrifft.

Bei den *Accipitres* finden wir kein Taenien-Genus speziell stark vertreten, sondern es sind immer nur ein oder zwei Arten jedes Genus vorhanden. Die Genera *Culeitella*, *Laterotaenia* und *Oligorchis* sind, soweit unsere jetzigen Kenntnisse reichen, für Tagraubvögel charakteristisch.

Die *Phoenicopteri*, welche oft von den Ornithologen zu den *Anseriformes* gestellt werden, haben mit denselben keine Taenien gemeinsam, ebensowenig mit den *Ciconiiformes*, in deren Nähe sie von GADOW gestellt werden. Wir finden bei ihnen zwei für sie bis jetzt typische Genera vertreten; es sind dies: *Leptotaenia* und *Amabilia*.

Die *Anseriformes*, diese pflanzenfressende Vogelgruppe, tritt durch die *Phoenicopteri* mit den *Ciconiiformes* in verwandtschaftliche Beziehungen. Von 63 Taenien-Arten — welche genügend bekannt, um sie in ihre resp. Genera einzureihen — sind 48 *Hymenolepinidae*, namentlich *Hymenolepis*-Arten.

Die *Psittaciformes* sind eine sehr scharf begrenzte Gruppe, welche eine ganz typische Parasitenfauna besitzt, indem dieselbe nur aus Anoplocephaliden (6 Arten) und *Davainca*-Arten (4 Arten) besteht. Die Papageien werden von GADOW mit den Cuculi zusammen in die Gruppe der *Cuculiformes* gestellt. GARROD war der erste, welcher die Verwandtschaft dieser Vogelgruppe mit den Galliformes nachwies. Deshalb ist es vielleicht nicht so erstaunlich und bestätigt teilweise seine Angaben helminthologisch dadurch, daß bei den *Psittaci* verhältnismäßig so zahlreiche *Davainca* zu treffen.

Die *Coccygiformes* (*Cuculi*) sind noch sehr wenig untersucht, d. h. man hat nur bei 8 Arten Cestoden gefunden, die überhaupt bei diesen Vögeln selten zu sein scheinen. 7 Arten konnten

in die entsprechenden Genera eingereiht werden, sie gehören den Gattungen *Davainea*, *Anomotaenia* und *Hymenolepis* an.

Die Coraciiformes scheinen nicht sehr scharf abzutrennen zu sein von den Passeriformes. GADOW bezieht in die Coraciiformes die Striges, Coraciae, Caprimulgi, Cypseli, Colii, Trogones und Pici, während FÜRBRINGER nur die Striges, Coraciae (s. str.) und Caprimulgi hierher rechnet, die Pici, Cypseli und Colii dagegen zu den Passeriformes stellt. Die Trogonidae stehen im FÜRBRINGER'schen Stammbaum zwischen Coraciiformes und Pico-Passeriformes.

Von den Coraciae in GADOW'schem Sinne sind als Halyconiformes die Alcedinidae, Meropidae, Upupidae, Bucerotidae und Halyconidae abgetrennt und den Pici genähert.

Sehen wir nun an Hand der Cestoden-Fauna dieser Vogelgruppen, ob die eine oder andere Ansicht der beiden Autoren eine Bestätigung findet.

Was zunächst die Strigiformes anbetrifft, so besitzen dieselben eine ganz besondere ihnen eigne und nur aus 2 sichern Arten zusammengesetzte Taenien-Fauna. Dieselbe zeigt, und dies ist hier interessant hervorzuheben, nicht die geringste Gemeinschaft mit derjenigen der Tagraubvögel, obwohl die Nahrung der Vertreter dieser beiden Vogelgruppen, wie schon oben bemerkt, oft eine ganz identische ist, ein Beweis, daß nicht nur die Ernährungsweise bestimmend ist für die Zusammensetzung der Cestodenfauna einer Vogelgruppe.

Aus den Coraciae kennen wir nur eine, dazu noch unbeschriebene, von v. LINSTOW benannte Taenie, welche, wie ich aus dem Originalmaterial ersehen konnte, eine *Hymenolepis*-Art ist.

Bei den Caprimulgi finden sich etwa 8 typische Species, ebenso haben die Bucerotes 2 für sie typische Arten, während dagegen die Upupidae und Meropidae neben ganz wenigen eignen Arten *Monopylidium crateriforme* (GOEZE) (?) mit den Pici gemeinsam zu haben scheinen (s. S. 7). Bemerkenswert ist, daß in Bucerotes eine Anoplocephalide und in *Merops* eine *Biuterina*-Art vorkommt.

Bei den Pici sehen wir wie bei den obigen Gruppen eine eigene Cestodenfauna ebenfalls aus wenigen Arten zusammengesetzt, von welcher nur *M. crateriforme*, wie oben bemerkt, in Upupidae und Meropidae vorkommen soll.

Die Angabe dagegen, daß die für Pici typische und weitverbreitete *Davainea frontina* (DUJ.) auch in *Oriolus* vorkommt, ist sicher unrichtig, wie ich mich selbst überzeugen konnte. Die *Davainea frontina* aus *Oriolus* ist eine andere, kürzlich von CLERC beschriebene

besondere Species. Ebenso ist die Angabe LINSTOW's von *Hymenolepis serpentulus* aus *Dendrocopus* wohl ein Irrtum. Die Pici zeigen übrigens eine ganz typische Zusammensetzung ihrer Cestoden-Fauna, indem eine Anoplocephalide und, was besonders auffallend, 5 Arten von *Davainea* bei diesen Vögeln vorkommen.

Während GADOW die Pici zu den Coraciiformes stellt, bringt sie FÜRBRINGER, wie schon gesagt, mit den Passeriformes zusammen, was nach der Parasiten-Fauna zu schließen das Richtigere zu sein scheint, da die Pici-Passereres gewisse Cestoden-Genera gemeinsam haben, welche den eigentlichen Coraciiformes fehlen. Ebenso scheint die Disposition des FÜRBRINGER'schen Stammbaumes der Vögel, welcher die Halcyoniformes (Meropidae, Upupidae, Bucerotidae) den Pici nähert, den helminthologischen Verhältnissen entsprechender als die Klassifikation GADOW's. Dies gilt namentlich auch für die Macrochires (Cypselidae und Trochilidae), welche nach GADOW Coraciiformes, nach FÜRBRINGER Passeriformes sind. Auch hier spricht die Taenien-Fauna noch viel deutlicher als bei den obigen Gruppen für eine Vereinigung mit den Passeriformes. In der Tat haben die Cypseliden einige Taenien-Arten mit den *Hirundinidae* gemeinsam; es sind dies: *Anomotaenia cyathiformis*, *Anomotaenia vesiculigera* und *Taenia depressa*. Die Nahrung der Caprimulgi, Cypseliden und Hirundiniden ist ganz dieselbe, trotzdem zeigen die Caprimulgiden eine ganz andere Taenien-Fauna als die beiden andern Gruppen. Die Zahl der Taenien-Arten ist bei den *Hirundinidae* bedeutend größer als bei den *Cypselidae*.

Was nun die *Trochilidae* anbetrifft, so kennen wir bis jetzt nur einen Vertreter des Genus *Anonchotaenia*, welches Genus bei den Coraciiformes nirgends vorkommt, wohl aber bei den Passeriformes verbreitet ist und auch bei den *Nectarinidae* gefunden wurde.

Aus *Coliidae*, *Alcedinidae*, *Todidae* und *Momotidae* kennen wir leider keine Taenien.

Von den Pici-Passeriformes haben wir die von GADOW zu den Coraciiformes gestellten Pici, welche von besonderen Cestoden-Arten bewohnt, bereits besprochen. Die Passeriformes sind eine überaus homogene, artenreiche Gruppe, in welcher sich aber trotzdem mehrere ziemlich scharf getrennte Taenien-Faunen erkennen lassen, und deren Trennung wäre vielleicht eine noch schärfere, wenn die Angaben der Autoren etwas zuverlässiger wären. Sehr viele Arten sind so mangelhaft beschrieben, daß sie nicht mehr zu erkennen und nicht in bestimmte Genera gesetzt werden können. Andererseits ist zu er-

wählen, daß in Passeriformes nur verhältnismäßig selten Taenien gefunden werden. Unsere Kenntnisse sind übrigens in dieser Gruppe ganz besonders lückenhaft, wenn man bedenkt, daß von ca. 7000 Arten von Passeriformes nur aus ca. 150 Arten Vogelcestoden bekannt sind. Aus diesen Gründen will ich hier nicht näher auf die Verteilung der 85 Taenien-Arten in den verschiedenen Familien der Passeriformes eingehen und verweise auf das Kapitel, welches die Zusammenstellung der Vogelarten und ihre Taenien enthält.

Die geographische Verbreitung der Vogelcestoden.

Die geographische Verbreitung der Vogelcestoden-Arten ist in erster Linie abhängig von derjenigen ihres Wirtes oder ihrer Wirte und ist mit derselben mehr oder weniger identisch. Leider sind unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht noch sehr unvollständig, da wir eine bestimmte Taenien-Art eines gewissen Vogels oder einer Vogelgruppe meist nur von einem Orte oder einer ganz geringen Zahl von Lokalitäten kennen, da die Vögel nur selten und ausnahmsweise auf ihre Cestoden untersucht werden.

Nach den Untersuchungen von E. LÖNNBERG scheint es, als ob in einem bestimmten Lande (in diesem Falle Norwegen und Schweden) gewisse Taenien-Arten nur bestimmte Gebiete bewohnen, während sie an andern Orten desselben Landes bei denselben Vögeln sehr selten sind, ganz fehlen oder durch andere Arten ersetzt werden.

Bei unserer Betrachtung der geographischen Verbreitung der Vogeltaenien wollen wir nicht auf die Frage der Verteilung einer Parasiten-Art innerhalb eines Landes eingehen, da, wie gesagt, das Material zur Beantwortung dieser Frage noch viel zu gering und auch von geringerem Interesse als die Beantwortung der Frage der Verteilung der Cestoden-Arten nach den verschiedenen Erdteilen oder Tiergebieten der Erde ist.

Die Kenntnis der Vogelcestoden-Fauna ist nun aber leider keine gleichmäßige, und wir kennen wenigstens einigermaßen nur die Vogelcestoden von Europa und Nord-Afrika sowie diejenigen von Südamerika. Süd-Afrika, Asien, Australien und Nordamerika sind noch wenig untersucht und die bekannten Daten noch zu vereinzelt, um Schlüsse ziehen zu können. Wir haben einige sehr unvollständige und wenig zuverlässige Angaben über Nordamerika sowie ganz mangelhafte und unbrauchbare Angaben über Australien, mit welchen, bevor die betreffenden Materialien einer Neuuntersuchung unter-

worfen, nichts anzufangen ist. Aus Süd-Afrika und Asien sowie aus den zahlreichen Inselgruppen des Indischen und Pazifischen Ozeans existieren nur ganz vereinzelte Angaben. Unsere Betrachtung der geographischen Verbreitung der Cestoden wird daher namentlich ein Vergleich sein zwischen der Vogelcestoden-Fauna Europas und Südamerikas. Dieser Vergleich ergibt interessante Tatsachen, welche eine gründlichere Kenntnis der Cestoden-Fauna der übrigen Erdteile sehr wünschenswert machen.

Wir wollen in den nachfolgenden Zeilen die geographische Verbreitung der Taenien der einzelnen Vogelgruppen nacheinander betrachten.

Über die geographische Verbreitung der Cestoden der *Struthioniformes*, *Rheiformes*, *Casuariformes* und *Apterygiformes* ist bei den engen Verbreitungsgebieten dieser Vögel nichts Besonderes zu bemerken. Auffallend und, wenn richtig, höchst interessant ist, wie schon bemerkt, nur die Tatsache, daß der amerikanische Strauß die typische *Davainca struthionis* des afrikanischen Strauß beherbergen soll. Diese Tatsache weist vielleicht auf das viel umstrittene antarktische Schöpfungszentrum hin.

Die von uns untersuchten Cestoden der *Crypturiformes* stammen alle aus Brasilien und sind ganz typisch für diese Vogelgruppe.

Bei den *Galliformes* sind zunächst die Hausvögel ganz außer Betracht zu lassen, und dann finden wir, daß die in bezug auf Helminthen wenig bekannten südamerikanischen Hühnervögel keine einzige der zahlreichen europäischen Cestoden derselben Vogelgruppe beherbergen.

Die Cestoden der *Ralliformes*, *Gruiformes* und *Otidiformes* lassen aus Mangel an Daten keinen Vergleich zu.

Die *Charadriformes* sind namentlich in Europa parasitologisch gut untersucht, und aus Südamerika kennen wir 17 Taenien-Arten dieser Vögel, von welchen 9 auch in europäischen Vertretern dieser Vogelgruppe vorkommen, was bei der weiten Verbreitung gewisser Arten nicht zu verwundern ist.

Die *Lariformes* zeigen eine weite geographische Verbreitung; es sind übrigens nur in Europa *Larus*-Arten auf Taenien untersucht worden.

Die Vertreter der *Columbiformes* von Neuguinea sowie von den Carolinen, dem Bismarckarchipel und den Nicobaren zeigen auf jeder dieser Inselgruppen, soweit unsere jetzigen Kenntnisse

reichen, besondere Taenien, welche mit denjenigen der Tauben Europas und Afrikas nichts gemein haben. Aus südamerikanischen Tauben kenne ich keine Taenien.

Von den *Podicipediformes* ist außer mehreren europäischen nur eine südamerikanische Art untersucht, welche von 5 in ihr hausenden Arten 4 für sie typische Species aufweist. Bei *Procellariiformes*, *Aptenodytiformes* und *Steganopodes* ist mit den bis jetzt bekannten Daten kein Vergleich möglich.

In den *Ciconiiformes* Europas und Südamerikas hausen je 16 Taenien-Arten, von welchen keine gemeinsam ist.

Ebenso zeigen die *Accipitres* dieser beiden Kontinente eine ganz scharfe Trennung der Cestoden-Arten und sind sogar die Taenien-Genera ganz verschieden. (Aus Europa sind 4 Arten, aus Südamerika 7 Arten bekannt.)

Die *Anseriformes* zeigen eine weite geographische Verbreitung ihrer Arten; es sind übrigens meist nur europäische Arten untersucht, auch manche der untersuchten außereuropäischen Arten stammen aus zoologischen Gärten unseres Kontinents, sodaß eine Vergleichung der geographischen Verbreitung der Taenien-Arten zu keinem sichern Resultat führte.

Die *Psittaciformes* der Molukken, Neuguineas und Australiens, Südamerikas und Afrikas zeigen verschiedene Taenien-Faunen, und nur *Davainca leptosoma* aus südamerikanischen Papageien scheint auch in Afrika vorzukommen, was aber noch der Bestätigung bedarf.

Bei den *Coraciiformes* und *Passeriformes* ist ein Vergleich schwierig, weil einerseits meist nur europäische Arten untersucht, und da, wo es sich um amerikanische Arten handelt, sind es Vertreter von Familien, welche in Europa nicht vorkommen und die deshalb ihre eigne ganz verschiedene Taenien-Fauna besitzen. Dann ist auch die Bestimmung der Cestoden-Arten in dieser Vogelgruppe eine ganz besonders unsichere, so daß sich nur ganz allgemein sagen läßt, daß die Cestoden-Fauna der *Coraciiformes* und *Passeriformes* Europas und Südamerikas eine sehr verschiedene und nur ganz wenige Species beiden Erdteilen gemeinsam scheinen, vielleicht aber bei genauerer Kontrolle gar keine gemeinsamen Arten existieren.

Aus *Striges* kennen wir nur 2 Arten von Taenien, die eine europäisch, die andere südamerikanisch.

Überblicken wir nun die gegebene zoogeographische Übersicht der Taenien der verschiedenen Vogelgruppen, so sehen wir eine

bemerkenswerte scharfe Trennung der Artvertretung der Vogelcestoden namentlich zwischen Europa und Südamerika, von wo wir die meisten Daten besitzen. Aber auch die verschiedenen Inselgruppen Polynesiens zeigen ganz bestimmte Vogelcestoden-Faunen.

Dr. v. IHERING (1902) hat in seinem Aufsatz „Die Helminthen als Hilfsmittel der zoogeographischen Forschung“ folgende Sätze aufgestellt, die ich in extenso hier wiedergebe, um sie einer nähern Betrachtung zu unterziehen:

1. „Die Landtiere werden durch die Wanderungen, auch die ausgedehntesten nicht ausgeschlossen, von ihren Helminthen nicht befreit, weil die als Zwischenwirte dienenden niedern Tiere überall auf Erden unter sonst gleichen Bedingungen analoge Verhältnisse aufweisen; wenn auch in den neuen Wohngebieten zum Teil andere Parasiten hinzukommen, bleiben doch die alten Verhältnisse zum großen Teil unverändert bestehen, wie dies besonders in Südamerika auffällig ist, wo die holarktischen Helminthen nicht bei den autochthonen, sondern nur bei den heterochthonen, spät eingewanderten Säugetieren und Vögeln angetroffen werden.“

2. „Unter diesen Umständen gestaltet sich die Helminthologie zu einem wertvollen Hilfsmittel für die analytische Methode der Zoogeographie, von welchem man sich wichtige Dienste, namentlich auch bei solchen Gruppen behufs Ermittlung ihrer Geschichte versprechen darf, für welche nicht genügend geologische Daten vorliegen resp. der Natur der Sache nach nicht erwartet werden können.“

3. „Die Helminthologie in diesem Sinne aufgefaßt, wird sie auch Gegenstand der paläontologischen Forschung, indem die Beziehungen der Helminthen zu ihren Wirten, zu deren Wanderungen und zu ihrem geologischen Alter es gestatten, über das Alter der einzelnen größeren Gruppen, ja selbst Gattungen und Arten, exakten Aufschluß zu gewinnen.“

v. IHERING stützt sich zur Aufstellung dieser Sätze auf die Acanthocephalen der Säugetiere und Vögel. Ein genaues Studium dieser Parasiten bei Vögeln hat aber gezeigt, daß unter allen Helminthen keine Gruppe so wenig geeignet ist wie diese, obige Sätze zu stützen. Da dieselben also auf die Acanthocephalen basiert, stehen sie auf sehr schwachen Füßen.

Die Echinorhynchen zeigen nämlich die bei Helminthen seltne Eigentümlichkeit, daß ein und dieselbe Art in den Vertretern der verschiedensten Säugetier- und Vogelgruppen vorkommen kann. So finden wir, um nur 2 Arten, welche auch v. IHERING, aber unter

andern Namen, zitiert, anzuführen, *Echinorhynchus buteonis* GOEZE in Accipitres, Striges, Ciconiiformes, Cocygiiformes, Charadriiformes und Passeriformes; *Gigantorhynchus compressus* RUD. dagegen wurde in Accipitres, Coraciiformes, Passeriformes, Charadriiformes, Gruiformes, Crypturiformes und Rheiformes gefunden.

Es liegt auf der Hand, daß Parasiten, welche sich so wenig um die systematische Stellung ihres Wirtes kümmern, keinen tiergeographischen Wert haben können, und ebensowenig aus ihrem Vorkommen geologisch-paläontologische Schlüsse gezogen werden dürfen.

Die Wichtigkeit der von v. IHERING aufgestellten Sätze verlangt, daß ich zunächst näher auf seine als Beweise seiner Ansicht gegebenen parasitologischen Angaben eingehe. Ich beschränke mich dabei auf die Vogelacanthocephalen, weil uns hier die Vögel speziell interessieren und weil durch L. DE MARVAL¹⁾ auf Grund des Studiums eines reichen Materials von Typen eine Monographie der Acanthocephalen der Vögel herausgegeben wurde, welche uns hier sehr zu statten kommt.

Aus den autochthonen Vögeln Brasiliens führt v. IHERING folgende Acanthocephalen an:

- Gigantorhynchus spira* DIES. in *Gypagus* und *Cathartes*
Gigantorhynchus taenioides DIES. in *Cariama*
Echinorhynchus vaginatus DIES. in *Pteroglossus*, *Rhamphastus*, *Rupicola*
Echinorhynchus reticulatus WESTR. in *Limnospodalis* und *Porzana*
Echinorhynchus galbulae WESTR. in *Galbula*
Echinorhynchus dendrocopi WESTR. in *Xipholaptes*
Echinorhynchus tanagrae RUD. in *Tanagra*
Echinorhynchus orioli RUD. in *Ostinops*;

aus heterochthonen Vögeln zitiert er:

- Echinorhynchus inscriptus* WESTR. in *Turdus*
Echinorhynchus striatus GÜZE in *Ardea*, *Tantalus*, *Platalea* und *Ceryle*
Echinorhynchus sphaerocephalus BREMS. in *Larus*
Echinorhynchus emberizae RUD. in *Zonotrichia* und *Pseudochloris*
Echinorhynchus lagenaeformis WESTR. in *Urubitinga*, *Busarellus* und andern Accipitres
Echinorhynchus caudatus ZED. in *Polyborus*, *Accipiter* und andern Accipitres
Echinorhynchus tumidulus RUD. in *Crotophaga* und *Coccyzus*
Echinorhynchus oligocanthoides RUD. in *Busarellus* und *Harpagus*.

Hierzu bemerkt v. IHERING, daß sich aus den mitgeteilten Listen ergibt, daß bei den höhern autochthonen Landtieren Südamerikas durchweg nur besondere, ihnen eigentümliche Arten von Acanthocephalen angetroffen werden, während bei den heterochthonen Formen neben besondern Arten

1) L. DE MARVAL, Monographie des Acanthocephales d'oiseaux, in: Rev. Suisse Zool., Vol. 13, 1905, 190 p., 4 pl.

von Acanthocephalen auch solche vorkommen, welche eine weitere Verbreitung besitzen. Von den unter den autochthonen Vögeln angeführten Echinorhynchen-Arten ist nur *Ech. vaginatus* DIES. eine für Südamerika typische Art, welche, wie DE MARVAL bemerkt, soviel nach dem schlecht erhaltenen Original zu urteilen, dem weitverbreiteten *Ech. micracanthus* sehr nahe steht.

G. spira DIES. und *taenioides* DIES. sind, wie die Untersuchung des Originalmaterials gezeigt hat, verschiedene Altersstadien des weitverbreiteten, auch in Europa in Raben etc. vorkommenden *G. compressus*. *Ech. reticulatus* kommt auch in der alten Welt vor. Die 4 nachfolgenden Arten sind ganz wertlos, denn von ihnen bestehen weder Beschreibungen noch die Originale, und ich kann deshalb nicht begreifen, wie v. IHERING diese zu streichenden Arten als Stütze für seine Ansicht vorbringen kann. *Ech. orioli* RUD. (partim.) soll wahrscheinlich identisch sein mit dem auch in Europa gefundenen *Ech. areolatus* RUD.

Von den aus heterochthonen Vögeln Südamerikas bekannten Echinorhynchen sagt v. IHERING, daß *Ech. sphaerocephalus*, *Ech. striatus*, *Ech. caudatus* und *Ech. lagenaeformis* (syn. *Ech. compressus*) in Europa und Brasilien vorkommen. Die 4 folgenden Arten, die Brasilien eigen sein sollen — es sind dies *Ech. inscriptus* (syn. *Ech. areolatus*), *Ech. tumidulus* (syn. *Ech. buteonis*), *Ech. oligocanthoides* (synonym den bereits oben zitierten *Ech. lagenaeformis*, *Ech. compressus*, *Ech. spira* und *Ech. taenioides*) — kommen aber ebenfalls in Europa vor. *Ech. emberizae* RUD. ist dagegen eine unbeschriebene, zu streichende Art. Also finden wir in allen autochthonen nur eine (noch dazu nicht ganz sichere), in allen heterochthonen Vögeln keine sichere typische brasilianische Art!

Bei den Säugetieren würde wohl dasselbe zu konstatieren sein, wenn wir die Echinorhynchen derselben etwas gründlicher kennen. Daß vielleicht die zitierten Edentaten und Marsupialier besondere Echinorhynchen haben, ist nicht zu verwundern, da sie ganz besondere nur in Südamerika und Australien vorkommende Säugetiergruppen sind, von zoogeographischem Wert ist aber diese Tatsache einstweilen gar nicht.

Die oben zitierten Sätze v. IHERING's finden, wie in der Fußnote des nähern gezeigt, in dem von ihm angeführten Tatsachenmaterial nicht die geringste Stütze, sie scheinen das Gegenteil zu beweisen und dies eben, weil der Verfasser sich auf Helminthen stützt, welche sozusagen bei jedem Vertreter einer Wirbeltierklasse gedeihen und sich entwickeln können und nur sehr wenig spezialisiert sind in bezug auf ihren Wohnsitz.

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den andern Helminthen und ganz speziell bei den Cestoden.

ZSCHOKKE¹⁾, auf Grund der von v. IHERING gemachten Ausein-

1) F. ZSCHOKKE, Die Cestoden der südamerikanischen Beuteltiere, in: Zool. Anz., Vol. 27, 1904 und Die Darmcestoden der amerikanischen Beuteltiere, in: Ctrbl. Parasitol., Vol. 36, 1904.

andersetzungen, die, wie er sagt, „von zoogeographischer und phylogenetischer Bedeutung sind“, unterzieht die Cestoden-Fauna einiger Aplacentaler einer näheren Betrachtung.

Hier liegen nun die Verhältnisse ganz anders als bei den Acanthocephalen, indem bei Cestoden sich eine sehr scharfe Spezialisierung der Arten auf bestimmte Wirte und Wirtsgruppen zeigt. Daß die Marsupialier und Monotremen für sie typische Cestoden-Arten besitzen, welche nur bei ihnen anzutreffen, hat, wie schon oben bemerkt, nichts Verwunderliches und findet sich diese Erscheinung auch bei allen übrigen Säugetiergruppen, zeigt sich aber noch viel deutlicher bei den Vogelcestoden, welche eine viel reichere Cestoden-Fauna haben und welche wir in dieser Hinsicht bedeutend besser kennen.

Es ist die Spezialisierung des Wohnsitzes eine für die Taenien charakteristische Erscheinung, und zugleich könnte man diese Tatsache als einen systematischen Charakter der betreffenden Wirbeltiergruppen auffassen, wie es die morphologischen und anatomischen Genus und Familienmerkmale derselben sind. Ob denselben aber immer wichtige zoogeographische Bedeutung zukommt, ist keineswegs sicher. Anders wäre es, wenn die Cestoden-Fauna einer Säugetiergruppe in zwei verschiedenen Kontinenten, z. B. Australien und Südamerika, generell verschieden wäre. Dies ließe darauf schließen, daß die betreffenden Vertreter der beiden Kontinente schon sehr lange scharf getrennt und sich deshalb neue typische Cestoden-Genera herausbilden konnten. Wir konstatieren aber in fast allen derartigen Fällen, daß nur die Arten verschieden, nicht aber die Genera, was aber in den obigen Fällen nicht etwa auf eine relativ junge Trennung der Kontinente hinweist, wie v. IHERING und ZSCHOKKE glauben.

Es kann ferner die Tatsache, daß eine Säugetiergruppe und dazu noch eine so typische, geographisch eng begrenzte wie die Marsupialier ein bestimmtes Cestoden-Genus beherbergt, nicht von zoogeographischer Bedeutung sein und zoogeographische Schlüsse erlauben oder begründen, um so mehr, als wir bei der mangelhaften Kenntnis der Cestoden-Fauna jener Länder nicht wissen, ob die betreffende Cestoden-Gattung wirklich so charakteristisch ist. Die von uns als *Linstowia lata* (aus *Numida ptilorhyncha*) beschriebene Art, welche ZSCHOKKE mit Recht als nicht in dieses Genus gehörig betrachtet, zeigt auf jeden Fall zahlreiche gemeinsame Charaktere mit *Linstowia* und läßt es möglich erscheinen, daß wir auch anderwärts außerhalb

der Marsupialia bei andern Säugetieren oder sogar bei gewissen Vogelgruppen Vertreter dieses Genus treffen werden. Auch *Moniezia*, *Bertia*, *Cittotaenia* wurden als für gewisse Säugetiergruppen charakteristisch angesehen, bis ich für diese Genera nachweisen konnte, daß sie auch in Vögeln ihre Vertreter haben.

Ochhoristica, das zweite für die Marsupialier von ZSCHOKKE in Betracht gezogene Genus, ist eine durch die Mannigfaltigkeit der Wirte charakteristische Gruppe, welche nicht nur in Marsupialiern, sondern auch in Edentaten, im Dachs, in Affen und in Eidechsen ihre Vertreter hat und so zoogeographisch überhaupt unbrauchbar ist.

Wir müssen in zoogeographischen Schlüssen aus der Helminthen-Fauna sehr vorsichtig sein und eine bessere Kenntnis der Parasiten-Fauna abwarten und anstreben. Wenn wir einmal die Helminthen-Fauna der verschiedenen Kontinente annähernd so gut kennen wie deren Vertebraten-Fauna, d. h. wenn die Forschungsreisenden ihr Interesse nicht nur auf das Sammeln von Vogel- und Säugetierbälgen und -Skeleten beschränken, sondern gleichzeitig auch deren Parasiten sammeln, wie dies in jüngerer Zeit geschieht, so werden gewiß interessante zoogeographische, systematische und sogar phylogenetische Resultate nicht nur für die Helminthen, sondern auch für deren Wirte sich ergeben.

Da wir die reiche Cestoden-Fauna der Vögel von Europa, Nord-Afrika und Südamerika bereits ziemlich gut kennen, ließen sich aus dem am Schlusse dieser Arbeit gegebenen faunistischen Kapitel bereits einige interessante Tatsachen herauslesen, welche in den vorhergehenden Zeilen bereits z. T. angedeutet sind, die aber gründlich zu beantworten der Zeitpunkt noch nicht gekommen ist.

Nur zwei parasitologisch und zoogeographisch höchst interessante Tatsachen in bezug auf die Taenien der Vögel will ich hier nochmals hervorheben. Der erste Fall betrifft das von mir konstatierte Vorkommen von *Davainca struthionis* in *Struthio* und in *Rhea americana* (s. o. S. 6). Es würde sich hier gewiß lohnen, eine große Zahl von Exemplaren von *Rhea* verschiedener Lokalitäten Südamerikas zu untersuchen, um zu sehen, ob der obengenannte Cestode wirklich vorkommt; wenn ja, wäre dies gewiß von großer zoogeographischer Bedeutung.

Der zweite Fall betrifft die generelle und nicht nur artliche Verschiedenheit der Cestoden-Fauna der Accipitres Europas und Südamerikas, die verschiedene Erklärungen zuläßt.

Würden wir die Phylogenese der Cestoden besser kennen, so

könnten wir vielleicht aus dem Präponderieren eines primitiven, phylogenetisch ältern Taenien-Genus bei geographisch getrennten Arten derselben Vogelgruppe Schlüsse ziehen, welches der Entstehungsort, der ursprünglichere Wohnort der betreffenden Vogelgruppe ist. So könnte also nicht nur in der von v. IHERING richtig angedeuteten, aber mangelhaft begründeten Richtung wichtige Dienste von der Helminthologie zu erwarten sein.

II. Systematischer Teil.

Die Systematik der Cestoden der warmblütigen Vertebraten der Cyclophyllidea war und ist auch jetzt noch eine sehr mangelhafte, und alle Versuche mit Ausnahme der systematischen Zusammenstellung von M. BRAUN (in: BRONN, Klassen und Ordnungen des Tierreichs) sind kaum einer Diskussion wert, da sie infolge der damals äußerst unvollständigen anatomischen Kenntnisse nahe verwandte Gruppen trennen und anatomisch total Verschiedenes zusammenfassen.

M. BRAUN war der erste, der gestützt auf das Studium der gesamten Literatur eine Klassifikation der Cyclophylliden gab, welche hier genau wiedergegeben und diskutiert werden soll, um dann eine in manchen Punkten veränderte Einteilung dieser Cestoden-Ordnung aufzustellen, welche sich stützt auf die eigne anatomische Untersuchung von mehr als 51 Genera. So glaube ich eine etwas bessere Gruppierung der seit BRAUN'S Versuch bedeutend vermehrten Cestoden-Genera geben zu können.

MAX BRAUN teilt die Cyclophylliden folgendermaßen ein:

Ordn. Cyclophyllidea VAN BEN.¹⁾

1. Fam. Taeniidae LUDW.

Subfam. *Mesocestoidinae* STOSS.

Gatt. *Mesocestoides* VAILL. S.

Subfam. *Acoléinae* FUHRM.

a) *Gyrocoelia* FUHRM. V.

b) *Acoleus* FUHRM. V.

Anhang: c) *Diploposthe* JACOBI. V.

d) *Dioicocestus* FUHRM. V.

1) Hinter den Gattungsnamen habe ich durch S, V, R, A angegeben, ob nach den Angaben von BRAUN das Genus Vertreter in Säugtieren, Vögeln, Reptilien und Amphibien besitzt.

- Subfam. *Amabiliinae*.
 e) *Anabilia* DIAM. V.
- Subfam. *Copesominae* RAILL.
 f) *Copesoma* SINITZ. V.
 g) *Trichocephaloïdes* SINITZ. V.
- Subfam. *Tetrabothriinae*.
 Gatt. *Tetrabothrius* RUD. S, V.
- Subfam. *Anoplocephalinae* R. BLANCH.
 Gatt. *Anoplocephala* E. BLANCH. S.
 „ *Andrya* RAILL. S.
 „ *Bertia* R. BLANCH. S.
 „ *Linstowia* ZSCH. S.
 „ *Stilesia* RAILL. S.
 „ *Thysanosoma* DIES. S.
 „ *Cittotaenia* RIEHM. S, V?
 „ *Moniezia* R. BLANCH. S.
- Subfam. *Dipylidinae* RAILL.
 Gatt. *Dipylidium* LKH. S.
 „ *Cotugnia* DIAM. V.
 „ *Oochoristica* LÜHE. R.
 „ *Panceria* SONS. R.
 „ *Monopylidium* FUHRMANN. V.
 „ *Hymenolepis* WEINLAND. S, V.
 1. Subgen. *Hymenolepis s. str.* S, V.
 2. Subgen. *Drepanidotaenia* RAILL. V.
- Gatt. *Dilepis* WEINL. V.
 „ *Choanotaenia* RAILL. V.
 „ *Anochotaenia* COHN. V.
 „ *Nematotaenia* LÜHE. A.
- Subfam. *Davaineinae*.
 Gatt. *Davainea* R. BLANCH. S, V.
 „ *Echinocotyle* R. BLANCH. V.
 „ *Ophryocotyle* FRIIS. V.
- Anhang: a) *Fimbriariidae* WOLFFH. V.
 b) *Iliogencs* KRABBE. V.
- Subfam. *Taeniinae* PERRIER.
 Gatt. *Taenia* LINNÉ. S.

Dieser Wiedergabe des BRAUN'schen Systems will ich sofort das meinige folgen lassen und dabei auch die Wohnorte der Vertreter dieser Genera nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse angeben:

1. Fam. *Tetrabothriidae* (BRAUN).
 1. Gatt. *Tetrabothrius* RUD. S, V.
2. Fam. *Mesocestoididae* (STOSS.).
 2. Gatt. *Mesocestoides* VAILLANT. S, V.
3. Fam. *Anoplocephalidae* (R. BL.).

1. Subfam. *Anoplocephalinae* FUHRMANN.
 3. Gatt. *Anoplocephala* E. BLANCH. S.
 4. „ *Bertia* R. BLANCH. S, V.
 5. „ *Andrya* RAILL. S.
 6. „ *Cittotaenia* RIEHM. S, V.
 7. „ *Monixia* BLANCH. S, V.
 8. „ *Schizotaenia* JANICKI. S.
 9. „ *Aporina* FUHRMANN. V.
 10. „ *Triplotaenia* BOAS. S.
2. Subfam. *Linstowinae* FUHRMANN.
 11. Gatt. *Linstowia* ZSCHOKKE. S.
 12. Gatt. *Zschokkea* FUHRMANN. V.
3. Subfam. *Thysanosominae* FUHRMANN.
 13. Gatt. *Thysanosoma* DIES. S.
 14. Gatt. *Stilesia* RAILL. S.
4. Fam. *Davaineidae* FUHRMANN.
 1. Subfam. *Ophryocotylinae* FUHRMANN.
 15. Gatt. *Ophryocotyle* FRIIS. V.
 2. Subfam. *Davaineinae* BRAUN.
 16. Gatt. *Davainea* BLANCH. S, V.
 17. „ *Polycoelia* FUHRMANN. V.
 18. „ *Cotugnia* DIAM. V.
 3. Subfam. *Idiogeninae* FUHRMANN.
 19. Gatt. *Idiogenes* KRABBE. V.
 20. Gatt. *Chapmania* (MONTICELLI) FUHRMANN. V.
5. Fam. *Dilepinidae* FUHRMANN.
 1. Subfam. *Dilepinae* FUHRMANN.
 21. Gatt. *Dilepis* WEINLAND. V.
 22. „ *Trichocephaloides* SINITZINE. V.
 23. „ *Lateriporus* FUHRMANN. V.
 24. „ *Choanotaenia* RAILLET. V, S. ¹⁾
 25. „ *Anomotaenia* COHN. V, S. ²⁾
 26. „ *Fuhrmannia* PARONA. V.
 27. „ *Leptotaenia* COHN. V.
 28. „ *Amoebotaenia* COHN. V.
 29. „ *Liga* WEINLAND. V.
 30. „ *Parvirostrum* FUHRMANN. V.
 31. „ *Cyclustera* FUHRMANN. V.
 32. „ *Laterotaenia* FUHRMANN. V.

1) CHOLODKOWSKY (1906) beschreibt eine *Taenia* aus *Sorex*, die er *Monopylidium soricinum* CHOLOD. benennt, welche mir aber nach Beschreibung und Abbildung (fig. 38) fast sicher eine *Choanotaenia* zu sein scheint. So würde also das Genus *Choanotaenia* und nicht *Monopylidium* auch in Säugetieren vorkommen.

2) Ebenso ist die *Amoebotaenia subterranea* CHOLOD. aus *Sorex* desselben Autors nicht eine *Amoebotaenia*, sondern eine *Anomotaenia*.

33. Gatt. *Proorchida* FUHRMANN. V.
 34. „ *Angularia* CLERC. V.
 35. „ *Cyclorchida* FUHRMANN. V.
 36. „ *Acanthocirrus* FUHRMANN. V.
 37. „ *Cladotaenia* COHN. S.
2. Subfam. *Dipylidiinae* RAILLET.
 38. Gatt. *Dipylidium* LEUCKART. S, V.
 39. „ *Monopylidium* FUHRMANN. V.
 40. „ *Oochoristica* LÜHE. S, R.
 41. „ *Panceria* SONS. R.
3. Subfam. *Paruterinae* FUHRMANN.
 42. Gatt. *Paruterina* FUHRMANN. V.
 43. „ *Biuterina* FUHRMANN. V.
 44. „ *Culcītella* FUHRMANN. V.
 45. „ *Rhabdometra* CHOLODK. V.
 46. „ *Metroliaesthes* RANSOM. V.
 47. „ *Anouchotaenia* COHN. V.
 48. „ *Nematotaenia* LÜHE. A.
6. Fam. *Hymenolepinidae* FUHRMANN.
 49. Gatt. *Oligochis* FUHRMANN. V.
 50. „ *Hymenolepis* WEINLAND. S, V.
 Subgen. *Echinocotyle* BLANCHARD. V.
 51. „ *Diorchis* CLERC. V.
 52. „ *Aploporaksis* CLERC. V.
7. Fam. *Taeniidae* PERR.
 53. Gatt. *Taenia* LINNÉ. S, V.

Übergangsgruppe: 54. Gatt. *Diploposthe* JACOBI.¹⁾ V.

8. Fam. *Acoleinidae* FUHRMANN.
 55. Gatt. *Acœlus* FUHRMANN. V.
 56. „ *Gyrocoelia* FUHRMANN. V.
 57. „ *Diplophallus* FUHRMANN. V.
 58. „ *Shipleya* FUHRMANN. V.
 58. „ *Dioicocestus* FUHRMANN. V.
9. Fam. *Amabiliidae* FUHRMANN.
 59. Gatt. *Amabilia* DIAM. V.
 60. „ *Schistotaenia* COHN. V.
 61. „ *Tatria* KOWALEVSKY. V.
10. Fam. *Fimbriariidae* WOLFFHÜGEL.
 62. Gatt. *Fimbriaria* FROELICH. V.

1) Genus, das gewisse Ähnlichkeit mit den *Acoleinidae* zeigt, aber eine Vagina besitzt.

Genera, die mangelhaft bekannt:

63. Gatt. *Tetracisdictyle* FUHRMANN. V.

64. Gatt. *Copesoma* SINITZIN. V.

Ein Vergleich der beiden systematischen Zusammenstellungen zeigt zunächst, daß seit dem Erscheinen der Arbeit von MAX BRAUN 1894—1900 eine bedeutende Vermehrung der Genera stattgefunden, indem wir nach den obigen Autoren 32 Cyclophylliden-Genera von Taenien vorfinden, von welchen nach BRAUN 21 in Vögeln vorkommen. Dagegen zählen wir heute 64 Genera von Cyclophylliden, von welchen 54, also mehr als die doppelte früher bekannte Zahl, Vögel bewohnen.

Es hat sich dabei namentlich auf Grund unserer Untersuchungen ergeben, daß eine Reihe von Gattungen, welche von BRAUN noch als typische Säugetiercestoden-Genera angesehen wurden, auch in Vögeln ihre Vertreter haben.

Es sind dies, wie aus dem Vergleich der beiden Generalisten ersichtlich, *Mesocestoides*, *Tetrabothrius*, *Bertia*, *Cittotaenia*, *Moniezia*, *Dipylidium*, *Hymenolepis*, *Davainea*, *Taenia*. Von diesen waren zur Zeit des Erscheinens von BRAUN'S Arbeit nur die Genera *Tetrabothrius*, *Hymenolepis* und *Davainea* als beide Vertebraten-Gruppen bewohnend bekannt.

Die verschiedenen Klassen der Vertebraten zeigen folgende Vertretung in der Ordnung der Cyclophyllidea:

Amphibien 1 Genus, Reptilien 2 Genera, Vögel 53 Genera, Säugetiere 19 Genera.

Es zeigen also die Vögel bei weitem die reichste Vertretung in dieser Cestoden-Ordnung und das nicht nur, was die Zahl der Genera, sondern auch was die Zahl der Arten betrifft, welche mehr als 3mal so groß ist wie die der Säugetiertäenien.

BRAUN unterscheidet bei den Cyclophylliden eine einzige Familie und 6 Subfamilien; ich glaube, daß bei der großen Zahl der Genera, welche immer noch zunimmt, den Subfamilien der Wert von Familien gegeben werden muß, welche dann, und dies z. T. bereits jetzt, in Subfamilien aufgeteilt werden können.

Ich behalte die meisten Subfamiliennamen der BRAUN'Schen Systematik als Familien bei. Die Subfamilie der *Copesominae* RAILL. mit den Genera *Copesoma* und *Trichocephaloides* ist zu streichen, indem sie auf die fehlerhafte und mangelhafte Beschreibung zweier längst bekannter, aber unkenntlich beschriebener Taenien aus *Tringa* begründet ist. *Trichocephaloides* gehört in die Nähe von *Dilepis*.

Die bei BRAUN am Anfang zwischen *Mesocestoides* und *Tetrabothrius* stehenden Subfamilien der *Acoleinae* und *Amabiliinae* gehören an das Ende des Systems und müssen auch etwas anders angeordnet werde. Es sind dies sehr spezialisierte Gruppen. Die Subfamilie der *Dipylidiinae* RAILL. wurde enger gefaßt und für die von BRAUN in dieselbe gestellten Genera der Familienname *Dilepinidae* aufgestellt. Die *Cotugnia*-Arten, die BRAUN hierher stellte, sind, wie unsere Untersuchung ergeben, typische doppelporige *Davainea*. Die Gattungen *Ophryocotyle* und *Idiogenes* sind als Vertreter zweier besonderer Subfamilien der Davaineiden zu betrachten, mit welchen sie die ähnliche Bewaffnung des Scolex gemeinsam haben. Die Gattung *Hymenolepis* habe ich mit einigen andern neuern Genera in einer besondern Familie untergebracht.

Echinocotyle ist, wie CLERC gezeigt, nicht eine Davaineide, sondern eine typische *Hymenolepis* und bildet eine Untergattung dieses Genus, wenn man dieselbe nicht ganz fallen lassen will.

In den 3 größten Familien, den Anoplocephaliden, Davaineiden und Dilepiniden, zeigt sich allen gemeinsam dieselbe Tendenz in den Modifikationen des Uterus, welche mich veranlaßten, jede dieser 3 Familien in je 3 Subfamilien aufzuteilen.

In der ersten Subfamiliengruppe ist der Uterus schlauch- oder sackförmig, mehr oder weniger verzweigt (Subfamilie der *Anoplocephalinae*, *Ophryocotylinae* und *Dilepininae*). In der zweiten Gruppe löst sich der Uterus in zahlreiche Parenchymkapseln auf, in welchen die Eier einzeln oder zu mehreren liegen (Subfamilie der *Linstowinae*, *Davaineinae* und *Dipylidiinae*). In der dritten Gruppe bildet sich an dem einfachen oder mehrfachen Uterus ein eigentümliches, anfangs dichtes Parenchymorgan, das „Paruterinorgan“, in welches die Eier meist sehr spät eindringen, um dann von einer dichten Kapsel umgeben zu werden (Subfamilie der *Thysanosominae*, *Idiogeninae* und *Paruterinae*).

Diese dritte Gruppe könnte man eigentlich in zwei teilen, je nachdem das Paruterinorgan sich an den primären Uterus anliegend bildet oder als mehrfaches Gebilde sich an die sekundär in mehrere Uteri aufgeteilten Eibehälter anlegt. So würde dann die Subfamilie der *Paruterinae* in 2 Subfamilien geteilt werden müssen, während die *Thysanosominae* in die zweite, die *Idiogeninae* in die erste der angedeuteten Gruppen zu stellen wäre.

Ich glaube, daß unsere Art der Anordnung der Genera, wenn

auch nicht in allen Punkten eine natürliche, doch einen Fortschritt in der Systematik der Cyclophyllidae bedeutet.

In den nachfolgenden Zeilen sind alle bis jetzt bekannten Vogelcestoden-Arten mit ihrer Synonymie zusammengestellt. Seit einer Reihe von Jahren hat man, wie schon in der Einleitung bemerkt, begonnen, die Taenien in bestimmten Genera unterzubringen, was leider von einzelnen Autoren, wie aus der Synonymie ersichtlich, mit großer Willkür geschah.

Es wurden namentlich durch die Arbeiten von COHN und CLERC eine größere Zahl von Taenien aus dem alten alles umfassenden Genus *Taenia* in bestimmten neuen Genera untergebracht, doch blieb die systematische Stellung der großen Mehrzahl der Arten noch unbekannt. Dank dem Entgegenkommen der Museumsdirektoren und zahlreicher Helminthologen und Zoologen, welche mir sowohl ihre Originale als sonstige bedeutende Materialien übersandten, konnten die meisten Cestoden in bestimmte Genera eingereiht werden. Bei dieser systematischen Sichtung ergab sich leider auch die Notwendigkeit, einige in der Literatur häufig vorkommende Artnamen durch ältere zu ersetzen. Ebenso ist aus der in Fußnoten angeführten Synonymie ersichtlich, daß zahlreiche neuere Arten auf Grund unserer Untersuchungen gestrichen werden mußten, weil sie bereits früher, allerdings oft unvollständig, beschrieben worden waren. Eine Reihe alter unbeschriebener, aber trotzdem in der Literatur noch vorkommenden Artnamen habe ich ganz zu streichen vorgeschlagen.

In den Artlisten der einzelnen Genera ist immer hinter jeder Species die wichtigste zur Bestimmung notwendige Literatur angegeben, soweit eine solche außer der Originalbeschreibung existiert.

1. Fam. *Tetrabothriidae*.

Scolex unbewaffnet, ohne Rostellum, von vier-eckiger Gestalt. Die vier Saugnäpfe sind groß, rund oder länglich-oval; sie tragen am Vorderende einen nach außen abgehenden muskulösen Anhang, welcher die meist viereckige Form des Scolex bedingt. Hals kurz, Strobila kurzgliedrig. Die Geschlechtsöffnungen einseitig ausmündend. Genitalcloake tief und muskulös; der Cirrusbeutel immer klein, durch einen männlichen Cloakenkanal mit der Genitalcloake verbunden. In Cetaceen und Vögeln.

Gatt. *Tetrabothrius* RUDOLPHI 1819.

Synonymie: *Amphoterocotyle* DIES. 1863, *Prosthecocotyle* MONTICELLI 1892, *Bothriotaenia* LÖNNBERG 1896.

Scolex unbewaffnet, von viereckiger Gestalt. Die vier Saugnäpfe sind groß, rund oder länglich-oval; sie tragen am Vorderrande einen nach außen abgehenden muskulösen Anhang, welcher die viereckige Form des Scolex bedingt. Hals kurz; Strobila kurzgliedrig; die Geschlechtsöffnungen sind immer rechts¹⁾ gelegen. Die Genitalcloake tief und sehr muskulös. Der Cirrusbeutel klein, von kugliger Gestalt mit der Genitalcloake durch einen „männlichen Cloakenkanal“ verbunden. Dotterstock vor dem Ovarium gelegen. In Cetaceen und Vögeln.

Typische Art: *Tetrabothrius macrocephalus* RUD.
syn. *Bothriocephalus macrocephalus* RUD.

RUDOLPHI teilte das Genus *Bothriocephalus* in 4 Gruppen, deren letzte er *Tetrabothrius* benannte und der er 4 Arten zuteilte, von welchen 2 in die Genera *Echineibothrium* und *Anthobothrium* gestellt wurden. So verbleiben im alten Subgenus *Tetrabothrius* nur noch *T. macrocephalus* und *T. cylindraceus*, von welchen die erstere Art nach LÜHE's Vorschlag (LÜHE 1899) als typische Art des Genus zu gelten hat. So fallen die später begründeten Gattungsnamen *Amphoterocotyle* DIES. (für *Amphoterocotyle elegans* DIES.), *Prosthecocotyle* MONTICELLI (für *T. forsteri* KREFFT), *Bothriotaenia* LÖNNBERG (für *T. erostris* LÖNNBERG) dahin. Die Mehrzahl der Arten sind von FUHRMANN (1899b) auf Grund der Untersuchung der Originale unter dem Gattungsnamen *Prosthecocotyle* kurz beschrieben worden.

Charadriiformes.

? *Tetrabothrius macrocephalus* RUD. 1809.

Lariformes.

Tetrabothrius cylindraceus RUD. 1809²⁾, FUHRMANN 1899b
Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG) 1889, FUHRMANN 1899b.

1) In meiner Arbeit (1899b) steht irrtümlicherweise, daß die Genitalpori links liegen.

2) Diese Taenie ist nach unserer Untersuchung der Typen synonym *Taenia sterna* RUD.

Podicipediformes.

Tetrabothrius macrocephalus ¹⁾ RUD. 1809, FUHRMANN 1899b.

Procellariformes.

Tetrabothrius heteroclitus DIESING 1850 ²⁾, FUHRMANN 1899b, 1899e

Tetrabothrius torulosus v. LINSTOW 1888, FUHRMANN 1899b, 1899e

Tetrabothrius monticelli ³⁾ FUHRMANN 1899b

Tetrabothrius campanulatus FUHRMANN 1899b

Tetrabothrius intermedius FUHRMANN 1899b

Tetrabothrius diomedae FUHRMANN (in: SHIPLEY 1900b)

Tetrabothrius umbrella FUHRMANN 1899b.

Aptenodytiformes.

Tetrabothrius eudyptidis (LÖNNBERG, FUHRMANN ⁴⁾), LÖNNBERG 1896,
FUHRMANN 1899b

Tetrabothrius lutzii PARONA 1901.

Steganopodes.

Tetrabothrius pelecani RUD. 1819 ⁵⁾, FUHRMANN 1899b.

1) LINSTOW hat aus *Colymbus septentrionalis* L. eine zweite Art unter dem Namen *Tetrabothrius lobatum* v. LINSTOW 1905b beschrieben, welche aber, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials gezeigt, identisch ist mit der obigen RUDOLPH'schen Art.

2) *Tetrabothrius heteroclitus* ist synonym zu *Amphoterocotyle elegans* DIES., und ebenso ist, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials gezeigt, *Tetrabothrius auriculatus* v. LINSTOW 1888 identisch mit obiger Art. Ein Vergleich der Originale hat gezeigt, daß auch *T. sulciiceps* BAIRD 1859 dieser Taenie synonym; ebenso ist nach Untersuchung der Originale obige Taenie synonym *Taenia diomedea* v. LINSTOW 1888. Weiteres Synonym: *Hymenolepis sulciiceps* BAIRD, PARONA 1899.

3) *Bothriotaenia crostris* var. *minor* LÖNNBERG 1896 ist synonym *Tetrabothrius monticelli* FUHRMANN, wie meine Untersuchung des Originalmaterials gezeigt hat.

4) Unsere Untersuchung des Originalmaterials hat gezeigt, daß *Bothriotaenia crostris* var. *eudyptidis* LÖNNBERG 1896 eine gute Art ist, sie wurde von uns als *T. eudyptidis* beschrieben.

5) BAIRD hat Exemplare obiger Art als *Taenia heterosoma* BAIRD nomen nudum und auch als *Taenia sulae fuscae* BAIRD nomen nudum bezeichnet. Die Originalexemplare dieser beiden nicht beschriebenen Arten konnte ich im Britischen Museum in London untersuchen. MONTICELLI (1891), der die Originale ebenfalls gesehen, hält die beiden BAIRD'schen Arten wie ich für identisch mit *T. pelecani* RUD.

Ciconiiformes.

Tetrabothrius porrigens MOLIN 1858 u. 1861.¹⁾

Accipitres.

Tetrabothrius junceus (BAIRD²⁾) 1862, FUHRMANN 1899b.

Anseriformes.

Tetrabothrius arcticus v. LINSTOW 1901b.

2. Fam. *Mesocestoididae* (Stoss.).

Scolex taenienartig, unbewaffnet und ohne Rostellum; Glieder mit flächenständigen Genitalpori; Vagina vor oder neben dem Cirrus mündend. In Säugetieren und Vögeln.

Genus *Mesocestoides* VAILLANT 1863.

Scolex ohne Rostellum. Genitalpori flächenständig. Die Eier vereinigen sich in einer starkwandigen Uteruskapsel. In Säugetieren und Vögeln.

Typische Art: *Mesocestoides ambiguus* VAILLANT 1863 (spec. inq.).

Accipitres.

Mesocestoides perlatus (GOEZE) 1782³⁾, MÜHLING 1898.

Passeriformes.

Mesocestoides alaudae STOSSICH 1896.

1) Diese Art ist leider nur sehr unvollständig beschrieben, die Originale waren trotz aller Bemühungen nicht erhältlich.

2) Eine erneute Untersuchung des Originalmaterials macht es mir wahrscheinlich, daß *T. junceus* identisch mit *T. macrocephalus* RUD. und durch das Verzehren eines *Colymbus* in den Darm von *Gypagus papa* gelangt ist.

3) Synonymie: *Halysis perlata* ZEDER 1803; *Taenia tenuis* CREPLIN 1829 scheint identisch mit *M. perlatus* GOEZE zu sein, ebenso *Taenia chrysaeti* VIBORG, wie DIESING 1850 bereits andeutet. Synonym ist ebenfalls *T. margaritifera* CREPLIN 1829.

3. Fam. *Anoplocephalidae* (R. BL.).

Kopf meist kuglig; seltner gestreckt, unbewaffnet; Saugnäpfe verhältnismäßig groß; Hals fehlt; Glieder kurz und breit; Parenchymmuskulatur sehr stark entwickelt. Genitalien einfach oder doppelt; Genitalpori randständig. Eier oft mit einem birnförmigen Apparat. In Säugetieren und Vögeln.

1. Subfam. *Anoplocephalinae* R. BLANCH.

Anoplocephaliden mit sackförmigem, gelapptem oder mehr oder weniger stark verzweigtem, selten netzförmigem Uterus. In Säugetieren und Vögeln.

Gatt. *Bertia* R. BLANCHARD 1891.

Strobila kurzgliedrig. Genitalporen alternierend, regelmäßig oder unregelmäßig. Die Geschlechtsgänge gehen dorsal an den beiden Excretionsgefäßen und dem Markstrang vorbei. Die Hoden liegen der Hauptmasse nach dem Vorderrand und der Dorsalfläche der Glieder genähert und bilden ein ununterbrochenes Feld zwischen den beiden Längsgefäßen. Keimstock und Dottersack verschieben sich von der Medianlinie mehr oder weniger nach der Penisseite. Der Uterus ist ein transversales Rohr, welches blinde, taschenförmige Anhänge nach vorn und hinten treibt. Eier mit oder ohne birnförmigem Apparat. In Säugetieren und Vögeln.

Typische Art: *Bertia studeri* R. BLANCH.

Columbiformes.

Bertia delafondi (RAILLIET) 1892¹⁾, STILES 1896, FUHRMANN 1901a, 1902b, WOLFFHÜGEL 1904.

Coraciiformes.

Bertia pinguis FUHRMANN 1904c.

1) V. LINSTOW 1892a und MEGNIN 1891 haben diese Taenie fälschlich unter dem Namen *T. sphenocéphala* RUD. beschrieben. Meine Untersuchung der Originale hat aber gezeigt, daß letztere eine typische *Hymenolepis*-Art ist.

Gatt. *Cittotaenia* RIEHM 1881.

Synonym: *Coelodela* SHIPLEY.

Strobila kurzgliedrig. Genitalpori und Geschlechtsdrüsen doppelt. Uterus einfach, ein querer röhrenförmiger Schlauch mit nach vorn und hinten gerichteten Divertikeln. Die Geschlechtsgänge kreuzen die Excretionsgefäße und Nerven dorsal. Birnförmiger Apparat meist vorhanden. In Säugetieren und Vögeln.

Typische Art: *Cittotaenia latissima* RIEHM.

SHIPLEY (1900) hat für *T. kuvaria* SHIPLEY das neue Genus *Coelodela* begründet, welches aber, wie meine Untersuchung des Originalmaterials zeigt, in allen seinen Charakteren identisch ist mit *Cittotaenia* RIEHM und deshalb als Synonym dieses Genus aufzufassen ist, s. FUHRMANN (1902b).

Rheiformes.

Cittotaenia rheae FUHRMANN 1904c.

Columbiformes.

Cittotaenia kuvaria (SHIPLEY) 1900b, FUHRMANN 1901a, 1902b, 1905a.

Anseriformes.

Cittotaenia avicola FUHRMANN 1897.

Psittaciformes.

Cittotaenia psittacea FUHRMANN 1904c.

Gatt. *Moniezia* R. BLANCHARD 1891.

Synonym: *Paronia* DIAMARE 1900a.

Strobila meist kurzgliedrig. Genitalporen, Geschlechtsdrüsen und Uterus doppelt. Die Geschlechtsgänge kreuzen dorsal die Längskanäle und Markstränge. Eier meist mit gut entwickeltem birnförmigem Apparat. In Säugetieren und Vögeln.

Typische Art: *Moniezia expansa* (RUD.).

Wir kennen aus Vögeln 5 verschiedene Arten dieses für Wiederkäufer so typischen Cestoden-Genus. Es zeigen die Vertreter, welche in drei verschiedenen Vogelgruppen hausen, eine etwas weniger spezialisierte Organisation als die Säugetier-Moniezien (FUHRMANN 1902b). DIAMARE war der erste, der eine diesem Genus angehörende Art in Vögeln fand, er beschrieb dieselbe aber (1900d) unter dem neuen Genusnamen *Paronia*, der also, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials ergeben, als Synonym zu *Moniezia* BL. einzuziehen ist.

Columbiformis.

Moniezia columba FUHRMANN 1902b.¹⁾

Psittaciformes.

Moniezia carrinoi (DIAMARE) 1900a²⁾, FUHRMANN (*P. carrinoi*) 1901a, 1902b

Moniezia ambigua FUHRMANN 1902b

Moniezia beauforti v. JANICKI 1906.

Coracciformes.

Moniezia variabilis FUHRMANN 1904c.

Gatt. *Aporina* FUHRMANN 1902a.

Anoplocephaliden mit einfachem Geschlechtsapparat. Die weiblichen Geschlechtsorgane sind dem Proglottidenrande, nach welchem unregelmäßig abwechselnd die Vagina zieht, genähert. Die dorsal gelegenen Hoden sind sehr zahlreich hauptsächlich seitlich in der ganzen Länge der Proglottis gelegen;

1) Synonym: *Paronia carrinoi* DIAMARE ex parte.

2) Diese Taenie wurde von DIAMARE unter dem Namen *Paronia carrinoi* beschrieben; die Untersuchung des Originalmaterials der äußerst mangelhaft beschriebenen *T. trichoglossi* v. LINSTOW 1888 hat ergeben, daß sie identisch ist mit *Paronia carrinoi* DIAMARE. Ob nun aber der Name *M. trichoglossi* v. LINSTOW als Artnamen aufzufassen, wie M. BRAUN in einer Fußnote meiner Arbeit anführt, scheint zweifelhaft, nachdem v. LINSTOW 1902 selbst sagt, daß der Name *T. trichoglossi* nicht als Artnamen aufzufassen ist, sondern daß derselbe im Sinne RUDOLPHI's bedeutet: unsichere Form aus *Trichoglossus*.

sie finden sich ebenfalls zahlreich außerhalb der Längsgefäße des Excretionssystems, dagegen sind sie median sehr spärlich. Die Geschlechtsgänge gehen über die Excretionsstämme und vereinigen sich, ohne auszumünden (?). Der Uterus ist median, wo der Uteringang einmündet, sehr eng, so daß zwei Uteri vorgetäuscht werden; er bildet beiderseits hinten ein charakteristisches Cöcum, das über das Wassergefäßsystem weggeht und außerhalb und parallel demselben nach vorn verläuft. Eier zwei Schalen. In Vögeln.

Typische Art: *Aporina alba* FUHRMANN 1902a.

WOLFFHÜGEL (1904) und JANICKI 1904 haben, ersterer bei einer Vogel-*Bertia*, letzterer bei zwei Säugetier-*Hymenolepis*-Arten ebenfalls die Tatsache des Fehlens eines Genitalporus konstatiert. WOLFFHÜGEL bezeichnet diese Erscheinung bei *Bertia delafondi* als eine individuelle Abweichung, welche das Bestreben der Einführung der Selbstbefruchtung andeutet. JANICKI faßt diese Erscheinung ebenfalls als eine individuelle Variation auf, der kein systematischer Wert zukommt, und er spricht deshalb dem Genus *Aporina* die Berechtigung ab. Nun ist aber *Aporina alba* nicht nur durch den Mangel eines Genitalporus charakterisiert, sondern zeigt noch andere anatomische Eigentümlichkeiten (s. 1902b), welche es nicht erlauben, wie JANICKI anzunehmen scheint, obige Form dem Genus *Bertia* einzuverleiben: es sind dies vor allem die Disposition der Hoden und der Bau des Uterus. Sollte also bei andern Exemplaren von *A. alba* Genitalpori nachgewiesen werden, so bleibt trotzdem das Genus bestehen, ist dann allerdings nach einem Charakter benannt, den es nur ausnahmsweise besitzt, was aber nach den Nomenklaturregeln nicht erlaubt, dem Genus einen andern Namen zu geben. Übrigens ist dies eine Erscheinung, die bei alten Genera sehr oft anzutreffen ist.

Psittaciformes.

Aporina alba FUHRMANN 1902a, 1902b.

2. Subfam. *Linstowinae* FUHRMANN.

Anoplocephaliden, deren Uterus wie bei *Davainea* in zahlreiche Kapseln zerfällt. In Säugetieren und Vögeln.

Gatt. *Zschokkea* FUHRMANN.

Strobila kurzgliedrig. Geschlechtsöffnungen einseitig. Äußeres Parenchym und Parenchymmuskulatur sehr stark entwickelt. Die dorsalen Excretionsstämme außerhalb der Ventralen gelegen und unter sich verbunden durch ein peripheres Netz von feinen Gefäßen. Die Geschlechtsgänge gehen unter den Wassergefäßen und über dem Längsnerven durch. Cirrusbeutel schwach; Hoden dorsal in der ganzen Proglottis verteilt. Die weiblichen Geschlechtsdrüsen sind auf der Porusseite zwischen dorsalem und ventralem Wassergefäß gelegen. Uterus löst sich in Eikapseln auf. In Vögeln.

Typische Art: *Zschokkea linstowi* (PARONA).

Galliformes.

Zschokkea linstowi (PARONA) 1885¹⁾, FUHRMANN 1901a, 1902b.

4. Fam. *Davaineidae* FUHRMANN.

Scolex mit Rostellum, bewaffnet mit sehr zahlreichen hammerförmigen Haken; Saugnapfränder meist mit kleinern Häkchen besetzt. Genitalorgane einfach oder doppelt, einseitig, beiderseitig oder alternierend ausmündend. Eier in einem sackförmigen Uterus oder in Eikapseln im Parenchym zerstreut oder in einem Paruterinorgan vereinigt. In Säugetieren und Vögeln.

1. Subfam. *Ophryocotylinae* FUHRMANN.

Rostellum von sehr bedeutendem Durchmesser. Saugnäpfe nur am Vorderrande bewaffnet. Uterus sackförmig. In Vögeln.

Gatt. *Ophryocotyle* FRIIS 1869.

Kopf mit sehr breitem, einfach gebautem retraktilem Rostellum, das bei gewissen Kontraktions-

1) Diese Art wurde von mir zunächst als zum Genus *Linstowia* gehörig beschrieben, während PARONA 1900a sie ins Genus *Hymenolepis* stellte.

zuständen mehrere Vertiefungen aufzuweisen scheint, es ist bewaffnet mit einer doppelten Reihe sehr zahlreicher kleiner hammerförmiger Haken. Die 4 Saugnäpfe am Vorderrande mit einigen Querreihen von Häkchen bewaffnet. Genitalporen unregelmäßig alternierend. Uterus sackförmig leicht gelappt. In Vögeln.

Typische Art: *Ophryocotyle proteus* FRIIS 1869.

Aus der Beschreibung der Autoren scheint es, als ob kein Rostellum vorhanden, sondern nur eine vordere Verbreiterung des Scolex, welche mit 5 Vertiefungen versehen und von Häkchen bewaffnet ist. Die Untersuchung des Originalmaterials von *O. insignis* LÖNNBERG hat aber obige Diagnose ergeben und gezeigt, daß *Ophryocotyle* ein den Davaineiden angehöriges Cestoden-Genus ist, dessen Uterus sich nicht in Parenchymkapseln auflöst.

Charadriiformes.

Ophryocotyle proteus FRIIS 1869¹⁾, VILLOT 1875 (*Oph. lacazii* VILLOT), BLANCHARD 1891a

Ophryocotyle insignis LÖNNBERG 1890, BLANCHARD 1891a.

Lariformes.

Ophryocotyle proteus FRIIS 1869.²⁾

Passeriformes.

Ophryocotyle zeylanica v. LINSTOW 1906a.³⁾

2. Subfam. Davaineinae BRAUN.

Die 4 Saugnäpfe des Scolex am Rande mit mehreren Ringen feiner Häkchen besetzt. Der Uterus löst sich in zahlreiche im Parenchym gelegene Eikapseln auf.

1) *Oph. lacazii* VILLOT ist nach BLANCHARD 1891a sicher identisch mit *Oph. proteus* FRIIS.

2) Das Vorkommen dieser Art in *Larus canus* scheint mir fraglich, und FRIIS, der allein diesen Wirt konstatiert, hatte vielleicht eine andere Art vor sich.

3) Diese Art zeigt, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials ergeben, keine doppelten Genitalporen, wie v. LINSTOW angibt, sondern die Geschlechtsöffnungen liegen unregelmäßig abwechselnd.

Gatt. *Davainea* R. BLANCHARD 1891.

Synonymie: *Bothriotaenia* RAILLIET 1892b.

Scolex bewaffnet mit einem Rostellum ohne Muskeltasche. Dasselbe trägt zwei Kränze sehr zahlreicher kleiner Haken von Hammerform. Saugnäpfe bewaffnet mit mehreren Reihen feiner Häkchen. Genitalporen einseitig oder unregelmäßig alternierend. Uterus sich in Eikapseln auflösend, die ein oder mehrere Eier enthalten. In Säugetieren und Vögeln.

Typische Art: *Davainea proglottina* (DAV.).

Dem Genus *Davainea* ist synonym *Bothriotaenia* RAILLIET 1892b, indem, wie LÜHE 1899 (p. 40) nachzuweisen sucht, der Typus dieses Genus *Bothriotaenia longicollis* MOLIN keine Bothriocephalide, sondern höchstwahrscheinlich eine *Davainea* ist. Ferner wurde von MONTICELLI 1893 für die *T. tauricollis* das Genus *Chapmania* aufgestellt, und da diese Art für eine *Davainea*-Art gehalten, wurde *Chapmania* als Synonym zu *Davainea* aufgefaßt, was aber nicht zutreffend ist.

Von dem artenreichen Genus *Davainea* wurden zuerst unter Subgenusnamen *Capsodavainea* FUHRMANN 1901c und unter dem Namen *Chapmania* (MONTICELLI 1893) FUHRMANN 1906a eine Vogel-*Davainea*-Art, *Davainea tauricollis* CHAPM. FUHRMANN 1896, abgetrennt (siehe Genus *Chapmania*).

COHN (1901) hat vorgeschlagen, das Genus *Davainea* aufzuteilen, doch scheint mir dies bei der großen Homogenität der Gattung ein schwieriges und unnützes Beginnen zu sein. Ich fasse das Genus *Davainea* trotz der sekundären Auflösung des Uterus in Kapseln wegen des Baues des Rostellums und seiner Bewaffnung mit sehr zahlreichen und sehr kleinen Haken als vielleicht das älteste Cestoden-Genus, mit einem Rostellum und Haken bewaffneten Scolex auf. Diese Annahme findet ihre Stütze in der Verbreitung dieser Taenien, indem die ältesten Vogelgruppen Struthioniformes, Casuariformes, Crypturiformes und Galliformes ausschließlich oder fast ausschließlich von *Davainea*-Arten bewohnt werden. Zahlreiche *Davainea*-Arten haben noch die Columbiformes und Psittaciformes.

Struthioniformes.

Davainea struthionis (HOULTUYN) 1773, PARONA 1885, LINSTOW 1893a.

Rheiformes.

Davainea struthionis (HOULTUYN) 1773.

Casuariformes.

Davainea australis (KRABBE) 1869, BLANCHARD 1891a.

Crypturiformes.

Davainea oligacantha FUHRMANN 1908c

Davainea elongata FUHRMANN 1908c

Davainea capillaris FUHRMANN 1908c

Davainea crypturi FUHRMANN 1908c.

Galliformes.

Davainea urogalli (MODEER) 1790¹⁾; KRABBE 1869, 1882, BLANCHARD 1891a

Davainea cesticillus (MOLIN) 1858¹⁾; KRABBE 1869, BLANCHARD 1891a, STILES 1896; RANSOM 1905

Davainea tetragona (MOLIN) 1858, KRABBE 1882, DIAMARE 1893, BLANCHARD 1891a, STILES 1896, RANSOM 1904, RANSOM 1905

Davainea ? *longicollis* (MOLIN) 1858²⁾

Davainea cantaniana (POLONIO) 1860³⁾, BLANCHARD 1891a, STILES 1896, RAILLIET 1899b

Davainea proglottina (DAVAINE) 1860; BLANCHARD 1891a; STILES 1896

Davainea proglottina var. *dublanensis* KOWAL. 1895

Davainea circumvallata (KRABBE) 1869⁴⁾, CRETY 1890a (*Dav. pluriuncinata* CRETY), BLANCHARD 1891a; MOLA 1907.

1) Nach unserer Untersuchung des Originalmaterials ist *Davainea clava* (BAIRD) 1853 synonym zu *Dav. urogalli* (MODEER).

Dieser Cestode wurde von DUJARDIN 1845 als *T. infundibuliformis* GOEZE beschrieben.

2) Wie schon oben bemerkt, beschrieb MOLIN 1858 diesen Cestoden unter dem Namen *Bothriocephalus* und schuf RAILLIET 1892b das Genus *Bothriotaenia* mit obigem Typus. Nach STILES 1896, LÜHE 1899 ist der betreffende Cestode wohl sicher eine *Davainea*, und es scheint mir wahrscheinlich, daß sie synonym ist mit einer der zahlreichen Hühnerdavaineen, sehr wahrscheinlich mit *Davainea tetragona* (MOLIN).

3) Dieser typische Cestode ist von MAGALHAES 1898 unter dem Namen *Dav. oligophora* MAG. 1898 beschrieben worden und ist, wie RAILLIET 1899b nachweist, synonym mit *Dav. cantaniana* POLONIO.

4) BLANCHARD 1891a weist nach, daß *Dav. pluriuncinata* CRETY 1890 synonym ist zu *Dav. circumvallata* KRABBE.

Davainea friedbergi v. LINSTOW 1878 ¹⁾, BLANCHARD 1891a; STILES 1896
Davainea echinobothrida MEGNIN 1881 ²⁾; PIANA 1882 (*T. bothrioplitis*);
 BLANCHARD 1891a; STILES 1896; RANSOM 1904; RANSOM 1905
Davainea globocaudata COHN 1901
Davainea mutabilis RÜTHER 1901 ³⁾
Davainea parechinobothrida MAGALH. 1898 ⁴⁾
Davainea retusa CLERC 1903
Davainea volzi FUHRMANN 1905a
Davainea pintneri KLAPTOCZ 1906
Davainea globirostris FUHRMANN 1908c
Davainea leptacantha FUHRMANN 1908c
Davainea polyuterina FUHRMANN 1908c
Davainea campanulata FUHRMANN 1908c
Davainea penelopina FUHRMANN 1908c.

Ralliformes.

Davainea brachyrhyncha (CREPLIN) 1853. ⁵⁾ •

Charadriiformes.

Davainea minuta COHN 1901

Columbiformes.

Davainea crassula (RUD.) 1819 ⁶⁾, KRABBE 1869, 1882, CLERC 1906b,
 BLANCHARD 1891a (*D. columbae* ZEDER), STILES 1896

1) Dieser von FRIEDBERGER 1877 beschriebene und von v. LINSTOW 1878 benannte Cestode wurde von MEGNIN unter dem Namen *Taenia agama* MEGNIN 1878 beschrieben, den er dann im selben Jahre vorschlug *Taenia infundibuliformis* var. *phasianorum* MEGNIN zu nennen (s. STILES 1896). Nach BLANCHARD 1899a ist auch *Dav. guevillensis* MEGNIN 1898 identisch mit *Dav. friedbergi* v. LINST.

2) Nach RANSOM (1904) ist *Dav. bothrioplitis* PIANA 1882 identisch mit *Dav. echinobothrida* MEGNIN 1881 und nicht mit *Dav. tetragona* (MOLIN).

3) *Davainea mutabilis* RÜTHER scheint mir ohne Zweifel keine neue Art, sondern mit einer der längstbekanntesten Hühnerdavaineen identisch zu sein. Die Beschreibung ist aber eine so mangelhafte, daß nicht mit Sicherheit zu sagen, ob dieser Cestode wirklich, wie ich vermute, mit *Dav. cesticillus* (MOLIN) identisch ist.

4) *Dav. parechinobothrida* MAGALH. ist vielleicht, wie RANSOM 1904 angibt, identisch mit *Dav. tetragona*.

5) *Taenia brachyrhyncha* CREPLIN ist, wie meine Untersuchung des Originalmaterials gezeigt, eine *Davainea*.

6) *Davainea crassula* (RUD.) ist vielleicht synonym zu *T. columbae* ZEDER 1800, da aber letzterer Cestode nur sehr mangelhaft beschrieben und das Originalmaterial nicht mehr vorhanden, ist es wohl richtiger, den Namen RUDOLPHI's beizubehalten, da wir von demselben das Originalmaterial besitzen.

- Davainea insignis* (STEUDENER) 1877, BLANCHARD 1891a
Davainea columbae FUHRMANN 1908c
Davainea micracantha FUHRMANN 1908c
Davainea cryptacantha FUHRMANN 1908c
Davainea goura FUHRMANN 1908c
Davainea paucitesticulata FUHRMANN 1908c.

Ciconiiformes.

- Davainea circumcincta* (KRABBE) 1869, BLANCHARD 1891a.

Anseriformes.

- Davainea anatina* FUHRMANN 1908c.

Accipitres.

- Davainea sphaeroides* CLERC 1902b, 1903
Davainea hertwigi MOLA 1907a.

Psittaciformes.

- Davainea* (?) *longissima* GOEZE 1782¹⁾
Davainea leptosoma (DIES.) 1850, KRABBE 1869, BLANCHARD 1891a,
 FUHRMANN 1896
Davainea macroscolecina FUHRMANN 1908c
Davainea microscolecina FUHRMANN 1908c.

Coccygiformes.

- Davainea difformis* (RUD.) 1819²⁾
Davainea calcaria FUHRMANN 1908c
Davainea undulata FUHRMANN 1908c
Davainea macrocirrosa FUHRMANN 1908c.

1) Diese Taenie wurde von RUDOLPHI mit dem Namen *T. filiformis* RUD. 1809 belegt und nach GOEZE's Angaben beschrieben, welcher diese Taenie *Taenia longissima* GOEZE 1782 nannte. Der allgemein angenommene Name *T. filiformis* RUD. sollte deshalb durch die GOEZE'sche Benennung ersetzt werden. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine *Davainea*, und vielleicht ist *T. longissima* synonym zu *Dav. leptosoma* DIES. Da die Typen nicht mehr existieren, ist diese Art wohl besser zu streichen.

2) RUDOLPHI nannte diese Art *T. difformis* RUD. 1819; sie ist, wie er selbst sagt, identisch mit *Taenia brevicollis* FRÖLICH. In der RUDOLPHI'schen Sammlung finden sich in Glas No. 1906 die Typen dieses Cestoden, deren Untersuchung gezeigt, daß es ein Vertreter des Genus *Davainea* ist. Ich behalte den Namen, zu welchem die Typen existieren, bei.

Coraciiformes.

Davainea magnicoronata FUHRMANN 1908c.

Pici.

Davainea frontina DUJ. 1845, KRABBE 1869, BLANCHARD 1891a

Davainea cruciata (RUD.) 1819¹⁾

Davainea lutzi PARONA 1901

Davainea longispina FUHRMANN 1908c.

Passeriformes.

Davainea spinosissima v. LINST. 1893b

Davainea corvina FUHRMANN²⁾ 1905a

Davainea compacta CLERC 1906b³⁾

Davainea paradisea FUHRMANN 1908c

Davainea uniterina FUHRMANN 1908c

Davainea globocephala FUHRMANN 1908c.

1) Die Original Exemplare von *Davainea cruciata* (RUD.) sind noch sehr jung und nur 7 mm lang, die Untersuchung der Scoleces hat aber ergeben, daß deren Bewaffnung sehr ähnlich, aber nicht identisch ist mit denjenigen von *Davainea frontina* (DUJ. 1845). Der von CLERC 1903 als *Davainea frontina* beschriebene Cestode gehört wohl einer andern Art an, indem hier die Haken 0,014 mm lang sein sollen, während sie bei der wirklichen *Dav. frontina* nur 0,007—0,01 mm lang sind. Es nähert sich der Cestode CLERC's in der Größe der Haken *Davainea lutzi* PARONA 1901. — *T. crenata* GOEZE 1782 scheint mir nicht, wie DIESING 1850 annimmt, identisch zu sein mit *T. crateriformis*, sondern mit *T. cruciata* RUD.; der Entscheid ist aber nicht sicher zu treffen, so daß ich keine Namensänderung eintreten lasse (siehe auch FUHRMANN 1908c).

2) v. LINSTOW beschreibt unter dem Namen *Davainea polycalcaria* v. LINSTOW 1906 einen Cestoden, welcher trotz der mangelhaften Beschreibung sicher identisch ist mit *Davainea corvina* FUHRMANN 1905a.

3) Aus *Oriolus galbula* kennen wir 2 Davaineen, welche sehr wahrscheinlich identisch sind, d. h. der in der CREPLIN'schen Sammlung sich findende und von KRABBE als *Dav. frontina* bezeichnete Cestode ist wohl nichts anderes als *Dav. compacta* CLERC, so daß also *Dav. frontina* nur in Coraciiformes und nicht auch in Passeriformes parasitiert. Exemplare einer *Davainea* aus *Oriolus galbula*, welche ich in meiner Sammlung mit dem Namen *D. frontina* bezeichnet besitze, sind in der Tat nicht identisch mit dieser Art, sondern stimmen mit *Dav. compacta* CLERC überein.

Gatt. *Polycoelia* FUHRMANN.

Cestoden mit einfach gebautem, von drei Hakenreihen bewaffnetem Rostellum; Glieder viel breiter als lang. Rindenparenchym und Muskulatur sehr stark entwickelt. Das dorsale Paar der Excretionslängsstämme fehlt. Die Genitalporen sind einseitig. Die Geschlechtsgänge gehen über dem ventralen Excretionsstamm durch. Die weiblichen Genitaldrüsen sind stark poralwärts verschoben und transversal angeordnet, so daß vom Rand nach innen zunächst Ovarium, dann Schalendrüse und darauf Dotterstock folgen. Die Eier sind in Parenchymkapseln gelegen.

Typische Art: *Polycoelia lata* FUHRMANN 1901a.

Diese Art wurde zuerst als *Linstowia lata* beschrieben trotz einiger Unterschiede in den Charakteren. Aber wie ZCHOKKE (1904) betont, stört diese Form die Einheitlichkeit des Genus *Linstowia* bedeutend, so daß ich mich veranlaßt sehe, ein neues Genus zu begründen, und dies namentlich auch, weil KLAPTOCZ bei dieser Art ein Rostellum mit kräftiger Muskulatur gefunden, und auch, weil ich mich veranlaßt sehe, den Cestoden anders zu orientieren.

Was nun zunächst das Rostellum anbetrifft, das KLAPTOCZ (1906) auf Schnitten deutlich konstatiert, so habe ich es ebenfalls vor kurzem an neuem Material gesehen, aber nicht hakenlos, sondern mit 3 Reihen von *Davainca*-Haken bewaffnet.

Bei erneuter Betrachtung der Schnitte und der fig. 20 (FUHRMANN 1902b) scheint es mir richtiger, das, was ich als ventrale Seite des Wurmes angesehen, als dorsale zu bezeichnen. Die Entscheidung ist etwas schwierig, da nur das ventrale weite Längsgefäß des Excretionssystems vorhanden und das dorsale, wie auch KLAPTOCZ nachgewiesen, vollkommen fehlt. Die Lage des Schluckapparats des Keimstockes, der Schalendrüsen und des Dotterganges veranlassen mich zu dieser neuen Interpretation; allerdings würden dann die sonst ganz dorsalen Hoden etwas ventral verschoben sein. Die Geschlechtsgänge gehen also nicht, wie ich früher geschrieben, unter, sondern über Excretionsgefäß und Nervensystem durch.

Galliformes.

Polycoelia lata FUHRMANN 1901a, 1902b, KLAPTOCZ 1906.

Gatt. *Cotugnia* DIAMARE 1893b (FUHRMANN) 1901c.

Rostellum und Form der Haken wie bei *Davainea*. Strobila kurzgliederig. Parenchymmuskulatur aus mehreren Lagen von Längsbündeln bestehend, zwischen welchen Transversalfasern verlaufen. Geschlechtsorgane doppelt. Die Geschlechtsgänge gehen beiderseits über die Excretionsstämme und den Hauptlängsnerven. Die Hoden liegen median, sind aber auch lateral, dorsal von den weiblichen Geschlechtsdrüsen, bis über die Excretionsstämme hinaus zu finden. Jeder Cirrusbeutel kann seine abgegrenzte Hodengruppe haben. Die Eier werden wie bei *Davainea* in Parenchymkapseln verteilt. In Vögeln.

Typische Art: *Cotugnia digonopora* (PASQ.) 1890.

Dieses Genus wurde von DIAMARE aufgestellt, aber nur unvollständig charakterisiert, so daß BRAUN 1900 dasselbe in der Unterfamilie der *Dipylidiinae* unterbrachte, während, wie die nähere Untersuchung gezeigt (FUHRMANN 1901c), die *Cotugnia*-Arten typische doppelporige *Davainea* sind und die Gattung also in die Unterfamilie der *Davaineinae* zu stellen ist.

Casuariformes.

Cotugnia collini FUHRMANN 1908c.

Galliformes.

Cotugnia digonopora (PASQUALE) 1890, STILES 1896

Cotugnia crassa FUHRMANN 1908.¹⁾

Columbiformes.

Cotugnia inaequalis FUHRMANN 1908c

Cotugnia polyacantha FUHRMANN 1908c.

2. Subfam. *Idiogeninae* FUHRMANN.

Davaineiden, welche ein Parauterinorgan besitzen, in welches die Eier vom Uterus oder von Parenchymkapseln aus eindringen.

1) Von v. LINSTOW 1901 als *T. linstowi* PARONA bezeichnet.

Gatt. *Idiogenes* KRABBE 1868.

Kleine Cestoden, deren Scolex in Form und Bewaffnung mit demjenigen der Davaineen identisch ist. Genitalporen unilateral. Cirrusbeutel sehr groß mit Retractor. Vor dem gelappten Uterus eine dichte Parenchymmasse, ein Parauterinorgan, in welches die Eier meist spät hineingedrängt werden. Es bildet sich eine starkwandige Kapsel. In Vögeln.

Typische Art: *Idiogenes otidis* KRABBE 1868.

Neuerdings hat man den schon lange gesuchten Scolex von *I. otidis* gefunden und hat es sich herausgestellt, daß derselbe identisch ist in Struktur und Bewaffnung mit demjenigen der *Davainca*-Arten, so daß also diese Gattung in die Familie der *Davaincidae* zu stellen ist.

Der von ZSCHOKKE beschriebene Pseudoscolex existiert wohl nicht. Ebenso ist die Anatomie namentlich des Uterus und das Parauterinorgan von dem betreffenden Autoren wie auch von VOLZ (1900) nicht richtig dargestellt worden. Daß, wie KOWALEVSKI 1906 annimmt, *I. otidis*, *I. grandiporus* und *I. flagellum* nur Varietäten einer und derselben, für die Trappen so charakteristischen Cestoden-Species sind, halte ich nicht für zutreffend, auf jeden Fall ist diese Annahme nicht für *I. flagellum* geltend, während wohl *I. grandiporus* identisch ist mit *I. flagellum*, entgegen der Ansicht CHOLODKOVSKY'S 1906.

Gruiformes.

Idiogenes horridus FUHRMANN 1908c.

Otidiformes.

Idiogenes otidis KRABBE 1868¹⁾; ZSCHOKKE 1888b

Accipitres.

Idiogenes flagellum (GOEZE) 1782²⁾, VOLZ 1900 (*T. mastigophora* KRABBE), FUHRMANN 1906a.

1) CHOLODKOVSKY 1905, 1906 beschrieb eine neue *Idiogenes*-Art, *I. grandiporus* CHOLODKOVSKY, welche aber identisch mit *I. otidis* KRABBE ist (siehe auch KOWALEVSKI 1906).

2) Synonymie: *Halysis flagellum* ZEDER 1803; mich stützend auf Zool. Jahrb., Supplement X.

Gatt. *Chapmania* MONTICELLI 1893 (FUHRMANN 1906a).

Synonymie: *Capsodavainea* FUHRMANN 1901c.

Cestoden, deren Scolex in Form und Bewaffnung demjenigen der Davaineen identisch ist. Die Eier gelangen in einen stark verzweigten Uterus und von da wie bei *Davainea* in Parenchymkapseln, worauf sie in abgelösten Gliedern in ein am Vorderrand gelegenes breites, großes Paruterinorgan gepreßt werden, das eine Kapsel um sie bildet. Die Längsmuskulatur sehr mächtig, besteht aus mehreren Lagen von Längsmuskelbündeln.

Typische Art: *Chapmania tauricollis* (CHAPM. 1876).

Dieses von MONTICELLI 1893 und später genauer von mir (1906a) charakterisierte Genus ist von CLERC 1906b aufgehoben und mit *Idiogenes* vereinigt worden. Nun sind aber die typischen *Idiogenes*-Arten kleine, dünne, schwach muskulöse Formen, während die *Chapmania*-Arten relativ große dicke Cestoden sind, welche eine überaus mächtige Längsmuskulatur besitzen, welche an die der Anoplocephaliden erinnert. Außerdem löst sich bei *Chapmania* der Uterus auf und gelangen die Eier ins Parenchym, bevor sie in das Paruterinorgan gestoßen werden.

Rheiformes.

Chapmania tauricollis (CHAPMAN) 1876b¹⁾, FUHRMANN 1896 (*Davainea tauricollis* CHAP.).

Otidiformes.

Chapmania tapica (CLERC) 1906b (*Idiogenes tapika*).

die irreführende Beschreibung von VOLZ, schuf ich eine *Chapmania longicirrosa* FUHRMANN 1906a für eine *Taenia* aus *Milvus*, welche nach Studium der Originalpräparate von Dr. VOLZ sich als identisch mit *I. flagellum* herausstellte, von welcher aber der typische Davaineen-Scolex bis jetzt nicht bekannt war und von mir gefunden wurde.

1) Diese Art wurde von ZSCHOKKE 1888a sehr mangelhaft unter dem Namen *T. argentina* ZSCHOKKE beschrieben. Die Beschreibung wurde später von mir (1896) berichtigt und ein besonderes Subgenus und später Genus für diese Form geschaffen (s. oben).

5. Fam. *Dilepinidae* FUHRMANN.

Cestoden mit, selten ohne bewaffnetes Rostellum. Saugnäpfe unbewaffnet. Genitalpori randständig. Geschlechtsorgane in jeder Proglottis einfach oder doppelt. Uterus sehr verschiedengestaltet. In Säugetieren und Vögeln.

1. Subfam. *Dilepinae* FUHRMANN.

Dilepinidae mit sackförmigem oder gelapptem einfachem Uterus. In Säugetieren und Vögeln.

Gatt. *Dilepis* WEINLAND 1858.

Rostellum mit zwei Hakenkränzen. Genitalpori einseitig. Hoden am Hinterende der Proglottis. Uterus sackförmig. In Vögeln und Säugetieren.

Typische Art: *Dilepis undula* (SCHRANK) 1788.

Synonymie: *T. angulata* RUD. 1809 (siehe unten).

Mit dem Genusnamen *Dilepis* wurden von COHN 1899a zuerst die 10hakigen *Hymenolepis*-Arten bezeichnet, es stellte sich aber dann heraus, daß der Typus des Genus mehr als 10 Haken hat und nicht dreihodig ist. Es stellte dann COHN 1900b obige Diagnose für die Gattung auf.

Gruiformes.

Dilepis macrocephala FUHRMANN 1908b.

Charadriiformes.

Dilepis retirostris (KRABBE) 1869

Dilepis nymphoides CLERC 1903

Dilepis unilateralis FUHRMANN 1908b

Dilepis recapta CLERC 1906b

Dilepis limosa FUHRMANN 1907a.

Steganopodes.

Dilepis scolecina (RUD.) 1819; KRABBE 1869.

Lariformes.

Dilepis? *cylindrica* CLERC 1902, 1903.

Ciconiiformes.

- Dilepis campylancristota* (WEDL) 1856¹⁾, KRABBE 1869 (*T. unilateralis*),
CLERC 1906b (*Dilepis unilateralis*)
Dilepis urceus (WEDL) 1856, KRABBE 1869
Dilepis transfuga (KRABBE) 1869
Dilepis hoplites (v. LINSTOW) 1903
Dilepis bicoronata FUHRMANN 1908b
Dilepis crassirostrata FUHRMANN 1908b
Dilepis lobata FUHRMANN 1907a
Dilepis papillifera FUHRMANN 1908b
Dilepis? *nasuta* FUHRMANN 1908b.

Accipitres.

- Dilepis oligorhida* FUHRMANN 1906a.

Coraciiformes.

- Dilepis caprimulgorum* FUHRMANN 1908b.

Passeriformes.

- Dilepis undula* SCHRANK 1788²⁾, KRABBE 1869 (*T. undulata* RUD.); VOLZ 1900 [*Dilepis angulata* (RUD.) und *Dilepis undulata* (RUD.)].

1) Die Untersuchung des Originalmaterials von RUDOLPHI hat gezeigt, daß der Typus des von KRABBE und CLERC als *Dilepis unilateralis* RUD. 1819 bezeichneten Cestoden eine *Hymenolepis*-Art ist (FUHRMANN 1906c) und daß deshalb die als Synonym zu obiger Art bezeichnete *Taenia campylancristota* WEDL 1856 als Artbezeichnung angenommen werden muß.

2) Die Untersuchung des Originalmaterials hat COHN gezeigt, daß *T. undula* SCHRANK 1788, *T. undulata* RUD. 1809 und *T. angulata* RUD. 1809 (VOLZ 1900) ein und dieselbe Art sind. COHN 1901, welcher die Synonymie dieser letztern genau bespricht, tat dies leider in wenig klarer Weise. Außer obigen Synonymen sind aber nach DIESING's 1850 Zusammenstellung noch anzuführen die Synonyme von *T. angulata* RUD. (p. 538) und die von *T. undulata* RUD. (p. 544). Es scheint mir zwar, daß die *T. angulata* RUD., wie sie DIESING auffaßt, nach den Synonymen zu urteilen, die *T. angulata* RUD. nach KRABBE'scher 1906 Auffassung, d. h. *Taenia serpentulus*, ist. Ihre Synonyme gehören also eigentlich nicht hierher, sondern zu *H. serpentulus* SCHRANK, wo ich sie anführe. Es herrscht hier eine große Konfusion, da auch *Dundula* oder deren Synonyme bald mit einseitigen, bald mit alternierenden Genitalporen beschrieben wird. Nach DIESING ist synonym *T. undulata* RUD., d. h. *T. undula* SCHRANK, *T. serpentiformis non collaris* GOEZE 1782. Die DUJARDIN'sche *T. angulata* RUD. ist sicher synonym *D. undula* (SCHRANK). Andere Synonyme sind: *Hymenolegis undulata* RUD. PARONA 1902. VOLZ 1900 beschreibt diese Art unter den Namen *Dilepis angulata* RD. und *Dilepis undulata* RD.

Dilepis attenuata (DUJ.) 1845, v. LINSTOW 1875
Dilepis modiglianii (PARONA) 1898. ¹⁾

Gatt. *Trichocephaloides* SINITZINE 1896.

Rostellum mit einfacher Hakenkrone. Genitalpori einseitig und etwas dorsal verschoben. Hoden wenig zahlreich am Hinterrand der Proglottis. Uterus sackförmig. Eier wenig zahlreich. In Vögeln.

Typische Art: *Trichocephaloides megalcephala* (KRABBE) 1869.
 (Synonym: *T. inermis* SINITZINE 1896.)

Dieses Genus wurde von SINITZINE nach einer sehr unvollständigen Untersuchung von *T. inermis* aufgestellt. Ich konnte nachweisen (FUHRMANN 1901a), daß diese Art identisch ist mit *T. megalcephala* KRABBE. CLERC 1903 gab dann eine bessere Diagnose des Genus.

Charadriiformes.

Trichocephaloides megalcephala (KRABBE) 1869 ²⁾, CLERC 1902, 1903,
 FUHRMANN 1901a, (*Trichocephaloides inermis* SIN.).
Trichocephaloides birostrata CLERC 1906b.

Gatt. *Lateriporus* FUHRMANN 1907a.

Rostellum bewaffnet mit einem Kranz von Haken. Genitalpori einseitig. Hoden am Hinterende der Proglottis, aber auch seitlich von den weiblichen Geschlechtsdrüsen. Uterus sackförmig. In Vögeln.

Typische Art: *Lateriporus spinosus* FUHRMANN 1907a.

Anseriformes.

Lateriporus biuterinus FUHRMANN 1908b,
Lateriporus teres (KRABBE) 1869, FUHRMANN 1907a.
Lateriporus propeteres FUHRMANN 1907a.

Dilepis brachyarthra CHOLODKOVSKY 1906 ist ebenfalls synonym mit obiger Taenie. Hierher gehört wohl auch nach CHOLODKOVSKY's Angaben *Hymenolepis pyramidalis* SINITZINE.

1) Synonym: *Hymenolepis modiglianii* PARONA 1898.

2) Synonym *T. inermis* SINITZ. 1896 (s. FUHRMANN 1901a).

Ciconiiformes.

Lateriporus spinosus FUHRMANN 1908b.

Gatt. *Choanotaenia* RAILLET 1896 (COHN 1899a).

Scolex klein, bewaffnet mit einem Rostellum, das eine einfache Hakenkrone trägt. Strobila aus vielen Gliedern bestehend, die letzten oft länger als breit. Genitalpori unregelmäßig abwechselnd. Geschlechtsgänge gehen zwischen den Wassergefäßen durch. Hoden am Hinterende der Proglottis. Uterus sackförmig. In Vögeln.

Typische Art: *Choanotaenia galbulae* (ZEDER) 1803 (COHN 1901).

RAILLET 1896 schuf für *T. infundibulum* BLOCH (*T. infundibuliformis* GOEZE), die er anfangs in das Genus *Drepanidotaenia* gestellt hatte, das neue Genus *Choanotaenia* RAILLET, als dessen Typus obige Art bezeichnet ist. COHN 1899a gab dann eine gute Diagnose desselben und stellte in das Genus noch als sichere Vertreter *T. porosa* RUD. und fälschlich auch *T. serpentulus* SCHRANK, welch letztere eine *Hymenolepis*-Art ist. In seiner großen Arbeit 1901 beschreibt er genauer *Ch. galbulae* (ZEDER 1803), *Ch. gongyla* COHN, *Ch. porosa* (RUD.) und *Ch. infundibulum* (BLOCH). Nun hat es sich aber gezeigt, daß letztere Art, wie aus CRETÉY'S (1890) Beschreibung bereits hervorgeht und wie CLERC 1903 neuerdings nachgewiesen, die Charaktere des Genus *Monopylidium* FUHRMANN zeigt, dessen Typus *M. musculosum* FUHRMANN ist. Es kann also diese Art nicht länger der Typus des Genus *Choanotaenia* bleiben, und es muß für dasselbe eine andere typische Art bezeichnet werden, als welche ich die von COHN genauer beschriebene *Ch. galbulae* (ZEDER 1803) COHN 1901 vorschlage.

Apterygiformes.

Choanotaenia apterygis (BENHAM) 1900.¹⁾

Galliformes.

Choanotaenia campanulata FUHRMANN 1907a.

1) Der Autor beschreibt diese Art unter dem Genusnamen *Drepanidotaenia apterygis*.

Charadriiformes.

- Choanotaenia paradoxa* (RUD.)¹⁾ 1809; KRABBE 1869, 1882, CLERC 1903
Choanotaenia coronata (CEPLIN) 1829; KRABBE 1869
Choanotaenia laevigata (RUD.)²⁾ 1819, KRABBE 1869, CLERC 1906b
Choanotaenia aegyptica (KRABBE) 1819, CLERC 1903
Choanotaenia slesvicensis (KRABBE) 1882, CLERC 1903
Choanotaenia embryo (KRABBE) 1869
Choanotaenia stellifera (KRABBE) 1869³⁾; 1882
Choanotaenia intermedia FUHRMANN 1908a
Choanotaenia arquata CLERC 1906b.

Lariformes.

- Choanotaenia porosa* (RUD.) 1809⁴⁾; KRABBE 1869, COHN 1901, 1903
Choanotaenia inversa (RUD.) 1819⁵⁾
Choanotaenia sternina (KRABBE) 1869, CLERC 1903
Choanotaenia dodecantha (KRABBE) 1869
Choanotaenia gongyla COHN 1901
Choanotaenia rhynchopis FUHRMANN 1907a.

Podicipediformes.

- Choanotaenia bilateralis* FUHRMANN 1907a.

Anseriformes.

- Choanotaenia borealis* (v. LINSTOW)⁶⁾ 1905b.

Coraciiformes.

- Choanotaenia megacantha* (RUD.) 1819, KRABBE 1869

1) Mit dieser Art ist wohl synonym *Taenia chaotica* GIEBEL 1866.

Weiteres Synonym: *Drepanidotaenia paradoxa* RUD. PARONA 1899; SINITZINE 1896 hatte wohl nicht obige Art vor sich.

2) *T. laevigata* RUD. ist nach RUDOLPHI synonym mit *T. charadrii hiaticulae* VIBORG 1795?.

3) Als *Hymenolepis stellifera* KRABBE bezeichnet SINITZINE 1896 einen Cestoden, von welchem es sehr fraglich, ob der Autor wirklich diese Art vor sich hatte.

4) Synonym: *Drepanidotaenia porosa* RUD. STOSSICH 1898.

5) Diese Taenie ist synonym mit *T. oligotoma* RUD. 1819, welche RUDOLPHI mit dem Autornamen NITZSCH belegt; ebenso ist obige Art, wie meine Untersuchung des Originalmaterials gezeigt hat, identisch mit *Taenia gennaria* PARONA 1887a.

6) Diese Taenie wurde von v. LINSTOW als *Aporina borealis* beschrieben, sie ist aber, wie unsere Untersuchung der Originale gezeigt, eine typische *Choanotaenia*.

- Choanotaenia producta* (KRABBE) 1869¹⁾
Choanotaenia brevis CLERC 1902, 1903
Choanotaenia crassilestata FUHRMANN 1907a
Choanotaenia pauciammulata FUHRMANN 1907a.
Choanotaenia asymmetrica FUHRMANN 1907a

Passeriformes.

- Choanotaenia galbulae* (ZEDER)²⁾ 1803, COHN 1901
Choanotaenia parina (DUJ.)³⁾ 1845, KRABBE 1869, CLERC 1906b
Choanotaenia parvirostris (KRABBE) 1869
Choanotaenia macracantha FUHRMANN 1907a.

Gatt. *Anomotaenia* COHN 1900b.

Synonym: *Diplochetos* v. LINSTOW 1906a.

Cestoden mit einem Rostellum bewaffnet mit zwei Hakenkränzen. Genitalpori unregelmäßig abwechselnd. Zahlreiche Hoden am Hinterende der Proglottis. In Vögeln.

Typische Art: *Anomotaenia microrhyncha* (KRABBE 1869).

v. LINSTOW 1906a beschreibt als *Diplochetos n. g.* eine Taenie mit doppelten Genitalporen, einfachen Geschlechtsdrüsen und Uterusöffnung, welche von all diesen Charakteren nicht einen besitzt, sondern, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials gezeigt, eine *Anomotaenia* ist!

Die Arten dieses Genus sind sich anatomisch sehr ähnlich. CLERC 1903 vereinigt ohne weitere Erklärung die Vertreter der Genera *Anomotaenia* und *Choanotaenia* unter dem Gattungsnamen *Choanotaenia*, was nicht zutreffend ist. Dagegen muß wohl *Anomotaenia* mit *Dilepis* vereinigt werden.

Apterygiformes.

Anomotaenia minuta (BENHAM)⁴⁾ 1900.

1) Nach KRABBE ist *Ch. producta* KRABBE vielleicht identisch mit *T. crenata* GOEZE, nach andern Autoren ist sie identisch mit *Dav. cruciata* oder *T. crateriformis* GOEZE.

2) Synonym *T. serpentulus* (SCHRANK) ex. p. Von RUDOLPHI ist diese Taenie genannt *Taenia orioli galbulae* RUD. 1809; weiteres Synonym: *Choanotaenia serpentulus* (SCHRANK) COHN 1899a.

3) Synonym: *Drepanidotaenia parina* DUJARDIN, STOSSICH 1898.

4) BENHAM beschreibt diese Art unter dem Gattungsnamen *Drepanidotaenia*.

Ralliformes.

Anomotaenia pyriformis (WEDL) 1856; KRABBE 1869.

Charadriiformes.

Anomotaenia stentorea FRÖLICH 1799¹⁾; KRABBE 1869 (*T. variabilis* RUD.), CLERC 1903 (*Choanotaenia variabilis*)

Anomotaenia nymphaea (SCHRANK) 1790²⁾; KRABBE 1869

Anomotaenia globulus (WEDL) 1856³⁾; KRABBE 1869, CLERC 1903 (*Choanotaenia*)

Anomotaenia arionis (v. SIEBOLD) 1850⁴⁾; KRABBE 1869, CLERC 1903 (*Choanotaenia*)

Anomotaenia bacilligera (KRABBE) 1869, 1882

Anomotaenia citrus (KRABBE) 1869⁵⁾, CLERC 1903 (*Choanotaenia*)

Anomotaenia clarigera (KRABBE)⁶⁾ 1869; COHN 1901

Anomotaenia microrhyncha (KRABBE) 1869; COHN 1901

Anomotaenia platyrhyncha (KRABBE) 1869; COHN 1901

Anomotaenia microphallos (KRABBE) 1869⁷⁾; CLERC 1903 (*Choanotaenia*)

Anomotaenia ericetorum (KRABBE) 1869

Anomotaenia micracantha (KRABBE) 1869

Anomotaenia cingulata v. LINSTOW 1905b, siehe auch Anm. 6

Anomotaenia volvulus (v. LINSTOW) 1906a⁸⁾

Anomotaenia macrocanthoides FUHRMANN 1907a

Anomotaenia macrocantha FUHRMANN 1908b.

1) RUDOLPHI (1809) gibt an, daß seine *T. variabilis* RUD. identisch ist mit *T. stentorea* FRÖLICH 1799, so daß nach den Nomenklaturregeln der letztere Name anzunehmen ist. Nach DIESING 1850 soll ferner *T. serpentiniformis* BATSCH (ex parte) und *Halysis vanelli* ZEDER 1803 mit obiger Taenie synonym sein. Weiteres Synonym: *Choanotaenia variabilis* RUD. CLERC 1903.

2) Mit *A. nymphaea* SCHRANK ist synonym *Halysis nymphaea* ZEDER 1803.

3) Synonym: *Choanotaenia globulus* (WEDL) CLERC 1903.

4) Synonym: *Choanotaenia arionis* (SIEBOLD) CLERC 1903.

5) Synonym: *Choanotaenia citrus* (KRABBE) CLERC 1903.

6) Synonymie: Diese Art ist vielleicht synonym, wie die Untersuchung der Originale gezeigt, mit *Dilepis cingulata* v. LINSTOW 1905b, welche auf jeden Fall eine *Anomotaenia* und, da die Haken verloren, nicht genau zu identifizieren ist.

7) Synonym: *Choanotaenia microphallos* (KRABBE) CLERC 1903.

8) Synonym: *Diplochetos volvulus* v. LINSTOW 1906a. Die Beschreibung ganz falsch.

Lariformes.

Anomotaenia tordae (FABRICIUS) 1780¹⁾: KRABBE 1869 (*T. armillaris* RUD.)

Anomotaenia larina (KRABBE) 1869

Anomotaenia socialis (KRABBE) 1869

Anomotaenia campylacantha (KRABBE) 1869.

Ciconiiformes.

Anomotaenia aurita (RUD.) 1819

Anomotaenia discoidea (VAN BEN.)²⁾ 1868, KRABBE 1869 (*T. multiformis* CREPL.)

Anomotaenia glandularis FUHRMANN 1905a.

Accipitres.

Anomotaenia trapexoides FUHRMANN 1906a

Anomotaenia mollis (VOLZ) 1900 (*Taenia mollis*).

Coccygiformis.

Anomotaenia mutabilis (RUD.) 1819

Anomotaenia acollum FUHRMANN 1907a.

Passeriformes.

Anomotaenia quadrata (RUD.) 1819

Anomotaenia cyathiformis (FRÖLICH) 1791³⁾, KRABBE 1869

Anomotaenia constricta (MOLIN) 1858⁴⁾, KRABBE 1869, 1882; VOLZ 1900; COHN 1901 (*A. puncta* v. LINSTOW), CLERC 1903

1) Der Name *T. armillaris* RUD. muß durch *A. tordae* FABRICIUS ersetzt werden, da die beiden Artnamen denselben Cestoden benennen und ersterer der ältere ist. ZEDER nennt den Cestoden *Halysis tordae* ZEDER 1803.

2) Die *Taenia multiformis* CREPL. ist, wie COHN nachgewiesen, eine *Hymenolepis*-Art (s. d.), so daß also *T. multiformis* CREPLIN KRABBE 1869 einen andern Namen anzunehmen hat; sie scheint mir identisch mit *T. discoidea* BEN.

3) DIESING gibt als Synonym zu *A. cyathiformis* die *T. hirundinis ubricae* GOEZE 1782 an, was aber wohl nicht zutreffend; es sollte übrigens heißen *T. hirundinis* SCHRANK 1788, denn GOEZE hat die Taenie gar nicht benannt, sondern SCHRANK ist der Autor dieser Art. Weiteres Synonym: *Drepanidotaenia cyathiformis* FRÖL. PARONA 1899.

4) *Taenia puncta* v. LINSTOW 1872b, 1890 ist ein Synonym von *A. constricta*, ebenso ist nach VOLZ synonym zu obiger Art *T. affinis* KRABBE, *T. coronina* KRABBE und *T. gutturosa* GIEBEL. Ferner sind

- Anomotaenia depressa* (v. SIEBOLD) 1836¹⁾, KRABBE 1869, v. LINSTOW 1896, FUHRMANN 1895, 1899c
Anomotaenia dehiscens (KRABBE) 1882
Anomotaenia borealis (KRABBE) 1869, CLERC 1906b
Anomotaenia trigonocephala (KRABBE) 1869
Anomotaenia vesiculigera (KRABBE) 1882
Anomotaenia ovalacincata (v. LINSTOW) 1877a
Anomotaenia brevis (CLERC)²⁾ 1903
Anomotaenia brasiliensis FUHRMANN 1907a
Anomotaenia hirundina FUHRMANN 1907a.
Anomotaenia cyathiformoides FUHRMANN 1908b
Anomotaenia undulatoides FUHRMANN 1908b
Anomotaenia isacantha FUHRMANN 1908b
Anomotaenia penicillata FUHRMANN 1908b
Anomotaenia (?) *paucitesticulata* FUHRMANN 1908b

Gatt. *Fuhrmannia* PARONA 1901.

Scolex mit Rostellum, das bewaffnet von einer doppelten Krone von Haken. Strobila aus wenigen Proglottiden bestehend; Glieder breiter als lang. Hoden am Hinterende der Proglottis gelagert. Uterus sackförmig. Genitalpori regelmäßig alternierend. In Vögeln.

Typische Art: *Fuhrmannia brasiliensis* PARONA 1901.

Charadriiformes.

Fuhrmannia alternans (COHN) 1900b.

Coraciiformes.

Fuhrmannia brasiliensis PARONA 1901.

Gatt. *Leptotaenia* COHN 1901.

Cystoidotaenien mit nur einem Hakenkranze und regelmäßig alternierenden Genitalporen. Der Scolex ist relativ sehr groß. Collum fehlt. Die kurze Pro-

noch folgende Synonyme zu nennen: *Drepanidotaenia constricta* MOLIN PARONA 1899, *Anomotaenia puncta* (v. LINSTOW) COHN 1901.

1) Mit *Anom. depressa* v. SIEBOLD ist vielleicht synonym mit *T. pustulum* GIEBEL 1866.

2) Vom Autor als *Choanotaenia* beschrieben.

glottidenkette besteht aus wenigen Gliedern. Der Cirrusbeutel ist von bedeutender Größe. Die Hoden liegen einseitig in einem dem poralen Rande genäherten Hodenfeld. Der Uterus ist sackförmig und füllt die Proglottis aus.

Typische Art: *Leptotaenia ischnorhyncha* LÜHE 1898 (COHN 1901).

Phoenicopteri.

Leptotaenia ischnorhyncha (LÜHE) 1898¹⁾, COHN 1901.

Gatt. *Amoebotaenia* COHN 1899a.

Scolex verhältnismäßig groß, bewaffnet mit einem Rostellum, das eine einfache Hakenkrone trägt. Strobila kurz. Die wenigen Glieder viel breiter als lang. Geschlechtsöffnungen regelmäßig alternierend. Hoden zahlreich am Hinterrande des Gliedes. Uterus sackförmig. In Vögeln.

Typische Art: *Amoebotaenia cuneata* (v. LINSTOW) 1872b.

Synonym: *A. sphenoides* RAILLIET 1892.

Galliformes.

Amoebotaenia cuneata (v. LINSTOW) 1872b²⁾, STILES 1896, *Dicranotaenia sphenoides* (RAILLIET), COHN 1901.

Charadriiformes.

Amoebotaenia brevis (v. LINSTOW) 1884

Amoebotaenia vanelli FUHRMANN 1907a

Amoebotaenia brevicollis FUHRMANN 1907a.

Gatt. *Liga* WEINLAND 1859.

In Vögeln.

Typische Art: *Liga punctata* WEINLAND.

Nach mündlichen Angaben von RANSOM (Washington), welcher

1) Synonym *Amoebotaenia ischnorhyncha* (LÜHE) COHN 1899a.

2) *Dicranotaenia sphenoides* RAILLIET 1892 ist synonym mit obiger Art; ebenso *Amoebotaenia sphenoides* (RUD.) COHN 1899a.

diese Taenie WEINLAND's wieder aufgefunden, ist dieser Cestode in die Nähe von *Amoebotaenia* zu stellen. Eine Diagnose kann erst gegeben werden, wenn die Arbeit RANSOM's erschienen ist.

Coraciiformes.

Liga punctata WEINLAND 1859.

Gatt. *Parvirostrum* FUHRMANN 1908b.

Kleine Taenien mit undeutlicher Gliederung der Strobila. Scolex groß, mit kleinem Rostellum bewaffnet, mit zwei Kränzen von Haken. Genitalpori unregelmäßig abwechselnd. Geschlechtsdrüsen sehr klein; Hoden seitlich; Keimstock und Dotterstock poral verschoben. Uterus sackförmig.

Typische Art: *Parvirostrum reticulatum* FUHRMANN 1908b.

Passeriformes.

Parvirostrum reticulatum FUHRMANN 1908b.

Gatt. *Cyclustera* FUHRMANN 1901c.

Rostellum mit einer doppelten Krone von Haken. Genitalöffnungen regelmäßig abwechselnd. Die Geschlechtsgänge gehen zwischen den beiden Längsexcretionsstämmen durch. Sie münden in einen sehr muskulösen Canalishermaphroditus. Hoden zahlreich dorsal über das ganze Markparenchym verteilt. Uterus ringförmig mit sekundären Verzweigungen. Längsmuskulatur in drei Lagen. In Vögeln.

Typische Art: *Cyclustera capito* (RUD. 1819).

Ciconiiformes.

Cyclustera capito (RUD.) 1819, KRABBE 1869, FUHRMANN 1900c
Cyclustera fuhrmanni CLERC 1906b.

Gatt. *Laterotaenia* FUHRMANN 1906a.

Cestoden mit einfachem, mit doppeltem Hakenkranz bewaffnetem Rostellum. Die Geschlechtsgänge gehen

regelmäßig abwechselnd zwischen den Wassergefäßen und unter dem Hauptnerven durch zum Gliedrand. Der größte Teil des Markparenchyms ist frei von Geschlechtsdrüsen. Die zahlreichen Hoden beiderseits ganz seitlich gelagert; ebenso die einfachen weiblichen Geschlechtsdrüsen. Der Uterus ist sackförmig, das ganze Markparenchym erfüllend. In Vögeln.

Typische Art: *Laterotaenia nattereri* FUHRMANN¹⁾ 1906a.

Accipitres.

Laterotaenia nattereri FUHRMANN 1906a.

Gatt. *Proorchida* FUHRMANN 1908b.

Scolex bewaffnet mit zwei Kränzen von Haken. Genitalporen einseitig. Hoden vor den weiblichen Geschlechtsdrüsen gelegen. Uterus stark gelappt (?).

Typische Art: *Proorchida lobata* FUHRMANN 1908b.

Ciconiiformes.

Proorchida lobata FUHRMANN 1908b.

Gatt. *Angularia* CLERC 1906b.

Cestoden, deren Rostellum bewaffnet ist von Haken, welche in mehrfach gebrochener Zickzacklinie disponiert sind. Genitalöffnungen unregelmäßig abwechselnd. Die Geschlechtsgänge gehen über den Längswassergefäßen durch. Uterus unregelmäßig gelappt.

Typische Art: *Angularia beema* CLERC 1906b.

Passeriformes.

Angularia beema CLERC 1906b.

Gatt. *Cyclorchida* FUHRMANN 1907a.

Cestoden mit einem doppelten Kranz von Haken,

1) Bei FUHRMANN 1906a wurde die Taenie irrtümlicherweise *L. natteri* statt *L. nattereri* FUHRMANN genannt.

mit mächtiger Basis und kleinem Hakenteil, bewaffnet. Genitalöffnungen einseitig. Geschlechtsgänge zwischen den Wassergefäßen durchgehend. Der Cirrusbeutel auf einer großen Papille durch einen engen Kanal in die Genitalcloake mündend. Hoden sehr zahlreich, einen Kranz um die weiblichen Geschlechtsdrüsen bildend. Uterus anfangs ganz ventral, seitlich zwischen den Wassergefäßen durch ins Rindenparenchym dringend.

Typische Art: *Cyclorchida omalancristota* (WEDL).

Ciconiiformes.

Cyclorchida omalancristota (WEDL) FUHRMANN 1907a.

Gatt. *Acanthocirrus* FUHRMANN 1907a.

Taenien mit bewaffnetem Rostellum. Genitalporen einseitig; Geschlechtsgänge zwischen den Wassergefäßen durchgehend. Cirrus mit einem oder zwei Paar an seiner Basis fixierten, in besondern Taschen liegenden mächtigen Stacheln. Hoden wenig zahlreich. Uterus sackförmig.

Typische Art: *Acanthocirrus macrorostratus* FUHRMANN 1907a.

Ciconiiformes.

Acanthocirrus cheilancristota (WEDL) 1856¹⁾; CLERC 1906b [*Dilepis macropeus* (WEDL)]

Acanthocirrus macropeus (WEDL) 1856¹⁾; KRABBE 1869.

1) WEDL beschreibt unter dem Namen *T. cheilancristota* var. *brevirostris* und *T. cheilancristota* var. *longirostris* 2 Cestoden, welche verschiedene Arten sind. Die Bewaffnung der erstern ist unvollständig bekannt; die Haken zeigen einige Ähnlichkeit mit den kleinen Haken von *T. macropeus* WEDL, wie sie KRABBE 1869 zeichnet. Die *Taenia macropeus* WEDL scheint mit *T. cheilancristota* var. *longirostris* identisch zu sein, soviel aus der unvollständigen Charakterisierung von WEDL, den nach dem Originalmaterial angefertigten Zeichnungen von *T. macropeus* von KRABBE 1869 und der Beschreibung von CLERC 1906b hervorzugehen scheint. Die Länge des Wurmes (6—8 mm), die Zahl der Haken und wohl auch die Form ist dieselbe. *T. cheilancristota* var. *brevirostris* scheint mir dagegen identisch mit der von CLERC als *Dilepis macropeus* be-

Passeriformes.

Acanthocirrus macrorostratus FUHRMANN 1907a.

2. Subfam. *Dipylidiinae* RAILLET.

Dilepiniden, deren Uterus wie bei Davaineen sich in zahlreiche Parenchymkapseln auflöst, welche eine oder mehrere Oncosphären enthalten. In Säugetieren, Vögeln und Reptilien.

Gatt. *Dipylidium* R. LEUCKART 1863.

Rostellum mit mehreren Ringen von alternierenden Haken besetzt. Genitalpori gegenständig; Geschlechtsapparat doppelt. Der Uterus löst sich in einzelne ein oder mehrere Eier einschließende Säckchen auf. Die reifen Glieder sind meist länger als breit. In Säugetieren und Vögeln.

schriebenen Art; beide sind ca. 60 mm lang und zeigen denselben eigentümlichen Bau der Genitalcloake, welcher sich übrigens auch nach WEDL bei der Varietät *longirostris* obiger Taenie finden soll. CLERC gibt selbst an, daß die Haken seiner *Dilepis macropus* größer sind (irrtümlich verwechselt er die Größenangaben von KRABBE mit den seinigen), und ein Vergleich zeigt auch, daß die Form eine etwas andere ist. CLERC's *D. macropus* entspricht also in der Form und Größe der Haken nicht dem Typus; außerdem ist dieser Cestode etwa 10mal so lang wie die typische Art, er entspricht aber in der Länge und dem anatomischen Bau der Cloake vollständig der *T. cheilancristota* var. *brevirostris* WEDL. Es liegen also 2 Arten vor, eine *T. cheilancristota* WEDL (synonym *T. ch. var. brevirostris* WEDL und *T. macropus* CLERC) und eine *T. macropus* WEDL (synonym *T. cheilancristota* var. *longirostris* WEDL). Mit dieser letztern Art ist vielleicht die von RUDOLPHI als *T. unguicula* BRAUN beschriebene Art identisch. Die Wirte sind bei diesen Arten allerdings verschieden.

Nach WEDL sollen die Genitalpori bei *T. macropus* und *T. cheilancristota* wechselständig sein, während CLERC 1906b sie als einseitig bezeichnet und die Art deshalb in das Genus *Dilepis* stellt, ansonst die beiden Arten in das Genus *Anomotaenia* gestellt werden müßten.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß WEDL nicht richtig beobachtet, denn auch bei *T. multistriata* spricht er von alternierenden Geschlechtsöffnungen, während KRABBE an den WEDL'schen Originalpräparaten gesehen, daß sie einseitig sind.

Typische Art: *Dipylidium caninum* (LINN.).

Von diesem bis jetzt nur aus Säugetieren bekannten Cestodengenus habe ich 2 Arten bei Vögeln gefunden. Leider ist bei keiner der beiden Species die Bewaffnung des Rostellums vollständig erhalten, so daß ich nicht sicher angeben kann, ob mehrere Kränze von Haken vorhanden, dagegen ist der Bau des Geschlechtsapparats vollkommen übereinstimmend mit demjenigen der Säugetierdipylidien.

Columbiformes.

Dipylidium columbae FUHRMANN 1908b.

Accipitres.

Dipylidium aricola FUHRMANN 1906a.

Gatt. *Monopylidium* FUHRMANN 1899c.

Rostellum mit einer doppelten Muskeltasche, bewaffnet mit einem einfachen Kranze von Haken. Saugnäpfe unbewaffnet. Geschlechtsorgane unregelmäßig abwechselnd ausmündend. Die Geschlechtsgänge gehen zwischen den Längswassergefäßen durch. Die Hoden liegen hinter den weiblichen Geschlechtsdrüsen. Uterus stark verzweigt, löst sich in Parenchymkapseln auf, welche meist eine Oncosphäre enthalten. In Vögeln.

Typische Art: *Monopylidium musculosum* FUHRMANN 1896.

Galliformes.

Monopylidium infundibulum (BLOCH) 1779¹⁾, KRABBE 1869 (*T. infundibuliformis* GOEZE), CRETY 1890, COHN 1901 (*Choanotaenia infundibulum*), STILES 1896 (*Drepanidotaenia infundibuliformis*), CLERC 1903, RANSOM 1905 (*Choanotaenia infundibuliformis*).

1) Diese Art wurde meist mit dem Namen *T. infundibuliformis* GOEZE benannt, die richtige Artbezeichnung aber ist *T. infundibulum* BLOCH. Nach STILES 1896 und PARONA 1894 haben wir noch folgende Synonyme: *T. avium* PALLAS 1701, *Globus stercoreus* SCOPOLI 1772 und *T. serrata* ROSA 1794. Die Artnamen *T. cuneata* BLOCH, *T. conoidea* SCHRANK gehören nicht zu den Synonymen obiger Taenie, wie STILES glaubt, denn sie bezeichnen Entencestoden, während *M. infundibulum* nur in Hühnervögeln vorkommt. Weitere Synonyme sind: *Alyselminthus infundibuliformis* ZEDER 1800, *Halysis infundibuliformis* ZEDER 1803, *Drepanidotaenia in-*

Ralliformes.

Monopylidium marchali (MOLA) 1907.

Charadriiformes.

Monopylidium laevigatum (RUD.) 1819

Monopylidium cinguliferum (KRABBE)¹⁾ 1869, CLERC 1902, 1903

Monopylidium macracanthum FUHRMANN 1907a

Monopylidium cayennense FUHRMANN 1907a

Monopylidium secundum FUHRMANN 1907a

Monopylidium rostellatum FUHRMANN 1908b.

Passeriformes.

Monopylidium crateriforme (GOEZE)²⁾ 1782; KRABBE 1869, FUHRMANN 1899c

Monopylidium musculosum FUHRMANN³⁾ 1896 (*Davainea* (?) *musculosa* FUHRM.); FUHRMANN 1899c (*Monopylidium musculosum*)

Monopylidium unicoloratum FUHRMANN 1908b

Monopylidium passerinum FUHRMANN 1907a.

3. Subfam. Parutrinae.

Dilepiniden mit einem dem Uterus anliegenden parenchymatösen Paruterinorgan, in welches die Eier in ganz reifen Proglottiden eindringen. Es entsteht dann eine die Oncosphären enthaltende Parenchymkapsel. In Säugetieren und Amphibien.

fundibuliformis GOEZE (STILES 1896, STOSSICH 1898, RAILLIET 1896), *Choanotaenia infundibulum* COHN 1899a.

Nach RAILLIET und COHN gehört diese Taenie in das Genus *Choanotaenia*, doch haben unsere Untersuchungen sowie die von CLERC 1903 gezeigt, daß wir es mit einem typischen Vertreter des Genus *Monopylidium* zu tun haben (s. auch *Choanotaenia*).

Nach BLANCHARD 1898 ist *Taenia lagenicollis* MEGNIN identisch mit *M. infundibulum* (BLOCH).

1) PARONA beschrieb als *T. marchii* PARONA 1887a einen Cestoden, welcher, wie mir die Untersuchung des Originalmaterials gezeigt hat, identisch ist mit *M. cinguliferum* KRABBE.

2) Sollte, wie DIESING 1850 angibt, *T. crateriformis* GOEZE synonym sein mit *T. crenata* GOEZE 1782, so müßte letzterer Name angenommen werden, da *T. crenata* GOEZE vor *T. crateriformis* beschrieben ist (s. auch *Davainea cruciata* RUD.). ZEDER benennt diese Art *Halysis crateriformis* ZEDER 1803.

3) Von mir ursprünglich als *Davainea* (?) *musculosa* FUHRMANN beschrieben.

Gatt. *Paruterina* FUHRMANN 1906a.

Scolex mit einem einfachen von einem doppelten Kranz von Haken bewaffneten Rostellum. Geschlechtsöffnungen einseitig oder unregelmäßig abwechselnd. Hoden hinter und neben dem zweiflügligen Keimstock. Dem Uterus ein Parenchymzapfen, Paruterinorgan, vorn aufsitzend, in welches die Ocnosphären meist erst in abgelösten Gliedern eintreten.

Typische Art: *Paruterina angustata* FUHRMANN 1906a.

Accipitres.

Paruterina candelabraria (GOEZE) 1782¹⁾; KRABBE 1869, WOLFFHÜGEL 1899a, 1900a

Paruterina angustata FUHRMANN²⁾ 1906a.

Passeriformes.

Paruterina parallelepipedata (RUD.) 1809³⁾; KRABBE 1869.

Gatt. *Biuterina* FUHRMANN 1902a.

Cestoden mit doppelter Hakenkrone an einem einfach gebauten Rostellum. Hakenform dreieckig. Genitalöffnungen unregelmäßig abwechselnd. Genitalgänge gehen zwischen den Längsgefäßen des Excretionssystems durch. Uterus anfangs einfach, dann mehr oder weniger vollständig zweigeteilt. Die Ocnosphären werden in ein vorn gelegenes Paruterinorgan gepreßt, das eine Uteruskapsel bildet. In Vögeln.

1) Synonymie: *Halysis candelabraria* ZEDER 1803.

2) Diese Art ist wohl nach Einsicht der Originale synonym mit der *Taenia strigis* RUD. 1819; sie stammt sehr wahrscheinlich aus demselben Vogel, dessen Parasiten ich in der Wiener Sammlung untersucht habe. Auf jeden Fall ist aber die RUDOLPH'sche Art nicht, wie DIESING 1850 glaubt, identisch mit *P. candelabraria* (GOEZE).

3) Nach Untersuchung der Originale ist diese Art in das Genus *Paruterina* zu stellen. Synonym: *Drepanidotaenia parallelepipedata* (RUD.) STOSSICH 1898.

Typische Art: *Biuterina clavulus* (VON LINSTOW) 1888
(synonym *Biuterina paradisea* FUHRMANN 1902a).

Anseriformes.

(?) *Biuterina longiceps* RUDOLPHI 1819.

Coraciiformes.

Biuterina meropina (KRABBE)

Biuterina meropina var. *macrankistota* FUHRMANN 1908a

Biuterina lobata FUHRMANN 1908a

Biuterina rectangula FUHRMANN 1908a

Biuterina trapezoides FUHRMANN 1908a.

Passeriformes.

Biuterina longiceps (RUDOLPHI) 1819, KRABBE 1869, FUHRMANN 1908a

Biuterina campanulata (RUDOLPHI) 1819, KRABBE 1869, FUHRMANN 1908a

Biuterina triangula (KRABBE) 1869, FUHRMANN 1908a

Biuterina clavulus (V. LINSTOW) 1888 ¹⁾, FUHRMANN 1908a

Biuterina trapezoides FUHRMANN 1908a

Biuterina distincta FUHRMANN 1908a

Biuterina trigonacantha FUHRMANN 1908a

Biuterina passerina FUHRMANN 1908a ²⁾, CLERC 1906b (*B. meropina*)

Biuterina globosa FUHRMANN 1908a

Biuterina motacilla FUHRMANN 1908a

Biuterina (?) *planirostris* (KRABBE) 1882.

Gatt. *Culcitella* FUHRMANN 1906a.

Scolex mit einem einfachen Rostellum, bewaffnet mit einem doppelten Kranz von Haken. Genitalporen einseitig oder unregelmäßig abwechselnd. Die Geschlechtsgänge gehen zwischen den beiden Excretionsgefäßen durch. Vor dem Uterus liegt eine parenchymatöse Masse, in welche wohl(?) die Eier sehr spät gedrängt werden. Besonders charakteristisch ist, daß

1) BLANCHARD 1891a glaubte, daß *T. clavulus*, die sehr mangelhaft beschrieben, vielleicht eine *Davainea* sei; sie ist nach unserer Untersuchung der Originale synonym mit der von uns 1902a beschriebenen *B. paradisea* FUHRMANN.

2) Diese Art ist synonym mit der *B. meropina* (KRABBE) CLERC 1906b, indem Zahl, Form und Größe der Haken nicht der wirklichen *T. meropina* KRABBE's entsprechen. CLERC beschreibt dieselbe als aus *Emberiza citrinella* stammend.

auf der einen Seite das enge Wassergefäß dorsal vom weiten, auf der entgegengesetzten Seite aber die umgekehrte Disposition der Längsgefäße deutlich ausgeprägt ist.

Typische Art: *Culcitella rapacicola* FUHRMANN 1906a.

Accipitres.

Culcitella rapacicola FUHRMANN 1906a

Culcitella crassa FUHRMANN 1906a

Gatt. *Rhabdometra* CHOLODKOVSKY 1906.

Scolex unbewaffnet, ohne Rostellum; Genitalporen unregelmäßig abwechselnd; die ersten Glieder sehr kurz, die letzten länger als breit; Hoden zahlreich im hintern Teil des Gliedes; Uterus von der Form eines medianen Zylinders, vorn ein lamellöses Paruterinorgan tragend. Die Geschlechtsgänge gehen zwischen den Wassergefäßen durch.

Typische Art: *Rh. tomica* CHOLOD. 1906.

Galliformes.

Rhabdometra tomica CHOLODKOVSKY 1906

Rhabdometra nigropunctata (CRETY) 1890; STILES 1896.

Gatt. *Metroliasthes* RANSOM 1900.

Scolex ohne Rostellum. Geschlechtsöffnungen unregelmäßig abwechselnd. Vor dem Uterus ein parenchymatöses Paruterinorgan, in welches die Onco-sphären frühzeitig eintreten.

Typische Art: *Metroliasthes lucida* RANSOM 1900.

Galliformes.

Metroliasthes lucida RANSOM 1900; RANSOM 1905.

Gatt. *Anonchotaenia* COHN 1900b und 1901.

Synonym: *Amerina* FUHRMANN 1901c.

Scolex ohne Rostellum. Genitalöffnungen unregelmäßig alternierend. Die Geschlechtsgänge gehen unter

den Excretionsstämmen und dem Längsnerven durch. Hoden dorsal und in geringer Zahl. Die weiblichen Genitaldrüsen klein und oval. Dem Uterus liegt ein Paruterinorgan an, in welches die Oncosphären vom Uterus aus gepreßt werden; es bildet sich so eine Parenchymkapsel um dieselben. In Vögeln.

Typische Art: *Anonchotaenia globata* (v. LINSTOW).

Synonym: *A. clava* COHN 1900b (s. S. 70 Anm.).

Dieses Genus wurde von COHN 1900b im Zoologischen Anzeiger kurz und unrichtig charakterisiert, so daß ich mich veranlaßt sah, das Genus *Amerina* zu begründen (FUHRMANN 1901e). Nach dem Erscheinen meines Aufsatzes erschien dann die große Arbeit COHN's (1901), in welcher er die gegebene Diagnose berichtigt. Obige Diagnose ist von mir aufgestellt. Es herrscht in dieser Cestoden-Gruppe eine große Konfusion, weil in neuerer Zeit mehrere Autoren dieselbe Art unter verschiedenen Namen als neue Species beschrieben haben. v. LINSTOW hat, wie die Untersuchung des Originalmaterials gezeigt, dieselbe Form in derselben Arbeit als 2, wenn nicht 3 neue Arten beschrieben (s. S. 70 in der Anmerkung).

Ciconiiformes.

? *Anonchotaenia longiovata* (FUHRMANN) 1901c.

Pici.

Anonchotaenia conica FUHRMANN 1908a.

Passeriformes.

Anonchotaenia globata (v. LINSTOW 1879a¹⁾, CERRUTI 1901 (*T. alaudae*), COHN 1901 (*A. clava*), FUHRMANN 1908a

1) Diese Synonymie für diese Art ist, wie unsere Untersuchungen ergeben, eine sehr verwickelte. Zuerst gab COHN 1900b eine unzutreffende anatomische Beschreibung dieser Taenie, welche er *Anonchotaenia clava* COHN 1900b nannte. Daraufhin gab ich auf Grund der Untersuchung derselben Art die Diagnose der neuen Gattung *Amerina* mit der Art *A. inermis* FUHRMANN 1901c. Hierauf gab COHN 1901 eine richtige mit der meinigen übereinstimmende Diagnose der Gattung und Art. In der Zwischenzeit gab CERRUTI eine gute Beschreibung seiner *Amerina alaudae* CERRUTI 1901, welche mit obigen Arten übereinstimmt. Nun hat aber v. LINSTOW 1879a in einer Arbeit 3 neue Cestoden benannt und sehr summarisch und für obige Autoren ohne Einsicht der Originale unkenntlich

- Anonchotaenia bobica* CLERC 1903¹⁾
Anonchotaenia oriolina CHOLODKOVSKY 1906
Anonchotaenia longiovata (FUHRMANN) 1901c
Anonchotaenia macrocephala FUHRMANN 1908a
Anonchotaenia trochili FUHRMANN 1908a
Anonchotaenia brasiliensis FUHRMANN 1908a.

6. Fam. *Hymenolepinidae*.

Cestoden mit selten unbewaffnetem Scolex, meist mit einem einen einfachen Hakenkranz tragenden Rostellum; Hals kurz; Glieder breiter als lang. Die Muskulatur besteht aus zwei Längsmuskellagen, einer innern Transversalmuskulatur, Dorsoventralmuskeln und häufig einer äußern Diagonalmuskulatur. Die Genitalporen münden immer einseitig; die Geschlechtsgänge gehen über die beiden Längsstämme des Wassergefäßsystems und den Längsnerven durch. Die Hoden in der Zahl von 1—4. Vas deferens immer verhältnismäßig kurz mit Samenblase. Der Uterus sackförmig; die Eier mit drei Hüllen. In Säugetieren und Vögeln.

Gatt. *Oligorchis* FUHRMANN 1906a.

Rostellum mit einfachem Hakenkranz. Genitalpore einseitig. Vier Hoden. Uterus sackförmig.

Typische Art: *Oligorchis strangulatus* FUHRMANN 1906a.

beschrieben. Die Untersuchung dieser Originale hat gezeigt, daß alle 3 Arten, sicher aber *T. globata* v. LINST. und *T. previceps* v. LINSTOW, vielleicht auch seine *T. rudolphiana* (v. LINSTOW) unter sich identisch sind! Zugleich sind aber diese Arten identisch mit den obgenannten Arten, und es muß deshalb nach den Nomenklaturregeln die Art *Anonchotaenia globata* (v. LINSTOW) genannt werden. Ich zähle nicht die vor *globata* beschriebene, als *T. rudolphiana* bezeichnete Art, weil dieselbe eine junge *Anonchotaenia* ist, welche nur Spuren von Geschlechtsorganen besitzt. Synonym mit obiger Art ist wohl sicher die mangelhaft beschriebene *T. clarata* MARCHI 1869, welche auch nur in geschlechtslosem Zustand gefunden wurde.

Weiterer Synonym: *Metroliasthes inermis* FUHRMANN, PARONA 1901.

1) CLERC benennt diese Art in seiner vorläufigen Mitteilung 1902 *Amerina inermis* FUHRMANN.

Accipitres.

Oligorchis strangulatus FUHRMANN 1906a.

Gatt. *Hymenolepis* WEINLAND 1858.

Scolex mit rudimentärem Rostellum oder mit einfachem Hakenkranz bewaffneten wohlentwickelten Rostellum. Strobila kurzgliedrig. Genitalpori einseitig. Drei Hoden in jeder Proglottis. Uterus sackförmig. In Säugetieren und Vögeln.

Typische Art: *Hymenolepis diminuta* (RUD. 1819).

Dieses artenreiche Genus hat mannigfache Wechsel in der Benennung erfahren. COHN 1899a nannte diese Cestoden-Gruppe zunächst *Diplacanthus* WEINLAND mit den beiden Subgenera *Lepidotrias* WEINLAND und *Dilepis* WEINLAND. Es konnten diese Namen aber nicht beibehalten werden, denn der Name *Diplacanthus* ist bereits an einen Fisch vergeben, so daß für ihn der bereits auch von WEINLAND aufgestellte Name *Hymenolepis* in Kraft trat. Nach den Nomenklaturregeln muß das typische Subgenus den Namen des Genus erhalten, so daß *Lepidotrias* fällt. *Dilepis* gehört nach der Untersuchung des Typus gar nicht hierher, und es muß deshalb dieser zweite Untergenusname ebenfalls gestrichen werden. So gibt denn COHN 1900b folgende Benennung dieser Gruppe: Genus *Hymenolepis* WEINLAND, 1. Subgenus *Hymenolepis* WEINLAND, 2. Subgenus *Drepanidotaenia* RAILLIET. Nun haben aber unsere Untersuchungen (FUHRMANN 1906b und c) gezeigt, daß die Subgenera *Hymenolepis* und *Drepanidotaenia* nicht aufrecht erhalten werden können.

CLERC 1903 hat dann nachgewiesen, daß die Vertreter des Genus *Echinocotyle* BLANCHARD nichts anderes sind als *Hymenolepis*-Arten mit bewaffneten Saugnäpfen und daß das betreffende Genus als Subgenus der Gattung *Hymenolepis* aufzufassen ist.

Näheres über die sehr weitläufige Diskussion der Systematik dieser Gruppe bei COHN 1899a, b und c, 1900a und b, 1901, 1904. WOLFFHÜGEL 1899a und b, 1900a, CLERC 1903, FUHRMANN 1906b und c.

Crypturiformes.

Hymenolepis pauciovata FUHRMANN 1906b.

Galliformes.

- ? *Hymenolepis villosa* (BLOCH) 1782¹⁾; KRABBE 1882; CLERC 1906a
Hymenolepis linea (GOEZE) 1782²⁾; KRABBE 1869; WOLFFHÜGEL 1900a
Hymenolepis exilis (DUJARDIN) 1845³⁾
Hymenolepis carioca (MAGALHÃES) 1898⁴⁾; RANSOM 1902; RANSOM 1905
Hymenolepis microps (DIESING) 1850⁵⁾; WOLFFHÜGEL 1900a (*H. tetraonis*
 WOLFFHÜGEL)
Hymenolepis melcagris (CLERC) 1902⁶⁾; 1903
Hymenolepis musculosa (CLERC) 1902⁶⁾; 1903
Hymenolepis phasianina FUHRMANN 1907a.

Ralliformes.

- Hymenolepis poculifera* (v. LINSTOW) 1879b.

Otidiformes.

- Hymenolepis villosa* (BLOCH) 1782⁷⁾; KRABBE 1869, WOLFFHÜGEL 1900a,
 CLERC 1906a
Hymenolepis tetracis CHLODOKOVSKY 1906⁸⁾; CLERC 1906a (*H. dentatus*
 CLERC)
Hymenolepis ambiguus CLERC 1906a.

1) Siehe Einleitung S. 8.

2) Synonymie: *Alyselminthus linea* ZEDER 1800, *Halysis linea* ZEDER 1803.

3) Diese Taenie wurde von DUJARDIN unvollständig beschrieben. AIOLONG 1875 glaubte diesen Cestoden wieder gefunden zu haben, gibt aber ebenfalls nur eine sehr unvollständige Beschreibung, aus der aber hervorgeht, daß seine Art keineswegs *T. exilis* sein kann. Dagegen glauben wir diese Art wiedergefunden zu haben.

4) Dieser Cestode wurde in der trefflichen Arbeit von STILES 1896 als *T. sp.* CONARD beschrieben; KOWALEVSKI 1902a zitiert denselben als *T. conardi* ZÜRN 1898. MAGALHAES 1898 beschrieb, wie RANSOM nachwies, dieselbe Art als *Davainea carioca*. RANSOM 1905 gibt endlich eine gute Beschreibung derselben und zeigt, daß es eine *Hymenolepis*-Art ist.

5) Die Untersuchung des Originalmaterials von *T. microps* DIES. ergab, daß dieser Cestode identisch ist mit *H. tetraonis* WOLFFH. 1900a. Andererseits erwähnt KRABBE 1869, daß *T. microps* DIES. identisch ist mit *T. tumens* MEHLIS. Die weitere Angabe, daß diese beiden Cestoden synonym mit *Davainea urogalli*, ist aber nicht zutreffend.

6) Von CLERC als *Drepanidotaenia* beschrieben.

7) Mit *H. villosa* (BLOCH) sollen synonym sein: *T. otidis* WERNER 1702, *T. fimbriata* BATSCH 1706, *T. tardae* GMELIN 1790 und *Halysis villosa* ZEDER.

8) Wenige Tage vor dem Erscheinen der CLERC'schen Arbeit erschien die Arbeit von CHLODOKOVSKY, so daß *H. dentatus* CLERC 1906a (FUHRMANN 1906c) synonym mit *H. tetracis* CHLOD. 1906 ist.

Charadriiformes.

- Hymenolepis sphaerophora* (RUD.) 1809
Hymenolepis interrupta (RUD.) 1809¹⁾; FUHRMANN 1906c
Hymenolepis longirostris (RUD.) 1809; KRABBE 1869
Hymenolepis amphitricha (RUD.) 1819; KRABBE 1869; CLERC 1903
Hymenolepis brachycephala (CREPLIN) 1829; KRABBE 1869; COHN 1901
Hymenolepis minuta (KRABBE) 1869
Hymenolepis recurvirostrae (KRABBE) 1869
Hymenolepis himantopodis (KRABBE) 1869, FUHRMANN 1906c
Hymenolepis clandestina (KRABBE) 1869²⁾; COHN 1904
Hymenolepis uliginosa (KRABBE) 1882
Hymenolepis hirsuta (KRABBE) 1882
Hymenolepis (*Echinocotyle*) *nitida* (KRABBE) 1869; CLERC 1902, 1903
Hymenolepis (*Echinocotyle*) *nitidulans* (KRABBE) 1882, CLERC 1903
Hymenolepis (*Echinocotyle*) *uralensis* CLERC 1902, 1903
Hymenolepis (*Echinocotyle*) *tenuis* CLERC 1906a
Hymenolepis spinosa v. LINSTOW 1906.
Hymenolepis styloides FUHRMANN 1906b
Hymenolepis rectacantha FUHRMANN 1906b.

Lariformes.

- ?*Hymenolepis microsoma* (CREPLIN) 1829 (s. S. 8)
Hymenolepis fusus (KRABBE) 1869
Hymenolepis vallei (STOSSICH) 1892a
Hymenolepis octacanthoides FUHRMANN 1906c³⁾; COHN 1901 (*D. octacantha* KRABBE)
Hymenolepis baschkiriensis (CLERC) 1902, 1903.⁴⁾

Columbiformes.

- Hymenolepis sphenoccephala* (RUD.) 1809⁵⁾, FUHRMANN 1906b

1) Nach DIESING 1850 ist *T. interrupta* RUD. synonym mit *T. paradoxa* RUD., was, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials ergeben, nicht richtig ist.

2) COHN 1904 gibt als Autornamen dieser Art CREPLIN an; der von CREPLIN gegebene Name ist aber ein Museumsname, der nie publiziert wurde, und erst KRABBE hat diese Taenie unter diesem Namen beschrieben.

3) Für den von COHN 1901 als *Drepanidotaenia octacantha* beschriebenen Cestoden habe ich den Namen *H. octacanthoides* FUHRMANN 1906c aufgestellt, da *H. octacantha* KRABBE nur in Entenvögeln vorkommt.

4) Synonym: *Drepanidotaenia baschkiriensis* CLERC 1903.

5) Nach DIESING 1850 ist mit obiger Taenie synonym *T. serpentiniformis turteris* GMELIN 1790, *Alyselminthus columbae* ZEDER 1800 und *Halysis columbae* ZEDER 1803. Die ZEDER'sche Art ist vielleicht synonym mit *Darainea crassula* RUD.

- Hymenolepis serrata* FUHRMANN 1906b
Hymenolepis armata FUHRMANN 1906b, 1906c
Hymenolepis rugosus CLERC 1906a.

Podicipediformis.

- Hymenolepis capillaris* (RUD.) 1809¹⁾, KRABBE 1869; COHN 1901
Hymenolepis multistriata (RUD.)²⁾ 1809, KRABBE 1869, COHN 1901
Hymenolepis rostellata (ABILDG.) 1793³⁾; KRABBE 1869 (*T. capitellata* RUD.), FUHRMANN 1895 und COHN 1901 unter dem Namen *T. capitellata* RUD. beschrieben.
Hymenolepis furcifera (KRABBE) 1869⁴⁾, SZYMANSKI 1905; LINSTOW 1908.
Hymenolepis capillaroides FUHRMANN 1906b
Hymenolepis podicipina SZYMANSKI 1905.

Steganopodes.

- Hymenolepis medici* (STOSSICH) 1890a, FUHRMANN 1906c.

Ciconiiformes.

- Hymenolepis microcephala* (RUD.) 1819⁵⁾; KRABBE 1869, COHN 1904 (*H. multiformis* CREPL.)
Hymenolepis unilateralis (RUD.) 1819⁶⁾, FUHRMANN 1906b (*H. ardeae* FUHRM.)

1) Nach DIESING 1850 sollen *T. minuta* BRAUN, *T. colymbi cristati* RUD. 1809 und *T. colymbi cornuti* RUD. 1819 nichts anderes als *T. capillaris* RUD. sein. Zwar sagt RUDOLPHI 1809 und 1819, daß die mit *T. colymbi cristati* RUD. bezeichneten Formen den beiden Taenien *T. multistriata* und *T. macrorhyncha* ähnlich seien. Weiteres Synonym: *Dicranotaenia capillaris* (RUD.) STOSSICH 1898.

2) Synonym: *Dicranotaenia multistriata* (RUD.) STOSSICH 1898.

3) Der älteste Name für die bisher immer als *T. capitellata* RUD. bezeichnete Taenie ist *T. rostellata* ABILDG. 1793 und *Halysis rostellata* ZEDER 1803. Weiteres Synonym: *Dilepis capitellata* COHN 1899a.

4) Synonymie: *Dilepis furcifera* KRABBE, COHN 1899a.

5) COHN hat auf Grund der Untersuchung des Originalmaterials gezeigt, daß *T. multiformis* CREPLIN eine *Hymenolepis*-Art ist und nicht, wie bisher angenommen, eine *Anomotaenia*. Andererseits hat unsere Untersuchung des Originalmaterials von *T. microcephala* RUD. gezeigt, daß dieselbe identisch ist mit *H. multiformis* CREPLIN; ersterer Name als der ältere hat hinfort zu gelten. Der früher als *T. multiformis* bezeichnete und beschriebene Cestode (KRABBE 1869) ist wohl identisch mit *Anomotaenia discoidea* VAN BEN. Nach DIESING 1850 soll auch *T. unguicula* (BRAUN) mit obiger *Taenia* synonym sein, was mir nach Einsicht des sehr schlecht erhaltenen Originalmaterials nicht ganz sicher scheint.

6) Unsere Untersuchung des Originalmaterials von *T. unilateralis* RUD. hat gezeigt, daß sie identisch ist mit unserer *H. ardeae* FUHRMANN 1906b

- Hymenolepis filirostris* (WEDL) 1856
Hymenolepis elongata FUHRMANN 1906b
Hymenolepis breviannulata FUHRMANN 1906b
Hymenolepis leptoptili (v. LINSTOW) 1901.¹⁾

Phoenicopteri.

- Hymenolepis liguloides* (GERVAIS)²⁾ 1847; COHN 1901, FUHRMANN 1906c
Hymenolepis caroli (PARONA) 1887a, FUHRMANN 1906c
Hymenolepis megalorchis (LÜHE)³⁾ 1898, COHN 1901.

Anseriformes.

- Hymenolepis aequabilis* (RUD.)⁴⁾ 1869; KRABBE 1869, STILES 1896, CLERC 1903
Hymenolepis fasciata (RUD.)⁵⁾ 1809; KRABBE 1869, STILES 1896, COHN 1901, CLERC 1903
Hymenolepis tenuirostris (RUD.)⁶⁾ 1869; KRABBE 1869, STILES 1896
Hymenolepis setigera (FRÖLICH)⁷⁾ 1789; KRABBE 1869, STILES 1896; CLERC 1903
Hymenolepis lanceolata (BLOCH)⁸⁾ 1782; KRABBE 1869; STILES 1896; WOLFFHÜGEL 1900a, COHN 1901, CLERC 1903

(siehe auch 1906c), dieselbe also nicht der von KRABBE 1869 und CLERC 1906b von dieser Taenie gegebenen Beschreibung entspricht [siehe *Dilepis campylancristrota* (WEDL)].

1) Diese Art wurde von v. LINSTOW als *n. sp.* inquir. kurz beschrieben; sie ist, wie die Untersuchung des Originalmaterials (Museum Berlin) gezeigt, eine typische *Hymenolepis*-Art. In meiner Arbeit über die *Hymenolepis*-Arten 1906c wurde die Art irrtümlich unter den *Coracornithes* aufgeführt.

2) Synonymie: *Halysis liguloides* GERVAIS 1847; *Dilepis liguloides* (GERV.) COHN 1899a. Nach Untersuchung der Originale ist auch *Diorchis oclusa* v. LINSTOW 1906a synonym mit obiger Art.

3) Synonymie: *Dilepis megalorchis* LÜHE, COHN 1899a.

4) Synonymie: *Dicranotaenia aequabilis* RUD., STILES 1896.

5) Synonymie: *Alyselminthus crenatus* ZEDER 1800 ex parte, *Halysis crenata* ZEDER 1803 ex parte, *T. setigera* FRÖLICH, v. FEUEREISEN 1868, *Drepanidotaenia fasciata* STILES 1896; *Dilepis fasciata* COHN 1899a.

6) Synonymie: *Drepanidotaenia tenuirostris* RUD., STILES 1896; *Dilepis tenuirostris* COHN 1899a.

7) Synonymie: *T. fasciata* RUD., v. FEUEREISEN 1868, *Alyselminthus setigerus* ZEDER 1800, *Halysis setigera* ZEDER 1803, *Drepanidotaenia setigera* STILES 1896; *Dilepis setigera* COHN 1899a.

8) Mit *H. lanceolata* BLOCH 1782 soll nach DIESING 1850 synonym sein *T. anserum* FRISCH 1727, *T. anseris* BLOCH 1779 und *T. acutissima* PALLAS 1781. Wenn diese Synonyme wirklich richtig, so müßte obige Taenie *H. anserum* FRISCH heißen (die FRISCH'sche Arbeit habe ich mir

- Hymenolepis collaris* (BATSCH)¹⁾ 1786; KRABBE 1869, STILES 1896 und COHN 1901 als *T. sinuosa* ZEDER beschrieben
- Hymenolepis microsoma* (CREPLIN)²⁾ 1829; KRABBE 1869; COHN 1901
- Hymenolepis megalops* (CREPLIN)³⁾ 1829; RANSOM 1902
- Hymenolepis micranclistrota* (WEDL) 1856; KRABBE 1869
- Hymenolepis coronula* (DUJ.)⁴⁾ 1845, KRABBE 1869, 1882; STILES 1896; WOLFFHÜGEL 1900a, COHN 1901.
- Hymenolepis gracilis* (ZEDER, KRABBE)⁵⁾ 1869; STILES 1896; CLERC 1903, WOLFFHÜGEL 1900a; COHN 1901
- Hymenolepis creplini* (KRABBE)⁶⁾ 1869; COHN 1901
- Hymenolepis anatina* (KRABBE)⁷⁾ 1869; SCHMIDT 1894, STILES 1896; COHN 1901
- Hymenolepis liophallos* (KRABBE) 1869;
- Hymenolepis fragilis* (KRABBE) 1869; FUHRMANN 1906c
- Hymenolepis groenlandica* (KRABBE) 1869
- Hymenolepis fallax* (KRABBE)⁸⁾ 1869
- Hymenolepis octacantha* (KRABBE)⁹⁾ 1869; FUHRMANN 1906c
- Hymenolepis compressa* (LINSTOW) 1892
- Hymenolepis pigmentata* (v. LINSTOW) 1872b

nicht verschaffen können). Sicher ist *H. lanceolata* BLOCH 1782, synonym *T. anseris* BLOCH 1779, es wäre also vielleicht letzterer Name anzunehmen; ich tue dies nicht, weil zunächst noch zu entscheiden ist, ob nicht der FRISCH'sche Name zu gelten hat. Andere Synonyme sind: *Halysis lanceolata* ZEDER 1803, *Drepanidotaenia lanceolata* STILES 1896; *Dilepis lanceolata* COHN 1899a.

1) Die allgemein als *H. sinuosa* ZEDER 1800 bezeichnete Art muß den ältern Namen *H. collaris* BATSCH 1786 annehmen; synonym ist ferner *T. collari nigro* BLOCH 1779, *T. torquata* GMELIN 1790, *Halysis torquata* ZEDER 1803, *Alyselminthus sinuosa* ZEDER 1800, *Halysis sinuosa* ZEDER 1803, *Drepanidotaenia sinuosa* STILES 1896, *Dilepis sinuosa* COHN 1899a.

2) Synonymie: *Dilepis microsoma* COHN 1899a.

3) *Hymenolepis megalops* ist von CREPLIN und nicht von NITZSCH, wie allgemein angegeben, beschrieben worden. Nach DIESING 1850 soll mit ihr synonym sein *T. anatis marilae* CREPLIN 1825.

4) Synonymie: *Dicranotaenia coronula* STILES 1896, WOLFFHÜGEL 1900a; ferner ist nach unserer Untersuchung des Originalmaterials mit dieser Art synonym *H. megalthystera* v. LINSTOW 1905b.

5) Synonymie: *Halysis gracilis* ZEDER 1803, *Drepanidotaenia gracilis* ZEDER, STILES 1896, WOLFFHÜGEL 1900a; *Dilepis gracilis* ZEDER, COHN 1899a.

6) Synonymie: *Dicranotaenia creplini* KRABBE, STOSSICH 1898.

7) Synonymie: *Drepanidotaenia anatina* KRABBE, STILES 1896, *Dilepis anatina* KRABBE, COHN 1899a (s. S. 7).

8) Synonymie: *Lepidotriasis fallax* KRABBE, COHN 1899a.

9) COHN's (1901) Beschreibung von *Drepanidotaenia octacantha* KRABBE bezieht sich auf eine andere Art, welche ich *H. octacanthoides* benannt habe.

- Hymenolepis tenerrima* (v. LINSTOW)¹⁾ 1882
Hymenolepis pachycephala (v. LINSTOW) 1872b, 1904b
Hymenolepis macracanthos (v. LINSTOW) 1877a
Hymenolepis abortiva v. LINSTOW 1904a
Hymenolepis trifolium v. LINSTOW 1905
Hymenolepis sibirica (v. LINSTOW)²⁾ 1905b
Hymenolepis retracta v. LINSTOW 1905b
Hymenolepis bilateralis v. LINSTOW 1905b
Hymenolepis teresoides FUHRMANN 1906b
Hymenolepis simplex FUHRMANN 1906c
Hymenolepis papillata FUHRMANN 1906b
Hymenolepis flagellata FUHRMANN 1906b
Hymenolepis bisaccata FUHRMANN 1906b
Hymenolepis longicirrosa FUHRMANN 1906c
Hymenolepis longivaginata FUHRMANN 1906c
Hymenolepis orthacantha FUHRMANN 1906c
Hymenolepis lobata FUHRMANN 1906b
Hymenolepis tritesticulata FUHRMANN 1907a
Hymenolepis echinocotyle FUHRMANN 1907a
Hymenolepis parvula KOWAL. 1905
Hymenolepis arcuata KOWAL. 1905
Hymenolepis sagitta ROSSETER³⁾ 1906b
Hymenolepis (*Echinocotyle*) *rosseteri* (BLANCH.) 1891, STILES 1896, CLERC 1903.

Coraciiformes.

- Hymenolepis septaria* v. LINSTOW 1906
Hymenolepis brasiliensis FUHRMANN 1906b
Hymenolepis caprimulgorum FUHRMANN 1906b, 1906c
Hymenolepis parvirostellata (v. LINSTOW) 1901 (als *Drepanidotaenia* beschrieben).

Coccygiformes.

- Hymenolepis intermedius* CLERC 1906a.

1) *Hymenolepis tenerrima* VON LINST. scheint uns ähnlich zu sein der *H. nitida* KRABBE 1869, und es gehört diese Art also vielleicht ins Subgenus *Echinocotyle*.

2) Diese Art wurde von O. v. LINSTOW als *Diorchis* beschrieben, sie ist aber, wie unsere Untersuchung der Originale gezeigt, eine *Hymenolepis*.

3) ROSSETER 1906b beschreibt unter dem Namen *Drepanidotaenia sagitta* eine Taenie mit einem Hoden, welche aber, nach der Hakenform zu schließen, wohl eine *Hymenolepis*-Art mit 3 Hoden ist.

Passeriformes.

Hymenolepis stylosa (RUD.) 1809¹⁾; KRABBE 1869, VOLZ 1900, CLERC 1903

Hymenolepis fringillarum (RUD.)²⁾ 1809; KRABBE 1869

Hymenolepis naja (DUJ.) 1845, v. LINSTOW 1872b

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK)³⁾ 1788; KRABBE 1869 (*T. serpentulus* und *T. angulata*), 1882; v. LINSTOW 1893a, VOLZ 1900, COHN 1901, CLERC 1903

Hymenolepis farciminoso GOEZE⁴⁾ 1782; KRABBE 1869 (*T. farciminalis*), VOLZ 1900 (*Diplocanthus farciminalis* BATSCH)

1) Synonymie: *T. serpentiformis* GOEZE 1782 ex parte, *Halysis glandarii* ZEDER 1803, *Diplocanthus stylosus* RUD., VOLZ 1900.

2) Fragliche Synonyme: *T. acinum* PALLAS ex parte 1781, *T. passeris* GMELIN 1790 und *Halysis passeris* ZEDER 1803. *Hymenolepis leptodera* v. LINSTOW 1879b aus *Astur nisus* stammend, scheint, wie schon VOLZ 1900 bemerkt, eine mit einem der Passeres verschlungene *H. fringillarum* RUD. zu sein. In einer Arbeit v. LINSTOW's 1904b wird obige Taenie als *Aploparaksis fringillarum* beschrieben, was wohl ein Irrtum ist.

3) Nach DIESING 1850 sind synonym mit *H. serpentulus* (SCHRANK) folgende Artnamen: *T. corri frugilegi* VIBORG 1795, *T. corri cornicis* GMELIN 1790, *T. corvorum* RUD. 1819 (p. 171), *T. serpentiformis collaris* GOEZE 1782 ex parte, *T. undula* SCHRANK 1788 ex parte. Die des weitern angeführten Synonyme *T. pusilla* GOEZE ex parte und *T. orioli galbuli* RUD. gehören nicht hierher. Es wären nun hier anzufügen die von DIESING zusammengestellten Synonyme von *T. angulata* RUD., da dieselben nichts anderes zu sein scheinen als *T. serpentulus* aus den *Turdus*-Arten. Es sind dies: *T. tennis nodis instructa* BLOCH 1782, *T. nodosa* SCHRANK 1788; *T. maculata* BATSCH 1786, *T. serpentiformis* BATSCH ex parte 1786, *Halysis tudorum* ZEDER 1803. Ob alle diese Synonyme wirklich zu *H. serpentulus* gehören, ist fraglich und nicht mehr mit Sicherheit festzustellen. Als weiteres Synonym kommt hinzu *T. undulata* RUD., wie sie DUJARDIN auffaßt, während seine *T. angulata* RUD. die wirkliche *Dilepis undulata* RUD., d. h. *D. undula* SCHRANK, ist. Bei ZEDER sollen nach DIESING *Halysis cornicis*, *galbulae* und *glandarii* ZEDER 1803 sowie *Alyselminthus serpentulus* ZEDER 1800 und *Halysis serpentulus* ZEDER 1803 ebenfalls obiger Art synonym sein. Weitere Synonyme: *Hymenolepis angulata* RUD., STOSSICH 1898, *Diplocanthus serpentulus* VOLZ 1900, *T. constricta* MORELL 1895. Die von KRABBE 1869 als *T. angulata* RUD. bezeichnete Taenie ist nach COHN 1901 identisch mit *H. serpentulus*.

4) Statt *T. farciminalis* (BATSCH 1786) ist der Name *H. farciminoso* GOEZE anzuwenden. GOEZE und BATSCH sprechen bei dieser Taenie von hinten langen und wurstförmigen Gliedern, so daß es mir scheint, daß die von KRABBE und VOLZ beschriebene Taenie nicht die eigentliche *H. farciminoso* ist. Die GOEZE'sche Art hat hingegen einige Ähnlichkeit mit *Monopylidium musculosum* FUHRMANN, sicher ist dies aber nicht zu sagen. Nach DIESING soll auch *T. sturni* GMELIN 1790 hierher gehören. Weitere

- Hymenolepis bilharzii* (KRABBE) 1869
Hymenolepis petrocinctae (KRABBE) 1882
Hymenolepis orientalis (KRABBE) 1882
Hymenolepis hemignathi SHIPLEY 1898
Hymenolepis polygramma (v. LINSTOW) 1875
Hymenolepis dahmici (v. LINSTOW) 1903
Hymenolepis pellucida FUHRMANN 1906b
Hymenolepis microcolecina FUHRMANN¹⁾ 1906b (*H. uncinata* FUHRM.),
 1906c (*H. microcolecina*)
Hymenolepis brevis FUHRMANN 1906c
Hymenolepis passerina FUHRMANN 1907a
Hymenolepis parina FUHRMANN 1907a
Hymenolepis interruptus CLERC 1906a²⁾
Hymenolepis trichodroma WOLFFHÜGEL 1900a

Untergatt. *Echinocotyle* BLANCHARD 1891a.

Hymenolepis-Arten mit 10 Haken am Rostellum. Die Saugnäpfe groß mit feinen Häkchen am Rande und in der Mitte. Immer ein *Sacculus accessorius*.

Typische Art: *Ech. rosseteri* BLANCHARD 1891a.

Diese Cestoden-Gruppe wurde von BLANCHARD als Genus aufgefaßt und auf Grund des Baues des Scolex charakterisiert ohne jegliche Kenntnis der Anatomie, deren Untersuchung CLERC 1903 gezeigt hat, daß wir es mit typischen *Hymenolepis*-Arten zu tun haben. Er faßt deshalb diese Gruppe als Untergattung auf. Ich wäre geneigt, dieselbe ganz zu streichen, da wir auch bei andern *Hymenolepis*-Arten im Larvenzustande, in der Jugend oder sogar bei vollkommen geschlechtsreifen Formen (*Hym. carioca* MAG., *Hym. echinocotyle* FUHRMANN) bewaffnete Saugnäpfe antreffen (s. FUHRMANN 1906c). Ich führe hier nochmals die Arten des Subgenus *Echinotyle* auf, sie finden sich aber ebenfalls in der Liste der *Hymenolepis*-Arten.

Synonyme: *Diplacanthus farciminalis* VOLZ 1900 und *T. undulata* DUJARDIN (nach VOLZ 1900).

1) Dieser Cestode wurde von mir (1906b) unter dem Namen *H. uncinata* FUHRMANN beschrieben. Der Name ist aber bereits für eine Säugetier-*Hymenolepis*-Art vergeben. Ich habe deshalb 1906c den Namen *H. microcolecina* vorgeschlagen.

2) Dieser Artname ist bereits von RUDOLPHI vergeben, er muß also durch einen andern ersetzt werden.

Charadriiformes.

- Hymenolepis (Echinocotyle) uralensis* CLERC 1902, 1903
Hymenolepis (Echinocotyle) nitida (KRABBE) 1869; CLERC 1902, 1903
Hymenolepis (Echinocotyle) nitidulans (KRABBE) 1882
Hymenolepis (Echinocotyle) tenuis CLERC 1906a.

Anseriformes.

- Hymenolepis (Echinocotyle) rosseteri* R. BLANCH. 1891a, STILES 1896.

Gatt. *Diorchis* CLERC 1903.

Rostellum mit einfachem Hakenkranz. Hakenzahl gering (10). Innere Längsmuskelschicht aus 8 Bündeln bestehend. Genitalporieinseitig. Zwei Hoden. Uterus sackförmig. In Vögeln.

Typische Art: *Diorchis acuminata* CLERC 1902.

Ralliformes.

- Diorchis inflata* (RUD.) 1809¹⁾, KRABBE 1869, JACOBI 1898, CLERC 1903, LINSTOW 1906a
 ? *Diorchis acuminata* CLERC 1903.²⁾

Anseriformes.

- Diorchis acuminata* CLERC 1903, CLERC 1902 (*Drepanidotaenia acuminata*)
Diorchis parviceps (VON LINSTOW)³⁾ 1872b, 1904b.

1) Diese Art wurde allgemein als *T. inflata* bezeichnet, doch ist der älteste Name *T. fulicae* RUD., der aber nicht als guter Artname zu gelten hat. Sie wurde von COHN (1901) und v. LINSTOW (1906a) mit Unrecht als *Drepanidotaenia*-, d. h. *Hymenolepis*-Art angesehen. *T. inflata* RUD., WEDL 1856 ist wohl eine andere Art derselben Subfamilie. KRABBE glaubt, daß sie vielleicht identisch sei mit *T. spiculigera* (NITZSCH) GIEBEL, während mir letztere Art eher mit der wirklichen *D. inflata* RUD. identisch scheint, und zwar wegen der Angabe GIEBEL's, daß der Cirrus an seiner Basis knotig angeschwollen ist, wie dies regelmäßig für *D. inflata* RUD. zutrifft. Weitere Synonyme: *Dilepis inflata* (RUD.) COHN 1899a, *Drepanidotaenia inflata* (RUD.) PARONA 1899, *Hymenolepis inflata* COHN 1900.

2) *Diorchis acuminata* CLERC wurde zuerst als *Drepanidotaenia* beschrieben; sie soll, was wohl ein Irrtum, auch in Ralliformes (*Fulica atra*) vorkommen (s. S. 7).

3) Synonymie: *Hymenolepis parviceps* (VON LINST.) FUHRMANN 1906b.

Gatt. *Aploparaksis* CLERC 1803.

Synonym: *Monorchis* CLERC 1902, *Skorikowia* v. LINSTOW 1905b.

Cestoden mit Rostellum, das einen einfachen Kranz von Haken trägt. Genitalpori einseitig. Ein Hoden. Große Vesicula seminalis externa. Uterus sackförmig. In Vögeln.

Typische Art: *Aploparaksis filum* (GOEZE 1902).

Dieses Genus wurde zuerst von CLERC 1902 mit dem Namen *Monorchis* benannt, da derselbe aber bereits an eine Trematodengenuss vergeben, so mußte der Name geändert werden. Die hierher gehörenden Arten stammen zum Teil aus den Genera *Diplacanthus* WEINLAND, *Drepanidotaenia* RAILLET und dem alten Genus *Taenia*.

Die mit zwei Hoden beschriebene *Skorikowia clausa* v. LINSTOW 1905b ist, wie unsre Untersuchung der Originale gezeigt, eine typische *Aploparaksis* und zwar *A. brachyphallos* KRABBE, so daß also das neue Genus *Skorikowia* fällt!

Charadriiformes.

Aploparaksis filum (GOEZE)¹) 1782; KRABBE 1869, CLERC 1902, 1903
Aploparaksis filum var. *pseudofilum* CLERC²) 1903, 1902
Aploparaksis crassirostris (KRABBE)³) 1869; CLERC 1902, 1903
Aploparaksis hirsuta (KRABBE) 1882⁴), CLERC 1902, 1903

1) LÖNNBERG 1896 beschreibt aus einem Raubvogel (*Polyborus thoarus*) eine *Taenia filum* var. *polybori* LÖNNBERG, welche, wie unsere Untersuchung gezeigt, nichts anderes ist als junge Exemplare einer von dem betreffenden Raubvogel mit seiner Beute gefressenen *Aplop. filum*. LINTON 1892 gibt diesen Cestoden aus *Larus californicus* an, doch ist aus seiner rein äußerlichen Beschreibung nicht zu ersehen, ob dies wirklich zutreffend, und mir scheint seine *T. filum* identisch zu sein mit der in Möven vorkommenden *Hymenolepis fusus* (KRABBE). *Apl. filum* ist ein typischer Cestode der Anseriformes. Synonymie: *Halysis filum* ZEDER 1803, *Diplacanthus filum* VOLZ 1896; *Hymenolepis filum* PARONA 1899a, COHN 1901; *Monopylidium filum* PARONA 1902; *Monorchis filum* CLERC 1902.

2) Synonymie: *Monorchis pseudofilum* CLERC 1902.

3) Synonymie: *Dieranotaenia crassirostris* STOSSICH 1898, *Monorchis crassirostris* CLERC 1902.

4) Synonymie: *Monorchis hirsuta* CLERC 1902.

- Aploparaksis brachyphallos* (KRABBE) 1869¹⁾, 1882
Aploparaksis penetrans CLERC²⁾ 1902, 1903
Aploparaksis diminuens VON LINSTOW 1905b.

Lariformes.

- Aploparaksis cirrosa* (KRABBE)³⁾ 1869; CLERC 1902, 1903.

Anseriformes.

- Aploparaksis fureigera* (RUD.) 1819⁴⁾, KRABBE 1869 (*T. rhomboidea*),
 STILES 1896 *Dicranotaenia fureigera* RUD., VON LINSTOW 1905a
 (*T. rhomboidea*)
Aploparaksis birulai VON LINSTOW 1905b.

Passeriformes.

- Aploparaksis dujardini* (KRABBE) 1869, FUHRMANN 1895, CLERC 1902,
 1903.

7. Fam. *Taenidae* PERR.

Meist große Arten, deren reife Glieder länger als breit sind. Scolex mit Rostellum und meist mit doppeltem Hakenkranz, selten rudimentär. Genitalpore unregelmäßig alternierend; zahlreiche Hoden in den Seitenteilen des Mittelfeldes. Uterus mit Medianstamm und später auftretenden Seitenästen. In Säugetieren und Vögeln.

1) Synonymie: *Hymenolepis brachyphallos* (KRABBE) FUHRMANN 1906b. Auf Grund der Untersuchung des Originalmaterials ist zu obiger Art ebenfalls synonym *Skorokowia clausa* v. LINSTOW 1905b und *Diorchis serpentina* v. LINSTOW 1905b.

2) Synonymie: *Monorchis penetrans* CLERC 1902.

3) Synonymie: *Monorchis cirrosa* CLERC 1902.

4) Diese Art ist synonym mit *T. rhomboidea* DUJARDIN 1855, welche nach Untersuchungen von KRABBE wahrscheinlich synonym ist mit *T. trilineata* BATSCH sowie mit *T. lineata* BLOCH (s. STILES 1896, p. 34) und mit *T. longirostris* FRÖLICH, vielleicht auch mit *T. conica* MOLIN. In der CREPLIN'schen Sammlung finden sich unter dem Namen *T. trilineata* BATSCH mindestens 2 Arten, von welchen die eine *A. fureigera* RUD., die andere unbestimmbar. DUJARDIN glaubt, daß *T. lineata*, *T. trilineata* und *T. longirostris* nur eine Varietät von *T. sinuosa* ist, was wohl kaum zutreffend. Weitere Synonyme: *Dicranotaenia fureigera* STILES 1896, *Aploparaksis rhomboidea* v. LINST. 1905a.

Gatt. *Taenia* LINNÉ.

Scolex mit rudimentärem Rostellum oder Rostellum mit zwei Hakenkränzen. Genitalpori unregelmäßig abwechselnd. Hoden zahlreich vor den am Hinterrand der Proglottis gelegenen weiblichen Genitaldrüsen. Uterus ein medianer Kanal, von dem seitlich rechts und links zahlreiche Abzweigungen abgehen. In Säugetieren und Vögeln.

Typische Art: *Taenia solium* LINNÉ.

Dieses bei Säugetieren sehr verbreitete Genus hat bei Vögeln nur wenige Vertreter.

Lariformes.

Taenia diaphana FUHRMANN 1908b.

Aptenodytiformes.

Taenia diaphoracantha FUHRMANN 1908b.

Anseriformes.

Taenia brachysoma SETTI 1899a

Taenia krabbei KOW. 1895, STILES 1896.

Accipitres.

Taenia cylindracea BLOCH 1782¹⁾, VOLZ 1900, *T. globifera* und *T. armigera*, COHN 1901 (*Cladotaenia globifera*)

Taenia heteracantha FUHRMANN 1906a.

COHN hat für diese Art das Genus *Cladotaenia* aufgestellt, welches aber nicht aufrecht erhalten werden kann, wenn wir nicht die zweite von ihm in dasselbe gestellte Art *T. dentritica* aus dem Eichhörnchen als neue typische Art des Genus aufstellen wollen. Für letztere ist das Genus *Catenotaenia* JANICKI 1904 gegründet worden.

1) Nach den Nomenklaturregeln muß diese jetzt allgemein *T. globifera* BATSCH 1786 genannte Art *T. cylindracea* BLOCH 1782 genannt werden. Andere Synonyme dieser Art sind *Taenia brachium globulosum* GOEZE 1782, *T. globulosa* SCHRANK 1788, *T. crenulata* SCHULTZE 1825 und *Halysis globifera* ZEDER 1803. CLERC 1903 hat ferner gezeigt, daß *Taenia armigera* VOLZ (1900) identisch ist mit *T. globifera* d. h. *T. cylindracea*.

Zwischengruppe.

Gatt. *Diploposthe* JACOBI 1896.

Rostellum mit einem einfachen Kranz von 10 Haken bewaffnet. Genitalpori doppelt, ebenso Cirrusbeutel und Vagina. Geschlechtsdrüsen einfach. Wenige Hoden, ein Keimstock, ein Dotterstock und ein Uterus. In Vögeln.

Typische Art: *Diploposthe laevis* (BLOCH) 1782.

Anseriformes.

Diploposthe laevis (BLOCH)¹⁾ 1782, KRABBE 1869, 1882, JACOBI 1897, COHN 1901, KOWALEWSKI 1903, FUHRMANN 1905b
Diploposthe tuberculata (KREFFT)²⁾ 1873.

Fam.: *Acoleinidae* FUHRMANN.

Cestoden mit dicker Stobila und kurzen Gliedern. Scolex sehr verschieden gestaltet. Die Muskulatur des Parenchyms besteht aus mindestens zwei Längsmuskelzonen, mit welchen Lagen von Transversalfasern alternieren. Cirrus einfach oder doppelt, sehr groß und stark bewaffnet. Weibliche Genitalöffnung fehlt. In Vögeln.

Gatt. *Acoleus* FUHRMANN 1899c.

Weibliche und männliche Geschlechtsorgane einfach. Cirrusbeutel regelmäßig abwechselnd links und rechts ausmündend. Receptaculum seminis sehr groß. In Vögeln.

Typische Art: *Acoleus vaginatus* (RUD. 1819).Syn.: *Acoleus armatus* FUHRMANN 1899c u. d.

1) Mit *D. laevis* sind synonym, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials gezeigt hat, *T. bifaria* v. SIEBOLD 1848 (MONTICELLI 1897), *D. lata* FUHRMANN 1900a und *Diploposthe suigeneris* KOW. 1903. *Taenia trichosoma* v. LINSTOW 1882, ein junger Cestode ohne Spur von Geschlechtsorganen, scheint uns ebenfalls identisch zu sein mit *D. laevis* (BLANCH.). — Weitere Synonyme: *Halysis laevis* ZEDER 1883, *Colugnia bifaria* v. SIEBOLD (STILES 1890).

2) *Diploposthe tuberculata* KREFFT ist nicht, wie BLANCHARD 1891a meint, eine *Ophryocotyle*, sondern wohl sicher eine *Diploposthe*.

Ralliformes.

Acoelus longispiculus (STOSSICH)¹⁾ 1895.

Charadriformes.

Acoelus vaginatus (RUD.) 1809²⁾, FUHRMANN 1899c (*Acoelus armatus* FUHRMANN) 1899d, 1900b
Acoelus crassus FUHRMANN 1900b.

Gatt. *Gyrocoelia* FUHRMANN 1899c.

Syn.: *Brochocephalus* v. LINSTOW 1906a.

Rostellum bewaffnet mit einer Reihe von Haken, welche in achtfach gebrochener Zickzacklinie angeordnet. Weibliche und männliche Geschlechtsorgane einfach. Cirrusbeutel mündet unregelmäßig abwechselnd. Receptaculum seminis klein, Uterus ringförmig oval mit zahlreichen Ausstülpungen. In der Medianlinie am Hinterrande der Proglottis findet sich in ganz reifen Gliedern eine dorsale und ventrale Uterusöffnung. In Vögeln.

Typische Art. *Gyrocoelia perverse* FUHRMANN 1899c.

Trotz der verschiedenen Beschreibung ist nach unserer Untersuchung des Originalmaterials *Brochocephalus* v. LINSTOW 1906a synonym mit *Gyrocoelia*.

Charadriiformes.

Gyrocoelia perverse FUHRMANN 1899c, 1899d
Gyrocoelia leuce FUHRMANN 1900a, 1900b

1) LÜHE gibt in einem Referat über ARIOLA's Revision der Bothrioccephaliden an, daß die *Bothriotaenia longispicula* (STOSS.) eine *Acoelus*-Art sei (in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 29, 1901).

2) Diese Art wurde von mir als *A. armatus* FUHRMANN beschrieben; die Untersuchung des Originalmaterials der RUDOLPHI'schen Sammlung zeigte dann, daß dieselbe identisch ist mit *T. vaginatus* (RUD.). Nach DIESING 1850 muß als synonym zu obiger Art betrachtet werden: *Halysis charadrii* ZEDER 1803, *T. charadrii himantopodis* ROSA 1794, *T. himantopodis melanopteri* NITZSCH. Die übrigen noch als synonym erwähnten Arten sind es sicher nicht; auch für die erwähnten ist die Identität nicht sicher.

Gyrocoelia brevis FUHRMANN 1900b
Gyrocoelia paradoxa (v. LINSTOW) 1906a.¹⁾

Gatt.: *Diplophallus* FUHRMANN 1900b.

Männliche Geschlechtsorgane doppelt, weibliche Geschlechtsorgane einfach. Receptaculum seminis groß und doppelt. In Vögeln.

Typische Art. *Diplophallus polymorphus* (RUD.) 1819.

Charadriiformes.

Diplophallus polymorphus (RUD.) 1819²⁾, KRABBE 1869, WOLFFHÜGEL 1898a, 1900a, FUHRMANN 1900b, COHN 1900d.

Gatt.: *Shipleya* FUHRMANN 1907.

Scolex ohne Rostellum mit scheidelständigen Papillen. Männliche Genitalporen regelmäßig abwechselnd. Penis von konischer Form und bewaffnet mit großen Haken. Der Dotterstock liegt dorsal vom Keimstock. Vonder Vagina persistiert nur ein zentral gelegenes kleines Receptaculum seminis. Uterus anfangs ringförmig, später stark verzweigt.

Typische Art: *Shipleya inermis* FUHRMANN 1907b.

Charadriiformes.

Shipleya inermis FUHRMANN 1908b.

Gatt. *Dioicocestus* FUHRMANN 1900a.

Getrenntgeschlechtliche Cestoden. Weibchen dicker und breiter als das Männchen. Die männlichen Geschlechtsorgane sind doppelt. Die weiblichen Geschlechtsorgane sind einfach, die blindendigende Vagina unregelmäßig abwechselnd links oder rechts dem Strobilarande sich nähernd. In Vögeln.

Typische Art: *Dioicocestus paronai* FUHRMANN 1900a.

1) Synonym *Brochocephalus paradoxus* v. LINSTOW; ganz verfehlte Beschreibung.

2) Synonym: *Gyrocotyle polymorpha* KRABBE (PARONA) 1902.

Ciconiiformes.

Dioicocestus paronai FUHRMANN 1900a, 1900b.

Podicipediformes.

Dioicocestus aspera (MEHLIS) 1831¹⁾, FUHRMANN 1900b

Dioicocestus acotylus FUHRMANN 1904a u. 1904b

Dioicocestus (?) *novae hollandiae* KREFFT 1873.²⁾

9. Fam.: *Amabilinidae* FUHRMANN.

Taenien mit eigentümlich gestalteten Anhängen an den Proglottiden. Die Vagina fehlt und ist durch eine akzessorische seitlich, ventral oder dorsal gelegene weibliche Geschlechtsöffnung ersetzt.

Gatt. *Amabilia* DIAMARE 1897a.

Synonym: *Aphanobothrium* v. LINSTOW 1906a.

Scolex sehr klein, bewaffnet mit einem hakentragenden Rostellum. Männliche Geschlechtsöffnungen doppelt. Cirrus stark bewaffnet. Weibliche Geschlechtsdrüsen einfach. Vagina ventral ausmündend, in einen median ausmündenden Kanal des Excretionsystems sich eröffnend (?). Uterus ein dorsoventralgestellter Ring mit dorsoventralen Anastomosen. Oncosphäre sphärisch, Hüllen spindelförmig. In Vögeln.

Typische Art: *Amabilia lamelligera* (OWEN 1835).

Trotz der vollkommenen verschiedenen Beschreibung von seiten von v. LINSTOW (1906a) ist *Aphanobothrium catenatum* v. LINST., wie unsere Untersuchung des Originalmaterials zeigt, identisch mit *A. lamelligera* OWEN!

Phoenicopteri.

Amabilia lamelligera OWEN 1835³⁾; DIAMARE 1897a, COHN 1898, 1900d.

1) *D. aspera* (MEHLIS) ist sehr oft, so auch von RUDOLPHI, KRABBE und andern, als *T. lanceolata* bestimmt worden.

2) Nach den Angaben von KREFFT 1873 zu urteilen und auf Grund des Wohnortes des Parasiten schließe ich, daß diese Species eine *Dioicocestus*-Art ist.

3) Synonym: *Aphanobothrium catenatum* v. LINST. 1906a.

Gatt. *Schistotaenia* COHN 1900d.

Scolex mit einem sehr großen mit Haken bewaffneten Rostellum. Die Glieder tragen seitliche Anhänge. Männliche Geschlechtsöffnungen sind lateral und unregelmäßig abwechselnd. Vagina fehlt. Weibliche Genitalöffnung ersetzt durch eine median dorsal und ventral ausmündende akzessorische Vagina. In Vögeln.

Typische Art: *Schistotaenia macrorhyncha* (RUD. 1819), COHN 1900d.

Podicipediformes.

Schistotaenia macrorhyncha RUD. 1819¹⁾, KRABBE 1869, COHN 1900d, CLERC 1907.

Gatt.: *Tatria* KOWALEWSKI 1904b.

Kleine Taenien mit Scolex, dessen Rostellum mit einem Hakenkranz bewaffnet. Die wenigen Glieder besitzen seitliche Anhänge. Männliche Genitalporen regelmäßig abwechselnd. Großer Cirrusbeutel, wenige Hoden. Keine der Vaginalöffnung entsprechende weibliche Geschlechtsöffnung. Die Vagina geht von einer Proglottis in die andere und vereinigt so die Receptacula seminis, welche in der Mitte der Strobila gelegen. Es besteht als Ersatz eine akzessorische Vagina, welche auf der entgegengesetzten Seite der Penisöffnung liegt und oft am Proglottidenrande ausmündet. In Vögeln.

Typische Art: *Tatria biremis* Kow. 1904b.

Dieses interessante Genus ist von KOWALEWSKI begründet und genau beschrieben worden. Die eingehende Untersuchung einer

1) Diese Art ist, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials ergeben, identisch mit *Sch. scolopendra* DIES., während sie COHN 1900d als besondere Art betrachtet und beschreibt.

Weitere Synonyme: *T. scolopendra* DIESING 1850, *Drepanidotaenia macrorhyncha* RUD. PARONA 1899, *Anabilia macrorhyncha* RUD. PARONA 1902.

v. LINSTOW (1908) setzt diese Art mit Unrecht in das Genus *Tatria* (*Tatria scolopendra* DIES., LINSTOW 1908).

zweiten Art durch MRAZEK 1905 hat einige neue eigentümliche anatomische Tatsachen zutage gefördert, welche ich in der KOWALEWSKI'schen Genusdiagnose eingefügt habe.

Podicipediformes.

Tatria acanthorhyncha WEDL¹⁾ 1856, KRABBE 1869, MRAZEK 1905

Tatria biremis KOW. 1904b

Tatria appendiculata FUHRMANN 1907b.

10. Fam. *Fimbriariidae* WOLFFHÜGEL.

Cestoden mit kleinem leicht abfallendem Scolex, der durch einen vom vorderen Teil der Strobila gebildeten sehr großen Pseudoscolex ersetzt wird. Innere und äußere Segmentation der Strobila fehlt. Genitalpori einseitig. Mehrere männliche und weibliche Geschlechtsgänge münden ohne Ordnung dicht gedrängt am Strobilarande aus. In Vögeln.

Gatt.: *Fimbriaria* FROELICH 1802.

Synonyme: *Epision* LINTON 1892, *Notobothrium* v. LINSTOW 1905b.

Scolex fällt leicht ab und ist ersetzt durch einen hammerförmigen Pseudoscolex. Äußere und innere Segmentation der Strobila fehlt. Genitalpori einseitig. Mehrere männliche und weibliche Genitalgänge münden ohne Ordnung untereinander am Strobilarande aus. Uterus löst sich in eine große Zahl von Eischläuchen auf. In Vögeln.

Typische Art: *Fimbriaria fasciolaris* (PALLAS 1781).

Dieses Genus wurde von WOLFFHÜGEL 1900a einer sehr eingehenden Untersuchung unterzogen. v. LINSTOW 1905b hat unter dem Genusnamen *Notobothrium* als neues Bothriocephaliden-Genus (!!)

1) Nach KRABBE 1869 soll diese Art vielleicht identisch sein mit *T. scolopendra* DIES., was nicht zutreffend, da letztere mit *T. macrorhyncha* RUD. identisch und eine *Schistotaenia* ist. COHN 1900 sagt, daß dieser Cestode, den er bereits früher als unsichere Art des Genus *Amoebotaenia* aufgezählt, nach seiner Untersuchung eine sichere Art dieses Genus sei, was aber, wie MRAZEK gezeigt, vollkommen unzutreffend ist. LINSTOW 1908 sagt irrtümlich, daß MRAZEK diese Art als *Schistotaenia* beschrieben.

einen Cestoden, *N. arctium* v. LINSTOW, beschrieben, der, wie unsere Untersuchung des Originalmaterials gezeigt hat, absolut identisch ist mit *Fimbriaria fasciolaris*! Der Pseudoscolex dieses Cestoden ist so gefaltet, daß er bei oberflächlichem Zusehen zwei Bothrien vortäuscht. Früher hat bereits LINTON ein besonderes Genus *Epision* für dieselbe Art geschaffen.

Anseriformes.

Fimbriaria fasciolaris (PALLAS)¹⁾ 1781, KRABBE 1869 (*Taenia malleus*),
WOLFFHÜGEL 1898, 1900a
Fimbriaria plana v. LINSTOW 1905a.

Ungenügend bekannte Genera.

Gatt.: *Copesoma* SINITZINE 1896.

Scolex mit einem mächtigen Rostellum. Genitalpori auf einer Papille ausmündend. In den jungen Proglottiden sind die unregelmäßig abwechselnden Genitalporen ventral, in den reifen Gliedern lateral gelegen. In Vögeln.

Typische Art: *Copesoma papillosum* SINITZINE.

Dieses Genus ist durchaus ungenügend charakterisiert auf Grund von sehr schlecht erhaltenen Material. Die typische Art aus *Tringa minuta* stammend ist wohl identisch mit einer der zahlreichen aus diesem Vogel bekannten Cestoden.

Charadriiformes.

Copesoma papillosum SINITZINE 1896.

Tetracisdicotyla FUHRMANN 1907a.

Scolex ohne Rostellum mit 4 großen Saugnäpfen, welche ein eigentümliches Muskelorgan enthalten. Strobilation undeutlich. Geschlechtsorgane unregelmäßig abwechselnd. Cirrusbeutel groß, Hoden zahlreich. In Vögeln.

Typische Art: *Tetracisdicotyla macroscolecina* FUHRMANN.

1) Hierzu ist synonym: *T. malleus* GOEZE 1782, *Alyselminthus malleus* ZEDER 1800, *Halysis malleus* ZEDER 1803, *Fimbriaria malleus* FROELICH 1802, *Fimbriaria mitra* FRÖLICH 1802, *Taenia pediformis* KREFFT (?), *Epision plicatus* LINTON 1892, *Notobothrium arcticum* v. LINSTOW 1905b.

Ciconiiformes.

Tetracisdicotyla macroscolecina FUHRMANN 1907a.

Ungenügend bekannte Arten von Vogeltaenien.

Es sollen in den nachfolgenden Specieslisten alle diejenigen Arten angeführt werden, welche zu ungenügend bekannt sind, um in ein bestimmtes Genus eingereiht werden zu können. Von den meisten derselben waren die Typen nicht erhältlich oder sind dieselben nicht mehr vorhanden. In den Fußnoten sind eine größere Zahl von Arten angeführt, welche ich zu streichen vorschlage. Es sind dies alles alte Arten, von welchen die Typen nicht mehr existieren und welche so mangelhaft beschrieben, daß ein Erkennen nicht mehr möglich ist. Ich glaube, daß der Zeitpunkt gekommen, diesen unnützen Ballast endlich definitiv zu entfernen.

Apterygiformes.

Taenia apterycis CHATIN 1885.

Galliformes.

Taenia echinata OLSSON 1893¹⁾

Taenia odiosa LEIDY 1887 1904

Tetrathyridium perdicis saxatilis RUD. 1819.²⁾

Ralliformes.³⁾

Taenia gallinula VAN BEN. 1858.

1) Diese Art ist vielleicht eine *Davainea*.

2) Diese jungen geschlechtslosen Würmer scheinen nach Größe des Kopfes und Fehlen eines Rostellum *Rhabdometra tomica* CHOLODK. oder *Rh. nigropunctata* CRETU anzugehören.

3) Zu streichende Arten: *Taenia ralli* RUD. 1809 (aus *Crex crex*) (*Halysis ralli* ZEDER 1803). Der Typus dieser Art existiert nicht mehr, sie ist vielleicht identisch mit *Anomotaenia pyriformis* WEDL, doch ist die Identifizierung wegen der sehr mangelhaften Beschreibung nicht möglich.

Taenia spiculigera GIEBEL 1866 (aus *Fulica* etwa) ist zu mangelhaft beschrieben und die Typen zerstört. SINITZINE 1896 will die Art gefunden haben und schuf die Varietät *T. spiculigera* NITZSCH var. *varsoviensis* SINITZINE. Der von SINITZINE beschriebene Cestode ist eine *Hymenolepis*-Art, ob mit *T. spiculigera* identisch, ist sehr fraglich. SINITZINE gibt noch an, daß *T. spiculigera* synonym sei mit *T. inflata* (RUD., WEDL); dem widerspricht vollkommen ein Vergleich der Hakenformen seiner Varietät und der Zeichnung von KRABBE und WEDL.

Charadriiformes. 1)

- Taenia coronata* KREFFT 1873
Taenia rugosa KREFFT 1873
Taenia nilotica KRABBE 1869
Taenia cryptacantha KRABBE 1869
Taenia megalorhyncha KRABBE 1869
Taenia friisiana KRABBE 1882
Taenia tetrabothroides LÖNNBERG 1890
Taenia increescens v. LINSTOW 1888.

Lariformes. 2)

- Taenia distincta* LÖNNBERG 1889.³⁾

Columbiformes.

- Taenia obvelata* KRABBE 1882.

Podicipediformes.

- Taenia paradoxa* KREFFT 1873.

Aptenodytiformes.

- Taenia zederi* BAIRD 1853.

1) Zu streichende Arten: Von *Taenia gallinaginis* RUD. 1809 (aus *Gallinago gallinago*) und *Taenia totani* RUD. 1819 (aus *Totanus stagnatilis* und *Glottis*) existiert das Originalmaterial nicht mehr und ist die Beschreibung zu unvollständig, um die Arten wiederzuerkennen. Ebenso steht es mit *T. charadri* RUD., *T. tringae* RUD. und *T. scolopacis* RUD., von welchen die Typen sehr schlecht erhalten. Wegen der von NITZSCH benannten und von GIEBEL beschriebenen Arten dieser Vogelgruppe siehe am Schlusse dieses Abschnittes. *Taenia silicula* SCHRANK 1790 (aus *Totanus calidris*), (*Halysis silicula* ZEDER 1803) ist nicht erkenntlich beschrieben, vielleicht identisch mit *Hymenolepis sphaerophora* (RUD.).

2) Zu streichende Arten: *Taenia acae picae* FABRICIUS 1780 (aus *Uria troile*) ist nach RUDOLPHI vielleicht eine Bothriocephalide oder nach KRABBE *Tetrabothrius macrocephalus*; die Beschreibung ganz ungenügend. Von *Taenia lari cani* RUD. 1819 (aus *Larus canus*) existieren die Typen nicht mehr, sie ist nicht aus der Beschreibung zu erkennen.

Taenia sternaie hirundinis Mus. Vind. Cat. ist vielleicht identisch mit *Choanotaenia inversa* RUD., eine Beschreibung existiert nicht.

3) *Taenia distincta* scheint eine *Dilepis*-Art zu sein.

Ciconiiformes.

- Taenia papilla* WEDL. 1856 ¹⁾
Taenia brevisrostris WEDL. 1856
Taenia leuckarti KRABBE 1869. ¹⁾

Accipitres.

- Taenia viator* LEIDY 1887; 1904.

Psittaciformes. ²⁾

- Taenia anoplocephaloides* FUHRMANN 1902b. ³⁾

Anseriformes. ⁴⁾

- Taenia conica* MOLIN 1858 ⁵⁾
Taenia moschata KREFFT 1873
Taenia cylindrica KREFFT 1873

1) Nach KRABBE nähert sich *T. papilla* WEDL. in der Form der Haken sehr der *T. leuckarti*, und vielleicht ist ersterer einfach der Kranz der großen Haken ausgefallen, was die Differenz in der Zahl der Haken erklären würde. Synonym: *Drepanidotaenia papilla* WEDL. STOSSICH 1818.

2) Zu streichende Arten: *Taenia longissima* GOEZE 1782 wurde von RUDOLPHI als *Taenia filiformis* RUD. 1809 beschrieben und wird als solche in der Literatur angeführt. doch ist sie, da die Beschreibung sehr mangelhaft und der Typus nicht mehr vorhanden, wohl zu streichen, doch habe ich sie als fragliche *Davainea* angeführt. Nach DIESING 1850 ist mit ihr ferner synonym *Taenia psittaci* GMELIN 1790 (s. S. 45).

3) Dieser Cestode ist wahrscheinlich eine Anoplocephalide, die in keinem der bestehenden Genera unterzubringen ist. Der Scolex ist unbekannt.

4) Zu streichende Arten: *Taenia anatis tadornae* VIBORG aus *Tadorna* ist nicht zu erkennen.

Taenia microscopica MIRAM 1890 ist eine junge Taenie ohne Geschlechtsorgane und aus der mangelhaften Beschreibung ist nichts zu erkennen.

Taenia transverse elliptica DIES. 1854 (aus *Aythya ferina*), die Typen existieren nicht mehr, sie ist nicht kenntlich beschrieben worden.

T. imbutiformis (POLONIO 1860) (aus *Anas boschas*) soll nach RAILLET ein *Mesocestoides* sein, was wohl nicht richtig; diese Art ist sehr mangelhaft beschrieben und wohl zu streichen (s. STILES 1896).

Taenia amphigya CREPL. 1851 wurde eine nicht näher beschriebene Taenie aus *Aythya ferina* LIN. benannt. Der Autorname dieser Taenie ist nicht GURLT 1845, wie BRAUN 1894—1900, p. 1139, angibt.

Taenia trilineata BATSCH, eine nicht zu identifizierende Taenie aus verschiedenen *Anas*-Arten, soll nach DIESING synonym sein mit *T. lineata* BLOCH, *T. anatis* β *lineata* GMELIN, *T. longirostris* FRÖLICH und *Halysis trilineata* ZEDER 1803.

5) *Taenia conica* MOLIN ist nach KRABBE vielleicht identisch mit *A. rhomboidea* d. h. *A. furcigera* RUD.

Taenia pediformis KREFFT 1873 ¹⁾

Taenia bairdii KREFFT 1873

Taenia macrocantha LINTON 1892

Taenia destituata LÖNNBERG 1889.

Coccyiformes. ²⁾

Taenia cyclocephala CHATIN 1880.

Coraciiformes. ³⁾

Taenia simpla LEIDY 1887, 1904

Taenia intricata KRABBE 1882

Taenia caprimulgi KRABBE 1882.

Strigiformes.

Taenia strigis acadiae LEIDY 1855, 1904.

Pici.

Taenia crenata GOEZE 1782

Taenia vexata LEIDY 1887, 1904.

Passeriformes. ⁴⁾

Taenia platycephala RUD. 1809 ⁵⁾

1) *Taenia pediformis* KREFFT ist nach WOLFFHÜGEL vielleicht synonym mit *Fimbriaria fasciolaris* (PALLAS).

2) Aus dieser Vogelgruppe wird *Taenia filiformis* RUD. (synonym mit *T. longissima* GOEZE) erwähnt; da die Originalbeschreibung dieses Papageiestoden sehr mangelhaft, so ist es sicher, daß die Bestimmung eine unrichtige ist.

3) Zu streichende Arten: Von *Taenia pici* RUD. 1809 aus *Dendrocopus medius* und *Taenia coraciae* Cat. M. V. (aus *Coracias garrulus*) existieren die Typen nicht mehr, und die Beschreibung ist mangelhaft oder ganz fehlend. PARONA 1902 benennt eine Taenie *Hymenolepis coraciae* RUD. aus *Coracias garrula*, doch ist die Bestimmung wertlos, da keine Beschreibung dieser Taenie existiert.

4) Zu streichende Arten: *Taenia nasuta* RUD., mit welcher nach DIESING 1850 *Alyselminthus pari* ZEDER 1800 und *Halysis pari* ZEDER 1858 synonym sein soll, ist, wie ich am Originalmaterial, das aus *Parus major* stammt, erkennen konnte, eine Bothriocephalide ohne entwickelte Geschlechtsorgane; alle von ältern Autoren als *T. nasuta* bezeichneten Cestoden sind, wie aus DUJARDIN hervorzugehen scheint, identisch mit *H. fringillarum* RUD., wie übrigens auch KRABBE 1869 annimmt. Von *Taenia turdi* RUD. 1819 (aus *Turdus* sp.) und *T. dendrocolaptis* RUD. (aus *Dendrocolaptes*) ist das Originalmaterial in unbrauchbarem Zustande. *T. turdi musici* I u. II von BELLINGHAM 1844 und *Taenia amadinae* COBBOLD 1861 (aus *Spermestes cucullata*) sind als *Species inquirendae* zu streichen.

- Taenia pyramidata* RUD. 1819
Taenia motacillae cayanae RUD. 1819
Taenia motacillae provincialis RUD. 1819; KRABBE 1869
Taenia motacillae brasiliensis RUD. 1819; KRABBE 1869
Taenia exigua DUJARDIN 1845
Taenia purpurata DUJARDIN 1845
Taenia pestifera LEIDY 1855, 1887, 1904
Taenia wrigera LEIDY 1855, 1904
Taenia oporornis LEIDY 1887, 1904
Taenia chlamydoderae KREFFT 1873
Taenia colliculorum KRABBE 1869
Taenia praecox KRABBE 1882
Taenia polyarthra KRABBE 1882
Taenia pyramidalis SINITZINE 1896¹⁾
Taenia muscipalae V. LINSTOW
Taenia coracina PARONA 1901.

Taenia innoaminata KRABBE 1879, 1882; Cestode dessen Wirt nicht genau bekannt und der aus einer Bachstelze oder Grasmücke stammen soll.

Bei GIEBEL 1857 findet sich eine Reihe von neuen Cestodenarten mit dem Autornamen NITZSCH, die aber nie von demselben beschrieben wurden und die also wohl Museumsnamen sind. Da, wie mir Herr Prof. GRENACHER (Halle) mitteilt, die ganze helminthologische Sammlung von NITZSCH vertrocknet ist, können diese Arten nicht mehr identifiziert werden. Diese Namen ohne Beschreibung

Taenia emberizarum C. M. V. (aus *Emberiza*-Arten) und *Taenia coccothraustis* C. M. V. (aus *Coccothraustes*) sind nicht zu erkennen, da das Originalmaterial der erstern sehr schlecht erhalten, der letztern verloren gegangen ist. *Taenia loxia curvirostrae* BLUMENBACH, von ZEDER *Halysis loxiae* ZEDER 1803 genannt, ist zu streichen. *Taenia planiceps* v. SIEBOLD 1848 (aus *Chelidonaria urbica* und *Hirundo rustica*) ist nicht zu erkennen. Die Typen fehlen.

Taenia pyramidalis DIESING (aus *Xiphorhynchus procurrus* TEMM. und *Dendrocincla turdina*) 1850 ist nach DIESING identisch mit *Taenia dendrocolaptis* RUD. Die Typen ersterer existieren nicht mehr, und die Arten sind unkenntlich beschrieben.

5) Soll synonym sein mit *T. alaudae* RUD. 1809. Die Taenie hat nach dem Originalmaterial unregelmäßig abwechselnd alternierende Genitalöffnungen und scheint mir in das Genus *Anomotaenia* zu gehören. Scolex fehlt leider.

1) Synonymie: *Hymenolepis pyramidalis* SINITZINE 1896; ganz unkenntlich beschrieben.

und nur mit Wirtsangabe versehen, sind folgende: *T. macrocephala* NITZSCH (*Oriolus*), *T. mastigodes* NITZSCH (*Anas*), *T. gutturosa* NITZSCH (*Corvus*), *T. spiculigera* NITZSCH* (*Tringa* und *Fulica*!), *T. exarticulata* NITZSCH (*Tringa*), *T. triangularis* NITZSCH (*Tringa*), *T. muricata* NITZSCH (*Tringa*), *T. filirostris* NITZSCH* (*Scolopax*), *T. chaotica* NITZSCH* (*Scolopax*), *T. eurycephala* NITZSCH (*Picus*), *T. oligotoma* NITZSCH (von RUDOLPHI beschrieben, also RUD. der eigentliche Autornamen) (aus *Scolopax*), *T. megalops* NITZSCH (*Anas*), *T. frustulum* NITZSCH* (*Cypselus*). Von diesen Arten hat GIEBEL 1866 die mit einem Sternchen versehenen kurz beschrieben, dieselben sollten also eigentlich den Autornamen GIEBEL tragen. Außerdem finden wir in GIEBEL 1866 noch beschrieben *T. striata* GIEBEL 1866 und *T. nitzschi* GIEBEL 1866. Von allen diesen Arten kann nur die überaus typische und von CREPLIN beschriebene *Hymenolepis megalops* bestehen bleiben, alle anderen sind meist fragliche Synonyme bereits bekannter Arten, teils unkenntlich oder gar nicht beschrieben. Ich hätte alle diese Namen nicht erwähnt, wenn man dieselben nicht hier und da in der Literatur, in Faunenlisten, aufgezeichnet fände. Alle diese Art-namen (mit Ausnahme von *T. megalops*) haben endgültig zu verschwinden, sie sind ein unnützer und schädlicher Ballast.

DIESING (1854) gibt noch folgende ebenfalls zu streichende nomina nuda an: *T. abbreviata* MEHLIS (CREPLIN 1846), ferner von BELLINGHAM 1844 *T. tetraonis scotici* BELLINGHAM, *T. galli domestici* BELLINGHAM, *T. haematopodis ostralegi* BELLINGHAM, *T. sternaе dougalli* BELLINGHAM, *T. alcae tordae* BELLINGHAM.

III. Faunistischer Teil.

Seit dem Erscheinen von v. LINSTOW'S Compendium der Helminthologie hat diese Wissenschaft bedeutende Fortschritte gemacht, namentlich auf dem Gebiete der Kenntnis der Vogelcestoden, wie sich aus einem Vergleich des betreffenden Kapitels in v. LINSTOW'S Arbeit mit den nachfolgenden Zeilen ohne weiteres ergibt.

Ein eingehender Vergleich ist aber nicht ohne weiteres möglich, weil ich mich veranlaßt sah, nicht nur die systematische Anordnung der Vögel zu ändern, sondern auch die Vogelnamen nach dem klassischen Katalog der Vögel des Britischen Museums anzugeben. Es zeigt sich in der Helminthologie eine große Vernachlässigung in der Benennung der Wirtstiere, und es werden auch in den neuern Arbeiten oft ganz ungebräuchliche Namen angewandt. So kam es,

daß in unserer faunistischen Zusammenstellung die Mehrzahl der Vogelartnamen umgeändert werden mußte. Bei einigen Vögeln konnte ich den in der Literatur oder in Sammlungen angegebenen Artnamen in obengenanntem Katalog nicht finden, sie sind deshalb mit einem Fragezeichen versehen worden.

Die sicher unrichtigen faunistischen Angaben die Cestoden betreffend sowie zahlreiche bei v. LINSTOW angeführte nicht mehr geltende Artnamen sind berichtigt oder weggelassen worden. Im allgemeinen sowie in den Fußnoten des systematischen Teiles dieser Arbeit findet man die Gründe für diese Änderungen und Streichungen angeben.

Ich habe es für zoogeographische Betrachtungen, die auch in der Helminthologie ein großes Interesse beanspruchen dürfen, vorteilhaft gefunden, unter jedem Wirtstier seine geographische Verbreitung anzugeben.

Ebenso habe ich bei jeder Vogelgruppe alle in ihr parasitierenden Taenien-Arten zusammengestellt, was erlaubt, sofort über die für jede Vogelordnung typische Cestoden-Fauna einen Überblick zu gewinnen. Hierdurch wird die Bestimmung und das Erkennen neuer Arten bedeutend erleichtert.

Struthioniformes.

Davainea struthionis (HOUTTOYN).

Struthio camelus LINN.

Geographische Verbreitung: Süd-Palästina, Sudan, Arabien.

Davainea struthionis (HOUTTOYN).

Struthio molybdophanus RCHNW.

Geographische Verbreitung: Somaliland.

Davainea struthionis (HOUTTOYN).

Rheiformes.

Cittotaenia rheae FUHRMANN

Davainea struthionis (HOUTTOYN)

Chapmania tauricollis (CHAPMAN).

Rhea americana CHAPMAN.

Geographische Verbreitung: Zentral-Brasilien bis Argentinien.

Cittotaenia rheae FUHRMANN

? *Davainea struthionis* (HOUTTOYN) (s. S. 6 u. 19)
Idiogenes tauricollis (CHAPMAN).

Casuariiformes.

Davainea australis (KRABBE)
Cotugnia collini FUHRMANN.

Dromaeus novae-hollandiae LATH.

Geographische Verbreitung: Ost-Australien.

Davainea australis (KRABBE)
Cotugnia collini FUHRMANN.

Apterygiformes.

Anomotaenia minuta (BENHAM)
Choanotaenia apterygis (BENHAM)
Taenia apterygis CHATIN.

Apteryx australis SHAW.

Geographische Verbreitung: Südinsel von Neuseeland.

Taenia apterygis CHATIN.

Apteryx mantelli BARTL.

Geographische Verbreitung: Nordinsel von Neuseeland.

Anomotaenia minuta (BENHAM)
Choanotaenia apterygis (BENHAM).

Crypturiformes.

Davainea oligacantha FUHRMANN
Davainea elongata FUHRMANN
Davainea capillaris FUHRMANN
Davainea crypturi FUHRMANN
Hymenolepis pauciorata FUHRMANN.

Tinamus sp.

Geographische Verbreitung: Brasilien.

Davainea oligacantha FUHRMANN
Davainea elongata FUHRMANN.

Crypturus aeneus?

Geographische Verbreitung: Brasilien.

Davainea capillaris FUHRMANN.

Crypturus erythropus (PELZ.).

Geographische Verbreitung: Zentral-Brasilien.

Hymenolepis pauciorata FUHRMANN.*Crypturus noctivagus* (NEUWIED).

Geographische Verbreitung: Ost-Brasilien.

Davainea crypturi FUHRMANN.*Nothura media* (SPIX).

Geographische Verbreitung: Süd-Brasilien.

Davainea elongata FUHRMANN.*Rhyncholus rufescens* (TEMM.)

Geographische Verbreitung: Paraguay, Uruguay, Argentinien, Süd-Brasilien.

Davainea elongata FUHRMANN*Davainea oligacantha* FUHRMANN.

Galliformes.

Zschokkea linstowi (PARONA)*Davainea wrogalli* (MODEER)*Davainea cesticillus* (MOLIN)*Davainea tetragoma* (MOLIN)*Davainea?* *longicollis* (MOLIN)*Davainea cantaniana* (POLONIO)*Davainea proglottina* (DAVAINE)*Davainea proglottina* var. *dublanensis* KOWALEWSKI*Davainea circumvallata* (KRABBE)*Davainea echinobothrida* MÉGNIN*Davainea friedbergi* v. LINSTOW*Davainea paracchinobothrida* MAGALHAES*Davainea globocaudata* COHN*Davainea mutabilis* RÜTHER*Davainea retusa* CLERC*Davainea globirostris* FUHRMANN*Davainea volzi* FUHRMANN*Davainea leptacantha* FUHRMANN*Davainea pintneri* KLAPTOCZ*Davainea penelopina* FUHRMANN*Davainea polyuterina* FUHRMANN*Davainea campanulata* FUHRMANN*Polycoelia lata* FUHRMANN*Colurgia digonopora* (PASQUALE)

Cotugnia crassa FUHRMANN
Choanotaenia campanulata FUHRMANN
Anoebotaenia cuneata (v. LINSTOW)
Metroliasthes lucida RANSOM
Rhabdometra tomica CHOLODKOVSKY
Rhabdometra nigropunctata (CRETY)
Monopylidium infundibulum (BLOCH)
Hymenolepis linea (GOEZE)
Hymenolepis exilis (DUJARDIN)
Hymenolepis microps (DIESING)
? *Hymenolepis villosa* (BLOCH)
Hymenolepis carioeca (MAGALHAES)
Hymenolepis meleagris CLERC
Hymenolepis musculosa CLERC
Hymenolepis phasianina FUHRMANN
? *Fimbriaria fasciolaris* (PALLAS)
Taenia echinata OLSSON
Taenia odiosa LEIDY
Tetrathyridium perdicis-saxatilis RUD.

***Crax alector* LINN.**

Geographische Verbreitung: Südliches Südamerika.

Davainea leptacantha FUHRMANN.

***Crax fasciolata* SPIX.**

Geographische Verbreitung: Südliches Südamerika.

Davainea leptacantha FUHRMANN.

Crax sp.

Geographische Verbreitung: Brasilien.

Davainea leptacantha FUHRMANN.

***Penelope obscura* ILLIGER.**

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Davainea penelopina FUHRMANN.

***Lagopus scoticus* (LATH.).**

Geographische Verbreitung: Großbritannien, Irland, Hebriden, Orknei.

Davainea urogalli MODEER

Hymenolepis microps DIESING.

Lagopus mutus (MONTIN.).

Geographische Verbreitung: Gebirge Europas.

Taenia echinata OLSSON.

Tetrao urogallus LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Nord- und Zentral-Asien.

Davainea urogalli (MODEER)

Davainea globocaudatus COHN

Hymenolepis microps (DIESING).

Lyrurus tetrix (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Nord- und Zentral-Asien.

Davainea urogalli (MODEER)

Davainea retusa CLERC

Rhabdometra tomica CHOLODKOVSKY.

Tetraogallus himalagensis GRAY.

Geographische Verbreitung: Himalaya.

Davainea urogalli (MODEER)¹⁾ (?)

? *Hymenolepis villosa* (BLOCH).²⁾

Caccabis saxatilis (WOLF et MEYER).

Geographische Verbreitung: Berge von Zentral und Süd-Europa.

Davainea urogalli (MODEER)¹⁾ (?)

Hymenolepis linea (GOEZE)

Tetrathyridium perdicis-saxatilis RUD.

1) Wenn die Zeichnung KRABBE's (1882) fig. 62 richtig ist, ist die betreffende *Davainea* nicht *Dav. urogalli*, da bei letzterer Taenie die Eier einzeln im Parenchym liegen und nicht zu mehreren in Parenchymkapseln beisammen sind.

2) Nach den Angaben von KRABBE zu schließen ebenfalls eine andere Art, da die Haken statt 0,024—0,026 mm nur 0,011 mm lang sind.

Caccabis petrosa (GM.).

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Nord-Afrika, Canarische Inseln.

Davainea circumvallata (KRABBE)

Hymenolepis linea (GOEZE).

Centrocercus urophasianus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika (Canada) bis Paraguay, Peru, Galapagos.

Hymenolepis microps (DIES.)¹⁾ (?).

Perdix perdix (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, West- und Zentral-Asien.

Davainea circumvallata (KRABBE)

Davainea globirostris FUHRMANN

Monopylidium infundibulum (BLOCH)

Hymenolepis linea (GOEZE)

Davainea polyuterina FUHRMANN.

Perdix sp.

Fundort: Brasilien.

Davainea campanulata FUHRMANN.

Coturnix coturnix (LINN.).

Geographische Verbreitung: Asien, Europa und im Winter Indien und Afrika.

Davainea circumvallata (KRABBE)

Davainea polyuterina FUHRMANN

Monopylidium infundibulum (BLOCH)

Rhabdometra nigropunctata (CRETY)

Hymenolepis linea (GOEZE).

1) Diese Angabe LEIDY's 1887 ist nicht richtig; die von ihm gefundene Taenie ist wohl eine *Davainea*-Art.

Phasianus colchicus LINN.

Geographische Verbreitung: Südost-Europa.

- Davainea cantaniana* (POLONIO)
Davainea friedbergi v. LINSTOW
Monopylidium infundibulum (BLOCH)
Hymenolepis phasianina FUHRMANN.

Gallus gallus (LINN.) dom.

- Davainea tetragona* (MOLIN)
Davainea cesticillus (MOLIN)
Davainea? longicollis (MOLIN)
Davainea cantaniana (POLONIO)
Davainea echinobothrida (MÉGNIN)
Davainea proglottina (DAVAINE)
Davainea proglottina var. *dublanensis* KOWALEVSKI
Davainea mutabilis RÜTHER
Davainea parechinobothrida MAGALHAES
Davainea volzii FUHRMANN
Cotugnia digonopora (PASQUALE)
Amoebotaenia cuneata (v. LINSTOW)
Monopylidium infundibulum (BLOCH)
Hymenolepis carioeca (MAGALHAES)
? *Hymenolepis villosa* (BLOCH)
Hymenolepis exilis (DUJARDIN)
? *Fimbriaria fasciolaris* (PALLAS).

Numida ptilorhyncha LICHT.

Geographische Verbreitung: Äquatorial- und Nordost-Afrika.

- Zschokkia linstowi* (PARONA)
Davainea pintneri KLAPTOCZ
Polycoelia lata FUHRMANN.

Numida rikwae RCHW.

Geographische Verbreitung: Rikwa-See.

- Cotugnia crassa* FUHRMANN.

Meleagris gallopavo LINN.

Geographische Verbreitung: Nord-Mexiko, Arizona, Neu-mexiko und West-Texas.

- Davainea cantaniana* (POLONIO)
Metroliasthes lucida RANSOM

Hymenolepis meleagris CLERC

Hymenolepis musculosa CLERC.

***Ortyx virginianus* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Östliches Nordamerika.

Taenia odiosa LEIDY.

***Opisthocomus hoazin* ILLIGER.**

Geographische Verbreitung: Surinam, Bolivia, Amazonia, Guiana.

Choanotaenia campanulata FUHRMANN.

Ralliformes.

Anomotaenia pyriformis (WEDL)

Monopylidium marchali (MOLA)

Hymenolepis poculifera (v. LINSTOW)

? *Hymenolepis anatina* (KRABBE) ¹⁾

Diorchis inflata (RUD.)

? *Diorchis acuminata* CLERC ¹⁾

Acoelus longispiculus (STOSSICH)

Taenia gallinula VAN BENEDEEN.

***Crex crex* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien; im Winter Arabien, West-Afrika.

Anomotaenia pyriformis (WEDL). -

***Gallinula chloropus* (LINN.)**

Geographische Verbreitung: Europa, Afrika, Asien.

Monopylidium marchali (MOLA)

Taenia gallinula VAN BENEDEEN.

***Fulica atra* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa, Asien, Java, Sumatra Celebes.

? *Diorchis acuminata* CLERC ¹⁾

Diorchis inflata (RUD.) ²⁾

Hymenolepis poculifera (v. LINSTOW)

? *Hymenolepis anatina* (KRABBE). ¹⁾

1) *Hymenolepis anatina* und *Diorchis acuminata* sind von demselben Autor auch in Anseriformes gefunden worden. Siehe Näheres hierüber S. 7.

2) WEDL 1856 zitiert ebenfalls *D. inflata* aus *Fulica*, doch ist seine Art nicht identisch mit der wirklichen *T. inflata*, sondern vielleicht mit *H. poculifera* (v. LINSTOW).

Zaporina parva SCOP.

Geographische Verbreitung: Zentral- u. Süd-Europa;
im Winter in Nordwest-Indien und Nordost-Afrika.

Acoelus longispiculus (STOSSICH).

Gruiformes.

Davainea brachyrhyncha (CREPLIN)

Idiogenes horridus FUHRMANN

Dilepis macrocephala FUHRMANN.

Cariama cristata L.

Geographische Verbreitung: Brasilien, Paraguay.

Davainea brachyrhyncha (CREPLIN)

Idiogenes horridus FUHRMANN.

Psophia crepitans LINN.

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia.

Dilepis macrocephala FUHRMANN.

Otidiformes.

Idiogenes otidis (KRABBE)

Chapmania tapika CLERC

Hymenolepis villosa (BLOCH)

Hymenolepis tetracis CHOLODKOVSKY

Hymenolepis ambiguus CLERC.

Otis tarda LINN.

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Zentral-Europa,
Nord-Afrika, Zentral-Asien und Nordwest-Indien.

Idiogenes otidis KRABBE

Hymenolepis villosa (BLOCH).

Tetrax tetrax (LINN.).

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Nord-Afrika,
Zentral-Asien, Nordwest-Indien.

Idiogenes otidis KRABBE

Chapmania tapika CLERC

Hymenolepis villosa (BLOCH)

Hymenolepis tetracis CHOLODKOVSKY

Hymenolepis ambiguus CLERC.

Houbara undulata (JACQ.).

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer.

Idiogenes otidis (KRABBE).

Charadriiformes.

Charadrii.

? *Tetrabothrius macrocephalus* RUD.

Ophryocotyle proteus FRIIS

Ophryocotyle insignis LÖNNBERG

Davainea minuta COHN

Dilepis retrostris (KRABBE)

Dilepis nymphoides CLERC

Dilepis limosa FUHRMANN

Dilepis unilateralis FUHRMANN

Dilepis recapta CLERC

Trichocephaloides megalcephala (KRABBE)

Trichocephaloides birostrata CLERC

Anomotaenia stentorea (FRÖHLICH)

Anomotaenia nymphaea (SCHRANK)

Anomotaenia arionis (v. SIEBOLD)

Anomotaenia globulus (WEDL)

Anomotaenia bacilligera (KRABBE)

Anomotaenia citrus (KRABBE)

Anomotaenia clavigera (KRABBE)

Anomotaenia microrhyncha (KRABBE)

Anomotaenia platyrhyncha (KRABBE)

Anomotaenia microphallos (KRABBE)

Anomotaenia ericetorum (KRABBE)

Anomotaenia? *micracantha* (KRABBE)

Anomotaenia volvulus (v. LINSTOW)

Anomotaenia cingulata (v. LINSTOW)

Anomotaenia macracantha FUHRMANN

Anomotaenia macracanthoides FUHRMANN

Choanotaenia laevigata (RUD.)

Choanotaenia paradoxa (RUD.)

Choanotaenia coronata (CREPLIN)

Choanotaenia stellifera (KRABBE)

Choanotaenia embryo (KRABBE)

Choanotaenia aegyptica (KRABBE)

Choanotaenia slesvicensis (KRABBE)

Choanotaenia intermedia FUHRMANN

- Choanotaenia arquata* CLERC
Amoebotaenia vanelli FUHRMANN
Amoebotaenia brevis (V. LINSTOW)
Amoebotaenia brevicollis FUHRMANN
Fuhrmannia alternans (COHN)
Monopylidium cinguliferum (KRABBE)
Monopylidium macracanthum FUHRMANN
Monopylidium cayennense FUHRMANN
Monopylidium secundum FUHRMANN
Monopylidium rostellatum FUHRMANN
Hymenolepis sphaerophora (RUD.)
Hymenolepis longirostris (RUD.)
Hymenolepis amphitricha (RUD.)
Hymenolepis interrupta (RUD.)
Hymenolepis brachycephala (CREPLIN)
Hymenolepis uliginosa (KRABBE)
Hymenolepis recurvirostra (KRABBE)
Hymenolepis himantopodis (KRABBE)
Hymenolepis clandestina (KRABBE)
Hymenolepis minuta (KRABBE)
Hymenolepis vallei STOSSICH
Hymenolepis spinosa V. LINSTOW
Hymenolepis rectacantha FUHRMANN
Hymenolepis styloides FUHRMANN
Hymenolepis (Echinocotyle) nitida (KRABBE)
Hymenolepis (Echinocotyle) nitidulans (KRABBE)
Hymenolepis (Echinocotyle) uralensis CLERC
Hymenolepis (Echinocotyle) tenuis CLERC
Aploparaksis filum (GOEZE)
Aploparaksis filum var. *pseudofilum* CLERC
Aploparaksis crassirostris (KRABBE)
Aploparaksis hirsuta (KRABBE)
Aploparaksis brachyphallos (KRABBE)
Aploparaksis penetrans CLERC
Aploparaksis diminuens V. LINSTOW
Acoleus vaginatus (RUD.)
Acoleus crassus FUHRMANN
Gyrocoelia perverse FUHRMANN
Gyrocoelia leuce FUHRMANN
Gyrocoelia brevis FUHRMANN
Gyrocoelia paradoxus (V. LINSTOW)
Diplophallus polymorpha KRABBE
Shipleya inermis FUHRMANN
Copesoma papillosum SINITZINE
Taenia coronata KREFFT
Taenia rugosa KREFFT
Taenia friisiana KRABBE
Taenia nilotica KRABBE

- Taenia cryptacantha* KRABBE
Taenia megalorhyncha KRABBE
Taenia tetrabothrioides LÖNNBERG
Taenia increescens v. LINSTOW.

Charadriiformes.

Arenaria interpres (LINN.).

Geographische Verbreitung: Ganze Welt.

- Anomotaenia clavigera* (KRABBE)
Dilepis retrostris (KRABBE)
Hymenolepis filum (GOEZE).

Lobipulvia malabarica (BODD.).

Geographische Verbreitung: Indien, Ceylon.

- Anomotaenia volvulus* (v. LINSTOW).

Haematopus ostralegus LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien; im Winter Ägypten, Rotes Meer, Nordwest-Indien.

- Choanotaenia paradoxa* (RUD.)
Hymenolepis claudestina (KRABBE) (CREPLIN)
Hymenolepis crassirostris (KRABBE)
Ophryocotyle insignis LÖNNBERG.

Haematopus unicolor (WAGL.)?

Geographische Verbreitung: Australien, Neuseeland.

- Taenia increescens* v. LINSTOW.

Hoplopterus spinosus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Südost-Europa, Nordost-Afrika.

- Gyrocoelia brevis* FUHRMANN
Choanotaenia laevigata (RUD.).

Vanellus vanellus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Sibirien, China, Japan, Nordwest-Indien.

Anomotaenia stentorea (FRÖLICH)

Anomotaenia microphallos (KRABBE).

Vanellus drongolanus?

Fundort: Ägypten.

Anomotaenia vanelli FUHRMANN.

Vanellus aegypticus?

Fundort: Ägypten.

Hymcnolepis styloides FUHRMANN.

Vanellus sp.

Fundort: Südamerika.

Gyrocoelia leuce FUHRMANN.

Vanellus sp.

Fundort: Ägypten.

Gyrocoelia perrerse FUHRMANN.

Vanellus sp.

Fundort: Ägypten.

Anomotaenia macracanthoides FUHRMANN.

Belonopterus cayennensis (GM.).

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Anomotaenia macracantha FUHRMANN

Monopylidium secundum FUHRMANN

Monopylidium cayennense FUHRMANN

Acoleus vaginatus (RUD.).

Gyrocoelia leuce FUHRMANN.

Hoploxypterus cayanus (LATH.).

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Dilepis unilateralis FUHRMANN

Choanotaenia laevigata (RUD.)

Aploporaksis filum (GOEZE)

Gyrocoelia leuce FUHRMANN.

Charadrius pluvialis L.

Geographische Verbreitung: Europa, West-Sibirien; im Winter Nord-Afrika.

Anomotaenia erictorum (KRABBE)

Anomotaenia microrhyncha (KRABBE)

Choanotaenia paradoxa (RUD.)

Choanotaenia laevigata (RUD.)

Amoebotaenia brevis v. LINSTOW.

Charadrius nubicus ?

Fundort: Ägypten.

Gyrocoelia brevis FUHRMANN

Amoebotaenia brevicollis FUHRMANN.

Charadrius suezensis ?

Fundort: Ägypten.

Gyrocoelia brevis FUHRMANN

Hymenolepis crassirostris (KRABBE).

Charadrius aegypticus ?

Fundort: Ägypten.

Amoebotaenia brevis (v. LINSTOW).

Charadrius spinosus ?

Fundort: Ägypten.

Amoebotaenia brevicollis FUHRMANN.

Charadrius sp.

Fundort: ?

Choanotaenia coronata (CREPL.).

Squatarola helvetica (L.).

Geographische Verbreitung: Ganze Welt.

Anomotaenia stentorea (FRÖLICH)

Hymenolepis crassirostris (KRABBE)

Amoebotaenia brevis (v. LINSTOW).

***Eudromias morinellus* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Sibirien; im Winter Mittelmeerländer, Nordost-Afrika.

Anomotaenia microphallos (KRABBE).

***Aegialites hiaticola* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Von Grönland bis Kapkolonie.

Ophryocotyle proteus FRIES

Anomotaenia microrhyncha (KRABBE)

Choanotaenia laevigata (RUD.)

Hymenolepis crassirostris (KRABBE)

Hymenolepis (Echinocotyle) nitidulans (KRABBE)

Hymenolepis rectacantha FUHRMANN

Aploporaksis brachyphallos (KRABBE)

Amoebotaenia brevis (V. LINSTOW).

***Aegialites nirosa* CASS.**

Geographische Verbreitung: Westl. Nordamerika, Zentralamerika, westl. Südamerika bis Peru.

Choanotaenia laevigata (RUD.).

Choanotaenia coronata (CREPL.)

***Aegialites fluvialis* BECHST.**

Geographische Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan; im Winter Nordost-Afrika, Indien, Molukken.

Choanotaenia laevigata (RUD.).

***Aegialites dubia* SCOP.**

Geographische Verbreitung: Europa und Asien, Nord-Afrika, Indien.

Anomotaenia microrhyncha (KRABBE)

Monopylidium cingulifera (KRABBE).

***Aegialites alexandrina* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien; im Winter in China, Japan, Afrika, Indien, Australien.

Hymenolepis crassirostris (KRABBE).

Aegialites collaris VIEILL.

Geographische Verbreitung: Zentral- und Südamerika, Kleine Antillen.

Gyrocoelia leuce FUHRMANN.

Ochthodromus mongolica PALL.

Geographische Verbreitung: Sibirien, Alaska; im Winter Philippinen, Molukken, Australien.

Gyrocoelia paradoxa (v. LINSTOW).

Himantopus himantopus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Afrika, Zentral-Asien, Ceylon, West-China.

Hymenolepis himantopodis KRABBE

Diplophallus polymorphus (KRABBE)

Acoelus vaginatus (RUD.).

Himantopus wilsonii TEMM.?

Fundort; Brasilien.

Hymenolepis himantopodis (KRABBE)

Acoelus vaginatus (RUD.).

Himantopus mexicanus P. et L. MÜLLER.

Geographische Verbreitung: Südl. Nordamerika, Zentralamerika, Südamerika bis Amazonia.

Monopylidium rostellatum FUHRMANN

Hymenolepis himantopodis (KRABBE)

Diplophallus polymorphus (KRABBE)

Acoelus vaginatus (RUD.).

Himantopus leucocephalus GOULD.

Geographische Verbreitung: Australien, Neuguinea, Molukken, Sunda-Inseln.

Taenia coronata KREFFT

Taenia rugosa KREFFT.

Zool. Jahrb., Supplement X.

Recurvirostra avocetta LINN.

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Afrika, Asien, Indien, Ceylon.

Hymenolepis recurvirostra (KRABBE)

Diplophallus polymorphus (KRABBE).

Numenius arquatus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Asien; im Winter Afrika, Indien, Süd-China, Malayische Inseln.

Anomotaenia nymphaea (SCHRANK)

Choanotaenia paradoxa (RUD.)

Choanotaenia arquata CLERC

Hymenolepis sphaerophora (RUD.)

Hymenolepis uliginosa (KRABBE)

Echinocotyle sp.

Aploparaksis filum (GOEZE).

Numenius phaeopus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Grönland; im Winter Afrika, Indien.

Anomotaenia nymphaea (SCHRANK)

Hymenolepis uliginosa (KRABBE)

Dilepis limosa FUHRMANN.

Numenius tenuirostris VIEILLOT.

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer.

Hymenolepis sphaerophora (RUD.).

Numenius borealis LATH.

Geographische Verbreitung: Nordamerika; im Winter Südamerika.

Anomotaenia nymphaea (SCHRANK).

Numenius arabicus ?.

Fundort: Ägypten.

Anomotaenia nymphaea (SCHRANK).

Numenius sp.

Fundort: Brasilien.

Anomotaenia nymphaea (SCHRANK).*Numenius sp.*

Fundort: Brasilien.

Ophryocotyle insignis LÖNNBERG.*Limosa limosa* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Nord-Europa; im Winter Mittelmeerländer bis Abyssinien.

Dilepis limosa FUHRMANN*Hymenolepis (Echinocotyle) nitida* (KRABBE)*Aploparaksis filum* (GOEZE).*Limosa lapponica* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-Europa; im Winter Mittelmeerländer.

Ophryocotyle proteus FRIIS*Aploparaksis filum* (GOEZE)*Gyrocœlia perverse* FUHRMANN.*Totanus calidris* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Mittelmeerländer, Kleinasien, Afrika, Indien, Malayischer Archipel.

Trichocephalus megaloccephala (KRABBE)*Anomotaenia stentorea* (FRÖLICH)*Anomotaenia platyrhyncha* (KRABBE)*Monopylidium cinguliferum* (KRABBE)*Hymenolepis amphitricha* (KRABBE)*Aploparaksis filum* (KRABBE).*Totanus stagnatilis* BECHST.

Geographische Verbreitung: Süd-Europa bis Nordost-Asien; im Winter Afrika, Indien, Malayischer Archipel, Australien.

Aploparaksis crassirostris (KRABBE).

Totanus flavipes (GM.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika; im Winter Südamerika bis Buenos Aires.

Anomotaenia arionis (v. SIEBOLD).

Totanus melanoleucus (GM.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika; im Winter Südamerika.

Anomotaenia arionis (v. SIEBOLD).

Totanus sp.

Fundort: Ural.

Monopylidium cinguliferum (KRABBE)

Hymenolepis (*Echinocotyle*) *tenuis* CLERC.

Helodromus ochropus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Alte Welt, Nord-Asien; im Winter Afrika, Indien.

Anomotaenia globulus (WEDL.)

Anomotaenia arionis (v. SIEBOLD)

Monopylidium macracanthum FUHRMANN

Aploparaksis filum (GOEZE)

Aploparaksis hirsuta (KRABBE).

Rhyacophilus glareola (GM.).

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien; im Winter Afrika, Indien bis Australien.

? *Tetrabothrius macrocephalus* RUD.

Anomotaenia stentorea (FRÖLICH)

Monopylidium cinguliferum (KRABBE).

Tringoides hypoleucus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Alte Welt; im Winter Afrika, Indien, Australien.

Anomotaenia stentorea (FRÖLICH)

Anomotaenia arionis (v. SIEBOLD).

Choanotaenia paradoxa (RUD.)

Choanotaenia stellifera (KRABBE)

Monopylidium cinguliferum (KRABBE)
Hymenolepis (Echinocotyle) uralensis CLERC
Aploparaksis filum (GOEZE)
Aploparaksis crassirostris (KRABBE).

***Paroncella pugnax* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Zentral-Europa, Asien; im Winter Afrika, Indien.

Anomotaenia globulus (WEDL.)
Anomotaenia microrhyncha (KRABBE)
Monopylidium cinguliferum (KRABBE)
Hymenolepis brachycephala (CREPL.)
Aploparaksis filum (GOEZE)
Aploparaksis crassirostris (KRABBE).

***Bartramia longicauda* (BECHST.).**

Geographische Verbreitung: Nordamerika; im Winter Südamerika.

Anomotaenia nymphaea (SCHRANK).

***Calidris arenaria* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Kosmopolit.

Ophryocotyle proteus FRIIS
Trichocephaloides megaloccephala (KRABBE)
Aploparaksis brachyphallos (KRABBE).

***Limonites temnicki* (LEISL.).**

Geographische Verbreitung: Nord-Europa und Sibirien; im Winter Nord-Afrika, Indien, Ceylon.

Hymenolepis amphitricha (RUD.)
Hymenolepis (Echinocotyle) nitida (KRABBE)
Aploparaksis crassirostris (KRABBE).

***Limonites minuta* (LEISL.).**

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Sibirien; im Winter Afrika, Indien, Ceylon.

Dilepis recapta CLERC
Trichocephaloides birostrata CLERC
Aploparaksis filum (GOEZE).

Limonites damacensis (HORSF.).

Geographische Verbreitung: Sibirien, Alaska; im Winter Japan, China, Malayische Inseln, Australien.

- Anomotaenia clavigera* (KRABBE)
Anomotaenia microphallos (KRABBE)
Anomotaenia platyrhyncha (KRABBE)
Dilepis nymphoides CLERC
Monopylidium cinguliferum (KRABBE)
Trichocephalus megalcephala (KRABBE)
Hymenolepis penetrans CLERC
Hymenolepis (Echinocotyle) nitida (KRABBE)
Hymenolepis vallei (STOSSICH)
Aploparaksis filum (GOEZE)
Aploparaksis crassirostris (KRABBE)
Aploparaksis brachyphallos (KRABBE)
 ? *Copesoma papillosum* SINITZINE.

Arquatella maritima (GM.).

Geographische Verbreitung: Arktisches Europa, Nordost-Asien, Nordost-Amerika; im Winter gemäßigtes Europa und Nordamerika.

- Trichocephaloides megalcephala* (KRABBE)
Hymenolepis amphitricha (RUD.)
Hymenolepis (Echinocotyle) nitida (KRABBE)
Aploparaksis brachyphallos (KRABBE)
Taenia megalorhyncha KRABBE.

Ancylochilus subarquatus (GULD.).

Geographische Verbreitung: Arktische Region im Winter Afrika, Indien, Australien.

- Ophryocotyle proteus* FRIIS
Anomotaenia stentorea (FRÖLICH)
Choanotaenia paradoxa (RUD.)
Trichocephaloides megalcephala (KRABBE).

Pelidna alpina (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Nord-Asien; im Winter Mittelmeerländer, Indischer Ozean.

- Ophryocotyle proteus* FRIIS
Anomotaenia stentorea (FRÖLICH)

Anomotaenia clavigera (KRABBE)
Anomotaenia cingulata (v. LINSTOW)
Dilepis retrostris (KRABBE)
Trichocephaloides megaloccephala (KRABBE)
Hymenolepis amphitricha (RUD.)
Hymenolepis brachyphallos (KRABBE)
Hymenolopis (Echinocotyle) nitida (KRABBE)
Hymenolopis (Echinocotyle) nitidulans (KRABBE)
Aploparaksis filum (GOEZE)
Aploparaksis crassirostris (KRABBE)
Taenia tetrabothrioides LÖNNBERG.

***Tringa totanus*?**¹⁾

Fundort: Nord-Deutschland.

Davainca minuta COHN
Fuhrmannia alternans (COHN).

***Tringa canutus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Arktische Region; im Winter Afrika, Indien, Südamerika, Australien.

Anomotaenia clavigera (KRABBE)
Aploparaksis brachyphallos (KRABBE).

***Tringa macrura* (?)**

Fundort: Brasilien.

Dilepis retrostris (KRABBE).

***Tringa* sp.**

Fundort: Ägypten.

Hymenolepis brachycephala (CREPLIN).

***Tringa* sp.**

Fundort: Brasilien.

Monopygidium cinguliferum (KRABBE).

1) Diesen von COHN gegebenen Wirtsnamen konnte ich nicht finden.

Tringa sp.

Fundort: Brasilien.

Acoelus crassus FUHRMANN.*Gallinago gallinago* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien; im Winter Nordost-Afrika, Indien, Malayische Inseln.

Anomotaenia stentorea (FRÖLICH)*Anomotaenia citrus* (KRABBE)*Anomotaenia bacilligera* (KRABBE)*Anomotaenia aegyptica* (KRABBE)*Anomotaenia slesvicensis* (KRABBE)*Choanotaenia paradoxa* (RUD.)*Choanotaenia embryo* (KRABBE)*Hymenolepis sphaerophora* (RUD.)*Hymenolepis (Echinocotyle) nitida* (KRABBE)*Aploparaksis filum* (GOEZE)*Aploparaksis crassirostris* (KRABBE)*Aploparaksis penetrans* (CLERC).*Gallinago major* (GM.).

Geographische Verbreitung: Nord-Europa; im Winter Mittelmeerländer, Afrika.

Aploparaksis filum (GOEZE).*Gallinago undulata* (BODD.).

Geographische Verbreitung: Guyana.

Anomotaenia bacilligera (KRABBE)*Choanotaenia embryo* (KRABBE)*Choanotaenia intermedia* FUHRMANN.*Gallinago gigantea* TEMM.

Geographische Verbreitung: Brasilien, Paraguay.

Anomotaenia bacilligera (KRABBE)*Choanotaenia intermedia* FUHRMANN*Shipleya inermis* FUHRMANN.

Limnocryptus gallinula (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Sibirien; im Winter Indien, China, Formosa.

Anomotaenia globulus (WEDL)
Anomotaenia citrus (KRABBE)
Anomotaenia bacilligera (KRABBE)
Choanotaenia paradoxa (RUD.)
Choanotaenia embryo (KRABBE)
Hymenolepis interrupta (RUD.)
Hymenolepis uliginosa (KRABBE)
Aploparaksis filum (GOEZE)
Aploparaksis crassirostris (KRABBE)
Aploparaksis hirsuta (KRABBE)
Taenia frisiana KRABBE.

Rostratula capensis (LINN.).

Geographische Verbreitung: Afrika, Indien, Ceylon, China, Japan, Sumatra.

Hymenolepis spinosa v. LINSTOW.

Philohela minor (GM.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika.

Anomotaenia stentorea (FRÖLICH).

Crymophilus fulicarius (LINN.).

Geographische Verbreitung: Arktische Zone; im Winter Süden, den 50.^o n. Br. nicht überschreitend.

Aploparaksis diminuens v. LINST.

Scolopax rusticola LINN..

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien; im Winter Süd-Europa, Indien, China.

Anomotaenia slesvicensis (KRABBE)
Anomotaenia bacilligera (KRABBE)
Anomotaenia aegyptica (KRABBE)
Choanotaenia paradoxa (RUD.)
Choanotaenia embryo (KRABBE)
Choanotaenia stellifera (KRABBE)
Hymenolepis interrupta (RUD.)

- Hymenolepis sphaerophora* (RUD.)
Hymenolepis amphitricha (KRABBE)
Aploparaksis filum (GOEZE)
Aploparaksis crassirostris (KRABBE)
Aploparaksis hirsuta (KRABBE).

Scolopax paludo?

Fundort: Brasilien.

- Anomotaenia bacilligera* (KRABBE)
Choanotaenia embryo (KRABBE)
Choanotaenia intermedia FUHRMANN.

***Phalaropus hyperboreus* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Arktische Region beider Hemisphären.

- Choanotaenia paradoxa* (RUD.)
Hymenolepis minuta (KRABBE)
Aploparaksis filum (GOEZE)
Aploparaksis crassirostris (KRABBE).

***Cursorius gallicus* (GM.).**

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer, Arabien, Persien, Nordwest-Indien.

- Anomotaenia aegyptica* (KRABBE)
Taenia nilotica KRABBE.

***Glareola pratincola* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Süd-Europa bis Zentral-Asien; im Winter Afrika, Indien.

- Anomotaenia nymphaea* (SCHRANK)
Hymenolepis longirostris (RUD.)
Taenia cryptacantha KRABBE.

***Oedinenus oedinenus* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Zentral-Asien; im Winter Nordost-Afrika, Indien.

- Choanotaenia coronata* (CREPLIN).

Lariformes.

- Tetrabothrius cylindraceus* RUD.
Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG)
Ophryocotyle proteus FRIIS
Anomotaenia tordae (FABRICIUS)
Anomotaenia campylacantha (KRABBE)
Anomotaenia socialis (KRABBE)
Anomotaenia larina (KRABBE)
Anomotaenia micracantha (KRABBE)
Choanotaenia porosa (RUD.)
Choanotaenia inversa (RUD.)
Choanotaenia sternina (KRABBE)
Choanotaenia dodecantha (KRABBE)
Choanotaenia gonygla COHN
Choanotaenia rhynchopis FUHRMANN
Dilepis? cylindrica (CLERC)
Taenia diaphana FUHRMANN
Hymenolepis fusus (KRABBE)
Hymenolepis baschkiriensis CLERC
Hymenolepis octacanthoides FUHRMANN (COHN)
? *Hymenolepis microsoma* (CREPLIN)
Aploparaksis cirrosa (KRABBE)
Taenia distincta LÖNNBERG.

Laridae.*Hydrochelidon nigra* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien; im Winter Afrika.

Choanotaenia inversa RUD.

Sterna bergii LICHT.

Geographische Verbreitung: Auf beiden Seiten von Süd-Afrika, Rotes und Arabisches Meer, Indischer Ozean, Chinameer bis Japan, Australien, Polynesien bis Hawayischer Archipel.

Tetrabothrius erostris LÖNNBERG.

Sterna maxima BODD.

Geographische Verbreitung: Nordamerika bis Brasilien, Antillen, West-Afrika.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

Sterna macrura NAUM.

Geographische Verbreitung: Circumpolar; im Winter Küsten von Brasilien und Afrika.

Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG)

Choanotaenia inversa (RUD.)

Choanotaenia sternina (KRABBE).

Sterna fluviatilis NAUM.

Geographische Verbreitung: Nordamerika, Europa, Asien; im Winter Afrika, Indien, Brasilien.

Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG)

Choanotaenia porosa (RUD.)

Choanotaenia sternina (KRABBE)

Aploparaksis cirrosa (KRABBE).

Sterna sp.

Fundort: Brasilien.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

Larus ridibundus LINN.

Geographische Verbreitung: Norwegen, Schweden, Rußland, Nord-Asien; im Winter Nord-Afrika, Indien, China, Philippinen.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

Anomotaenia micracantha (KRABBE)

Choanotaenia porosa (RUD.)

Choanotaenia gongyla COHN

Hymenolepis fusus (KRABBE)

Hymenolepis octacanthoides FUHRMANN (COHN)

Aploparaksis cirrosa (KRABBE).

Larus argentatus GM.

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Nordost-Amerika; im Winter Mittelmeerländer.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG)

Choanotaenia porosa (RUD.).

Larus canus LINN.

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Nord-Asien; Mittelmeerländer, Japan, China.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.
Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG)
Ophryocotyle proteus FRIIS
Anomotaenia micracantha (KRABBE)
Choanotaenia porosa (RUD.)
Choanotaenia sternina (KRABBE)
Dilepis? cylindrica (CLERC)
Hymenolepis baschkiriensis CLERC
Aploparaksis cirrosa (KRABBE)
Taenia distincta LÖNNBERG.

Larus glaucus FABR.

Geographische Verbreitung: Circumpolar; im Winter bis Mittelmeer, Kaspisches Meer, Japan, Californien, Mexiko.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.
Anomotaenia micracantha (KRABBE)
Anomotaenia larina (KRABBE)
 ? *Hymenolepis microsoma* (CREPLIN)¹⁾
Hymenolepis fusus (KRABBE).

Larus marinus LINN.

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Grönland, große Seen Amerikas; im Winter Mittelmeerländer bis Florida.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.
Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG)
Anomotaenia micracantha (KRABBE)
Choanotaenia porosa (RUD.)
Hymenolepis fusus (KRABBE).

Larus melanocephalus NATH.

Geographische Verbreitung: Mittelmeer, Schwarzes Meer.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.
Choanotaenia porosa (RUD.).

1) Nach KRABBE.

Larus minutus PALLAS.

Geographische Verbreitung: Subarktisches Europa bis Asien; im Winter Mittelmeerlande.

Choanotaenia porosa RUD.

Choanotaenia dodecantha (KRABBE)

Aploparksis cirrosa (KRABBE).

Larus fuscus LINN.

Geographische Verbreitung: West-Europa; im Winter West-Afrika.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG)

Choanotaenia porosa (RUD.)

Anomotaenia micracantha (KRABBE).

Larus tridactylus L.

Geographische Verbreitung: Circumpolar; im Winter Mittelmeer, Kaspisches Meer, Nordamerika.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

Tetrabothrius erostris (LÖNNBERG)

Anomotaenia larina (KRABBE)

Anomotaenia micracantha (KRABBE)

Choanotaenia porosa (RUD.).

Larus californicus LAWR.

Geographische Verbreitung: Westl. Nordamerika; im Winter Mexiko.

Choanotaenia porosa (RUD.)

Hymenolepis sp.¹⁾

Larus atricilla LINN.

Geographische Verbreitung: Nordamerika, Antillen, Zentral- und Südamerika.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

1) LINTON 1892 gibt an, *T. filum* GOEZE gefunden zu haben, was wohl nicht zutrifft, es handelt sich wohl um *Hymenolepis fusus* oder eine andere neue *Hymenolepis*-Art.

Larus hemprichi (BRUCH).

Geographische Verbreitung: Rotes Meer, Ost-Afrika, Küsten des Indischen Ozeans.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

Larus cachinurus PALL.

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer, Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, Baikalsee. Im Winter: Indien, Persien, Rotes Meer. West-Afrika.

Choanotaenia porosa (RUD.).

Xema sabinii (SABINE).

Geographische Verbreitung: Arktisches Amerika und Ost-Sibirien, im Winter bis Peru.

Tetrabothrius cylindraceus RUD.

Pagophila eburnea (PHOPPS.).

Geographische Verbreitung: Circumpolar; im Winter West-Europa und östl. Nordamerika.

Anomotaenia micracantha KRABBE.

Rhynchops intercedens SAUNDERS.

Geographische Verbreitung: Küste von Südamerika und Argentinien.

Choanotaenia rhynchopis FUHRMANN

Taenia diaphana FUHRMANN.

*Alcidae.**Alca torda* LINN.

Geographische Verbreitung: Nord-Atlantisches Meer, Mittelmeer.

Anomotaenia tordae (FABRICIUS).

Cephus grylle (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-Atlantischer Ozean;
im Winter West-Europa, östl. Nordamerika.

Anomotaenia campylacantha (KRABBE)

Anomotaenia micracantha (KRABBE).

Uria troile (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-Atlantischer Ozean;
im Winter Mittelmeer.

Tetrabothrus cylindraccus (RUD.)

Anomotaenia socialis (KRABBE)

Anomotaenia tordae (FABRICIUS) RUD.

Columbiformes.

Pteroclitus.

Cotugnia inaequalis FUHRMANN

Taenia obvelata KRABBE.

Pteroclidurus alchatus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Palästina bis Zentral-Asien
und Nordwest-Indien.

Taenia obvelata KRABBE.

Pteroclis coronatus LICHT.

Geographische Verbreitung: Nordost-Afrika, Nordwest-
Indien.

Cotugnia inaequalis FUHRMANN.

Columbae.

Bertia delafondi (RAILLIET)

Cittotaenia kuvaria (SHIPLEY)

Moniezia columba FUHRMANN

Davainea crassula (RUDOLPHI)

Davainea insignis (STEUDENER)

Davainea columbae FUHRMANN

Davainea micracantha FUHRMANN

Davainea cryptacantha FUHRMANN

Davainea goura FUHRMANN
Davainea paucitesticulata FUHRMANN
Cotugnia polyacantha FUHRMANN
Dipylidium columbae FUHRMANN
Hymenolepis sphenocephala (RUD.)
Hymenolepis serrata FUHRMANN
Hymenolepis armata FUHRMANN
Hymenolepis rugosa CLERC.

***Ptilonopus* sp.**

Fundort: Sumatra.

Monixia columbae FUHRMANN.

***Globicera oceanica* (LESSON).**

Geographische Verbreitung: Carolinen und Palau-Inseln.

Davainea insignis STEUDENER.

***Carpophaga vanwycki* CASS.**

Geographische Verbreitung: Bismarck-Archipel.

Cittotaenia kuvaria (SHIPLEY).

***Columba livia* BONN.**

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer, Zentral-Asien, Turkestan, China.

Bertia delafondi (RAILLIET)
Davainea crassula (RUD.)
Hymenolepis rugosa CLERC.

***Columba livia* BONN. dom.**

Bertia delafondi (RAILLIET)
Davainea crassula (RUD.)
Hymenolepis sphenocephala (RUD.).

***Columba palumbus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa bis Persien, Azoren, Madeira.

Davainea columbae FUHRMANN.

Ectopistes migratorius (LINN.).

Geographische Verbreitung: Östliches Nordamerika.

Bertia delafondi (RAILLIET).

Columba gymnophthalma TEMM.

Geographische Verbreitung: Curaco, Aruba; Küste von Venezuela.

Bertia delafondi (RAILLIET)

Hymenolepis armata FUHRMANN.

Turtur turtur (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien.

Bertia delafondi (RAILLIET)

Davainca crassula (RUD.)

Davainca micracantha FUHRMANN

Coturnia polyacantha FUHRMANN

Hymenolepis serrata FUHRMANN.

Turtur senegalensis (LINN.).

Geographische Verbreitung: Afrika, Palästina, Canarische Inseln.

Coturnia polyacantha FUHRMANN.

Goura albertisi SALVAD.

Geographische Verbreitung: Neuguinea.

Davainca goura FUHRMANN.

Caloenas nicobarica (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nicobaren bis Malayischer Archipel, Neuguinea, Molukken, Bismarck-Archipel.

Davainca paucitesticulata FUHRMANN.

Turtur decipiens (FINSCH et HARTL.).

Geographische Verbreitung: Dongola.

Davainca cryptacantha FUHRMANN

Coturnia polyacantha FUHRMANN.

Columba sp.

Fundort: Ägypten.

Davainea cryptacantha FUHRMANN.*Columba sp.*

Fundort: Ägypten.

Davainea cryptacantha FUHRMANN.*Columba sp.*

Fundort: Ägypten.

Davainea cryptacantha FUHRMANN.*Columba sp.*

Fundort: Ägypten.

Dipylidium columbae FUHRMANN.**Podicipediformes.***Tetrabothrius macrocephalus* RUD.*Choanotaenia bilateralis* FUHRMANN*Hymenolepis rostellata* (ABILDG.)*Hymenolepis multistriata* (RUD.)*Hymenolepis capillaris* (RUD.)*Hymenolepis furcifera* (KRABBE)*Hymenolepis podicipina* SZYMANSKI*Hymenolepis capillaroides* FUHRMANN*Dioicocestus asper* (MEHLIS)*Dioicocestus acotylus* FUHRMANN*Dioicocestus* (?) *norae-hollandiae* (KREFFT)*Schistotaenia macrorhyncha* (RUD.)*Tatria acanthorhyncha* (WEDL)*Tatria biremis* KOWALEWSKY*Tatria appendiculata* FUHRMANN*Taenia paradoxa* KREFFT.*Colymbus arcticus* LINN.

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Nord-Asien;
im Winter Mittelmeerländer, Kaspisches und Schwarzes Meer.

Tetrabothrius macrocephalus RUD.*Hymenolepis rostellata* (ABILDG.)*Hymenolepis capillaris* (RUD.).

Colymbus glacialis LINN.

Geographische Verbreitung: Arktisches Nordamerika, Nordost-Asien, Nordwest-Europa; im Winter Kalifornien, Mittelmeerländer.

Tetralobus macrocephalus RUD.

Hymenolepis rostellata (ABILD.)

Hymenolepis capillaris (RUD.).

Colymbus septentrionalis LINN.

Geographische Verbreitung: Circumpolar; im Winter Mittelmeerländer, China, Kalifornien, Florida.

Tetralobus macrocephalus RUD.

Hymenolepis rostellata (ABILDG.)

Hymenolepis capillaris (RUD.).

Proctopus nigricollis (BREHM).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Zentral-Asien, China, Japan; im Winter Afrika.

Hymenolepis capillaris (RUD.)

Hymenolepis multistriata (RUD.)

Tatria biremis KOW.

Tatria acanthorhyncha (WEDL)

Schistotaenia macrorhyncha (RUD.).

Dytes auritus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Arktische Region; im Winter Mittelmeerländer, China, Japan, Vereinigte Staaten.

Tetralobus macrocephalus RUD.

Hymenolepis capillaris (RUD.)

Hymenolepis furcifera (KRABBE)

Hymenolepis podicipina SZYMANSKI

Schistotaenia macrorhyncha RUD.

Tatria biremis KOWAL.

Lophaethya cristata (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Nord-Asien, Japan, Afrika, Australien.

Tetralobus macrocephalus RUD.

Hymenolepis capillaris (RUD.)

Hymenolepis furcifera (KRABBE)

Dioicocestus aspera (MEHLIS)
Taenia novae-hollandiae KREFFT
Taenia paradoxa KREFFT.

Lophaethya griseigena (BODD.).

Geographische Verbreitung: Europa, West-Asien, Mittelmeerländer.

Hymenolepis capillaris (RUD.)
Hymenolepis multistriata (RUD.)
Hymenolepis furcifera (KRABBE)
Dioicocestus asper (MEHLIS).

Podiceps fluviatilis (TUNSTALL).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Zentral-Asien bis Japan.

Hymenolepis multistriata (RUD.)
Hymenolepis furcifera (KRABBE)
Schistotaenia macrorhyncha (RUD.)
Tatria acanthorhyncha (WEDL).

Podiceps dominicus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentralamerika, Südamerika, Große Antillen.

Choanotaenia bilaterdis FUHRMANN
Hymenolepis capillaroides FUHRMANN
Dioicocestus acotylus FUHRMANN.
Schistotaenia macrorhyncha (RUD.)
Tatria appendiculata FUHRMANN

Procellariiformes.

Tetrabothrius heteroclitus DIES.
Tetrabothrius torulosus v. LINSTOW
Tetrabothrius campanulatus FUHRMANN
Tetrabothrius monticelli FUHRMANN
Tetrabothrius intermedius FUHRMANN
Tetrabothrius diomedae FUHRMANN
Tetrabothrius umbrella FUHRMANN
Tetrabothrius sp.

***Procellaria* sp.**

Fundort: ?.

Tetrabothrius campanulatus FUHRMANN
Tetrabothrius intermedius FUHRMANN.

Priocella glacialis SMITH.

Geographische Verbreitung: Südliche Meere.

Tetrabothis heteroclitus DIES.*Fulmarus glacialis* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-atlantisches Meer.

Tetrabothis monticelli FUHRMANN.*Daption capensis* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Südliche Meere.

Tetrabothis heteroclitus DIES.*Diomedea exulans* LINN.

Geographische Verbreitung: Südliche Meere.

Tetrabothis heteroclitus DIES.*Tetrabothis umbrella* FUHRMANN*Tetrabothis diomedae* FUHRMANN.*Diomedea albatrus* PALL.

Geographische Verbreitung: Nordpazifischer Ozean.

Tetrabothis torulosus v. LINSTOW*Tetrabothis heteroclitus* DIES.*Diomedea sp.*

Fundort: ?.

Tetrabothis umbrella FUHRMANN.*Diomedea swinhoi*?

Fundort: ?.

Tetrabothis diomedae FUHRMANN.*Diomedea sp.*

Fundort: Kamtschatka.

Tetrabothis heteroclitus v. LINST.

Diomedea sp.

Fundort: Kamtschatka.

Tetrabothrius torulosus v. LINSTOW.*Thalassogeron chlororhynchus* (GM.).

Geographische Verbreitung: Südliche Meere.

Tetrabothrius diomedea FUHRMANN.*Phoebetia fuliginosa* (GM.).

Geographische Verbreitung: Südliche Meere.

Tetrabothrius umbrella FUHRMANN.*Puffinus kuhli* BOIE.

Geographische Verbreitung: Mittelmeer, Atlantischer Ozean, von Madeira bis zu den Kanarischen Inseln.

Tetrabothrius heteroclitus DIES.*Puffinus anglorum* BRISS.

Geographische Verbreitung: Atlantischer Ozean, von Island bis Brasilien.

Tetrabothrius heteroclitus DIES.

Aptenodytiformes.

Tetrabothrius eudypitides (LÖNNBERG) FUHRMANN*Tetrabothrius lutzi* PARONA*Taenia diaphoracantha* FUHRMANN*Taenia zederi* BAIRD.*Spheniscus magellanicus* (FORSTER).

Geographische Verbreitung: Küste von Süd-Brasilien bis Magellan.

Tetrabothrius lutzi PARONA.*Catarrhactes chrysocome* FORSTER.

Geographische Verbreitung: Südl. Südamerika, Australien, Kap der guten Hoffnung.

Tetrabothrius eudypitides (LÖNNBERG) FUHRMANN*Taenia diaphoracantha* FUHRMANN.

Aptenodytes sp.

Fundort:

Taenia aederi BAIRD.**Steganopodes.***Tetrabothrius pelecani* RUD.*Dilepis scolecina* (RUD.)*Hymenolepis medici* (STOSSICH).*Sula sula* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Tropische und subtropische Meere.

Tetrabothrius pelecani RUD.*Sula sp.*

Fundort: ?

Tetrabothrius pelecani RUD.*Sula bassana* LÖNN.

Geographische Verbreitung: Atlantischer Ozean.

*Tetrabothrius sp.**Phalacrocorax carbo* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Atlantische Küsten von Nordamerika, Europa, Nord-Asien, Mittelmeer, Australien.

Dilepis scolecina (RUD.).*Fregata aquila* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Tropische und subtropische Meere.

Tetrabothrius pelecani (RUD.)?*Pelecanus onocrotalus* GM.

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Afrika, Nordwest-Indien.

Hymenolepis medici (STOSSICH).

***Plecanus* sp.**

Fundort: ?.

Hymenolepis medici (STOSSICH).**Ciconiiformes.**

- Tetrabothrius porrigens* MOLIN
Darainea circumcincta (KRABBE)
Anomotaenia aurita (RUD.)
Anomotaenia discoidea (VAN BEN.)
Anomotaenia glandularis FUHRMANN
Dilepis campylancristota (WEDL)
Dilepis urceus (WEDL)
Dilepis transfuga (KRABBE)
Dilepis papillifera FUHRMANN
Dilepis bicoronata FUHRMANN
Dilepis crassirostrata FUHRMANN
Dilepis hoplites (v. LINSTOW)
Dilepis? nasuta FUHRMANN
Proorchida lobata FUHRMANN
Cyclorchida omalancristota (WEDL)
Acanthocirrus macropeus (WEDL)
Acanthocirrus cheilancristota (WEDL)
Cyclustera capito (RUD.)
Cyclustera fuhrmanni CLERC
Lateriporus spinosus FUHRMANN
? *Anochotaenia longiorata* FUHRMANN
Hymenolepis unilateralis (RUD.)
Hymenolepis microcephala (RUD.)
Hymenolepis filirostris (WEDL)
Hymenolepis brevianmulata FUHRMANN
Hymenolepis elongata FUHRMANN
Hymenolepis leptoptili (v. LINSTOW)
Dioicocestus paronai FUHRMANN
Tetracisidicotyla macroscolecina FUHRMANN
Taenia papilla WEDL
Taenia brevirostris WEDL
Taenia leuckarti KRABBE.

***Ibis melanocephala* (LATH.).**

Geographische Verbreitung: Indien, China, Süd-Japan, Java.

Hymenolepis filirostris (WEDL.).

Theristicus melanopsis (GM.).

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Dilepis? nasuta FUHRMANN.

Molypdophanes coerulescens VIEILL.

Geographische Verbreitung: Zentral-Brasilien, Paraguay, Argentinien.

Dilepis urceus (WEDL)

Hymenolepis breviannulata FUHRMANN

Hymenolepis elongata FUHRMANN.

Harpiprion cayennensis (GM.).

Geographische Verbreitung: Panama bis Süd-Brasilien.

Dilepis bicoronata FUHRMANN.

Plegadis falcinellus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Mittelmeerlande, Süd-Asien, Celebes, Afrika, östl. Nordamerika, Australien, Jamaika.

Dilepis urceus (WEDL)

Hymenolepis microcephala RUD.

Plegadis guarana (LINN.).

Geographische Verbreitung: Vereinigte Staaten, Mexiko, Südamerika, Große Antillen.

(?) *Anochotaenia longiorata* FUHRMANN

Dioicocestus paronai FUHRMANN.

Platylea leucorodia (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Zentral-Asien, Indien, China, Japan, Ost-Afrika.

Dilepis urceus (WEDL)

Cyclorchida omalanceristota (WEDL)

Cyclusteria capito (RUD.)

Hymenolepis filirostris (WEDL).

Ajaja ajaja (LINN.).

Geographische Verbreitung: Vereinigte Staaten, Zentral- und Südamerika bis Argentinien.

Dilepis transfuga (KRABBE).

Tantalus sp.

Fundort: Brasilien.

Dilepis bicoronata FUHRMANN.

Abdimia abdimia.

Geographische Verbreitung: Tropisches Afrika, Arabien, Spanien.

Hymenolepis microcephala (RUD.).

Ciconia ciconia (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien; im Winter Afrika, Nord-Indien.

Hymenolepis microcephala (RUD.)

Anomotaenia discoidea (VAN BEN.).

Leptoptilus crumeniferus (LESS.).

Geographische Verbreitung: Tropisches Afrika.

Hymenolepis leptoptili (v. LINSTOW).

Tigrisoma brasiliense (LINN.).

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia, Peru, Ecuador, Columbia, Trinidad.

Dilepis crassirostrata FUHRMANN.

Pyrrherodias purpurea (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Zentral-Asien, Afrika, Madagaskar.

Acanthocirrus macropus (WEDL)

Hymenolepis microcephala (RUD.)

Taenia papillā WEDL.

Ardea cinerea LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Asien, Afrika, Australien.

Dilepis campylancristota (WEDL)

Acanthocirrus cheilancristota (WEDL)

Hymenolepis microcephala (RUD.)

Taenia leuckarti KRABBE.

Ardea sp.

Fundort: ?.

Taenia leuckarti KRABBE.

Ardea sp.

Fundort: Brasilien.

Anomotaenia aurita (RUD.).

Ardea sp.

Fundort: Sibirien.

Dilepis hoplites (v. LINSTOW).

Florida caerulea (LINN.).

Geographische Verbreitung: Vereinigte Staaten, Zentralamerika, Antillen, Brasilien.

Anomotaenia aurita (RUD.)

Dilepis papillifera FUHRMANN.

Herodias egretta (WILS.).

Geographische Verbreitung: Nord-, Zentral- und Südamerika.

Dilepis unilateralis (RUD.)

Herodias timoriensis CUC.

Geographische Verbreitung: Japan und Nord-China, Malayischer Archipel bis Australien.

Anomotaenia glandularis FUHRMANN.

Garzetta garzetta LINN.

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, China, Japan, Afrika, Indien.

Davainca circumcineta (KRABBE).

Nycticorax nycticorax (LINN.).

Geographische Verbreitung: Süd- und Zentral-Europa, Indien, Japan, China, Afrika, Nord- und Zentralamerika, Antillen.

Tetrabothrius porrigens MOLIN

Acanthocirrus macropeus (WEDL)

Hymenolepis microcephala (RUD.).

Cancroma cochlearis LINN.

Geographische Verbreitung: Columbia, Süd-Brasilien, Guyana.

Proorchida lobata FUHRMANN

Lateriporus spinosus FUHRMANN.

Butorides striata LINN.?

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Hymenolepis unilateralis (RUD.).

Butorides virescens (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord- und Zentralamerika, Antillen.

Hymenolepis unilateralis (RUD.)

Tetracisidicotyla macrocolecina FUHRMANN.

Botaurus stellaris LINN.

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region.

Cyclustera fuhrmanni CLERC

Taenia brevirostris WEDL.

Phoenicopteri.

Leptotaenia ischnorhyncha (LÜHE)

Hymenolepis liguloides (GERV.)

Hymenolepis caroli (PARONA)

Hymenolepis megalorchis (LÜHE)

Amabilia lamelligera (OWEN).

Phoenicopterus roseus PALL.

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer, Zentral-Asien, Afrika, Indien, Ceylon.

Leptotaenia ischnorhyncha (LÜHE)
Hymenolepis liguloides (GERV.)
Hymenolepis caroli (PARONA)
Hymenolepis megalorchis (LÜHE)
Amabilia lamelligera (OWEN).

Accipitres.

Tetrabothrius junceus BAIRD
Mesocestoides perlatus (GOEZE)
Davainea sphaeroides CLERC
Davainea hertwigi MOLA
Idiogenes flagellum (GOEZE)
Anomotaenia mollis (VOLZ)
Anomotaenia trapexoides FUHRMANN
Dilepis oligorchida FUHRMANN
Laterotaenia nattereri FUHRMANN
Dipylidium avicola FUHRMANN
Culcitella crassa FUHRMANN
Culcitella rapacicola FUHRMANN
Taenia cylindracea BLOCH
Taenia heteracantha FUHRMANN
Oligorchis strangulatus FUHRMANN
Taenia viator LEIDY.

Gypagus papa (LINN.).

Geographische Verbreitung: Südamerika, Mexiko.

Tetrabothrius junceus BAIRD
Laterotaenia nattereri FUHRMANN.

Polyborus tharus (MOL.).

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Aploparaksis filum (GOEZE).¹⁾

Gyps kolbi (DAND.).

Geographische Verbreitung: Süd-Afrika.

Dipylidium avicola FUHRMANN.

Circus pygargus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa und Asien; im Winter Süd-Afrika, Indien, China.

Taenia cylindracea BLOCH.

1) Ist wohl mit der Nahrung in den Darm dieses Vogels gekommen (s. S. 82).

Circus cyaneus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-Europa und Sibirien; im Winter Nordost-Afrika, Nord-Indien, China.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Circus aeruginosus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Sibirien; im Winter Nord-Afrika, Indien, China, Japan.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Accipiter nisus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa und Zentral-Asien bis zum Polarkreis.

Hymenolepis leptodera (v. LINSTOW).¹⁾

Circaetus gallicus (GM.).

Geographische Verbreitung: Ost- und Süd-Europa, Mittelmeerländer, Nordost-Afrika, Zentral-Asien.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Haliaeetus albicilla (LINN.).

Geographische Verbreitung: Grönland, Nord-Europa, Nord-Asien; im Winter Nord-Indien, China.

Taenia cylindracea BLOCH.

Elanoides furcatus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika; im Winter Zentralamerika, Brasilien.

Oligorchis strangulatus FUHRMANN

Taenia viator LEIDY.

1) Ist S. 79 als Synonym von *Hym. fringillarum* (RUD.) angeführt und wird mit der Nahrung in den Darm obigen Raubvogels gelangt sein.

Nisaëtus pennata GM.

Geographische Verbreitung: Süd- und Nordost-Afrika, Mittelmeerländer, Südost-Europa, Indien.

Taenia cylindracea BLOCH

Nisaëtus fasciatus (VIEILL.).

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Nordost-Afrika, Südwest-Asien, Indien.

Davainea hertwigi MOLA.

Milvus milvus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa.

Idiogenes flagellum (GOEZE)

Mesocestoides perlatus (GOEZE).

Milvus korschun (GM.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Zentral-Asien; im Winter Afrika.

Idiogenes flagellum (GOEZE)

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Milvus melanotis T. et S.

Geographische Verbreitung: Nordost-Asien, Japan, Himalaya, Indien.

Idiogenes flagellum GOEZE.

Milvus aegypticus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Afrika, Madagaskar.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia heteracantha FUHRMANN.

Buteo buteo (LINN.).

Geographische Verbreitung: West-Europa.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Buteo menetriesi BOGD.

Geographische Verbreitung: Ost-Europa.

Davainea sphaeroides CLERC.

Busarellus nigricollis (LATH.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Amazonia, Guyana.

Dilepis oligorchida FUHRMANN.

Urubutinga urubutinga (GM.).

Geographische Verbreitung: Zentralamerika, Brasilien, Chili, Paraguay.

Anomotaenia trapezoides FUHRMANN.

Asturina nitida (LATH.).

Geographische Verbreitung: Südost-Brasilien, Panama

Culcitella rapacicola FUHRMANN.

Aquila chrysaetus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien, Nord-Amerika.

Mesocestoides perlatus (GOEZE).

Aquila heliaca SAVIGN.

Geographische Verbreitung: Südost-Europa, Zentral-Asien, Nord-Indien, China.

Mesocestoides perlatus (GOEZE).

Archibuteo lagopus (GM.).

Geographische Verbreitung: Nord- und Zentral-Europa, Sibirien.

Taenia cylindracea BLOCH.

Spizaetus ornatus (DAND.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Südamerika.

Culcitella crassa FUHRMANN.

Geranospizias caerulescens (VIEILL.).

Geographische Verbreitung: Tropisches Südamerika.

Culcitella rapacicola FUHRMANN.

Pernis apivorus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Afrika, Madagaskar.
Taenia cylindracea BLOCH.

Falco feldegi SCHL.

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer, Nordost-Afrika.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Falco merillus (GERINI).

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien, China.
Taenia cylindracea BLOCH.

Falco peregrinus TUNST.

Geographische Verbreitung: Nordhemisphäre; im Winter Afrika, Indien.

Taenia cylindracea BLOCH.

Falco subbuteo LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien; im Winter Afrika, Indien, China.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Falco minor BP.

Geographische Verbreitung: Süd- und Nordost-Afrika.
Anomotaenia mollis (VOLZ).

Falco nubicus?

Fundort: Ägypten.

Taenia cylindracea BLOCH.

Cerchneis naumanni (FLEISCH.).

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer, Zentral-Asien, China; im Winter Afrika, Indien.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Cerchneis tinnunculus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien; im Winter Nordost-Afrika, Indien, China.

Mesocestoides perlatus (GOEZE)

Taenia cylindracea BLOCH.

Ictinia palumbea GM.

Geographische Verbreitung: Zentral- und Südamerika

Culcitella rapacicola FUHRMANN.

Anseriformes.

Tetrabothrius arcticus v. LINSTOW

Cittotaenia aricola FUHRMANN

Ophryocotyle sp.

Darainea anatina FUHRMANN

? *Biuterina longiceps* (RUD.)

Lateriporus teres (KRABBE)

Lateriporus propetereus FUHRMANN

Lateriporus biuterinus FUHRMANN

Choanotaenia borealis (v. LINSTOW)

Taenia brachysoma SETTI

Taenia krabbei KOWALEWSKI

Hymenolepis aquabilis (RUD.)

Hymenolepis fasciata (RUD.)

Hymenolepis tenuirostris (RUD.)

Hymenolepis lanceolata (BLOCH)

Hymenolepis collaris (BATSCH)

Hymenolepis setigera (FRÖLICH)

Hymenolepis gracilis (ZEDER, KRABBE)

Hymenolepis microsoma (CREPLIN)

Hymenolepis megalops (CREPLIN)

Hymenolepis coronula (DUJARDIN)

Hymenolepis micraneristota (WEDL.)

Hymenolepis creplini (KRABBE)

Hymenolepis anatina (KRABBE)

Hymenolepis liophallos (KRABBE)

Hymenolepis fragilis (KRABBE)

Hymenolepis octacantha (KRABBE)

Hymenolepis fallax (KRABBE)

Hymenolepis groenlandica (KRABBE)

Hymenolepis pigmentata (v. LINSTOW)

Hymenolepis tenerrima (v. LINSTOW)

Hymenolepis pachycephala (v. LINSTOW)

Hymenolepis macracanthos (v. LINSTOW)

- Hymenolepis sibirica* v. LINSTOW
Hymenolepis abortiva v. LINSTOW
Hymenolepis trifolium v. LINSTOW
Hymenolepis bilateralis v. LINSTOW
Hymenolepis retracta v. LINSTOW
Hymenolepis clausa v. LINSTOW
Hymenolepis parvula KOWALEWSKI
Hymenolepis arcuata KOWALEWSKI
Hymenolepis compressa (LINTON)
Hymenolepis teresoides FUHRMANN
Hymenolepis orthacantha FUHRMANN
Hymenolepis tritesticulata FUHRMANN
Hymenolepis longiraginata FUHRMANN
Hymenolepis longicirrosa FUHRMANN
Hymenolepis papillata FUHRMANN
Hymenolepis bisaccata FUHRMANN
Hymenolepis flagellata FUHRMANN
Hymenolepis simplex FUHRMANN
Hymenolepis lobata FUHRMANN
Hymenolepis echinocotyle FUHRMANN
Hymenolepis (Echinocotyle) rosseteri (BLANCHARD)
Hymenolepis sagitta (ROSSETER)
Diorchis parviceps v. LINSTOW
Diorchis acuminata CLERC
Aploparaksis furcigera (RUD.)
Aploparaksis birulai v. LINSTOW
Diploposthe laeris (BLOCH)
Diploposthe tuberculata (KREFFT)
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS)
Fimbriaria plana v. LINSTOW
Taenia conica MOLIN
Taenia moschata KREFFT
Taenia flavescens KREFFT
Taenia cylindrica KREFFT
Taenia pediformis KREFFT
Taenia bairdii KREFFT
Taenia macracantha LINTON
Taenia destituata LÖNNBERG.

Cygnus olor (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord- und Zentral-Europa, Zentral-Asien; im Winter Nordwest-Indien, Kaspisches und Mittelmeer.

- Hymenolepis creplini* (KRABBE)
Hymenolepis acqnabilis (RUD.).

Cygnus olor dom.

- Hymenolepis aequabilis* (RUD.)
Hymenolepis setigera (FRÖLICH)
Hymenolepis anatina (KRABBE).

Cygnus musicus BECHST.

Geographische Verbreitung: Arktisches Europa und Asien.

- Hymenolepis lanceolata* (BLOCH)
Hymenolepis aequabilis (RUD.)
Hymenolepis setigera (FRÖLICH)
Hymenolepis micraneristrotata (WEDL)
Hymenolepis megalops (NITZSCH).
Hymenolepis liophallos (KRABBE)
Hymenolepis creplini (KRABBE)

Coscoroba coscoroba (MOL.).

Geographische Verbreitung: Südliches Südamerika.

- Hymenolepis megalops* (NITZSCH)
Hymenolepis orthacaulha FUHRMANN.

Cairina moschata (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentralamerika und tropisches Südamerika.

- Lateriporus biuterina* FUHRMANN
 ? *Biuterina longiceps* (RUD.)
Hymenolepis lanceolata (BLOCH)
Hymenolepis megalops (NITZSCH)
Hymenolepis papillata FUHRMANN
Hymenolepis bisaccata FUHRMANN.

Anser anser (LINN.).

Geographische Verbreitung: Westl. paläarktische Region; im Winter Europa.

- Hymenolepis fasciata* (RUD.)
Hymenolepis collaris (BATSCH)
Hymenolepis setigera (FRÖLICH)
Hymenolepis coronula (DUJARDIN)
Hymenolepis creplini (KRABBE)

Anser cinereus dom. MEYER.*Hymenolepis lanceolata* (BLOCH)*Hymenolepis fasciata* (RUD.)*Hymenolepis sinuosa* (ZEDER)*Hymenolepis gracilis* (ZEDER)*Hymenolepis tenuirostris* (RUD.)*Taenia krabbei* KOWALEWSKI*Fimbriaria fasciolaris* (PALLAS).***Anser fabalis*** (LATH.).

Geographische Verbreitung: Westpaläarktische Region
im Winter Zentral- und Süd-Europa.

Hymenolepis setigera FRÖLICH.***Anser albifrons*** (SCOP.).

Geographische Verbreitung: Nordpaläarktische Region;
Nord-Europa, Sibirien; im Winter Mittelmeer, Caspisches Meer, Nord-
Indien, China.

Hymenolepis fasciata (RUD.)*Hymenolepis creplini* (KRABBE).***Branta leucopsis*** (BECHST.).

Geographische Verbreitung: Arktisches West-Europa;
im Winter Atlantische Küsten.

Hymenolepis setigera FRÖLICH*Hymenolepis longivaginata* FUHRMANN.***Branta bernicla*** (LINN.).

Geographische Verbreitung: Arktische Region; im Winter
Nord-Europa und Arktisches Amerika.

Hymenolepis lanceolata (BLOCH)*Hymenolepis setigera* (FRÖHLICH).***Branta canadensis*** (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika; im Winter
Mexiko.

Diploposthe laevis (BLOCH).

Tadorna tadorna (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Sibirien bis Japan; im Winter Süd-Europa, Nord-Afrika, West-Asien, Nord-Indien, Süd-China, Japan.

Hymenolepis gracilis (ZEDER)

Hymenolepis coronula (DUJ.)

Hymenolepis simplex FUHRMANN

Taenia destituata LÖNNBERG.

Dendrocygna autumnalis (LINN.).

Geographische Verbreitung: Texas bis Panama.

Lateriporus biuterinus FUHRMANN.

Dendrocygna javanica HORSE.

Geographische Verbreitung: Indien, Ceylon, Malacca, Java, Sumatra, Borneo.

Hymenolepis clausa v. LINSTOW.

Anas boschas LINN.

Geographische Verbreitung: Nordhemisphäre; im Winter Nord-Afrika, Arabien, Persien, Indien, China, Japan, Mexico, Zentral-Amerika.

Hymenolepis gracilis (RUD.)

Hymenolepis collaris (BATSCH)

Hymenolepis coronula (DUJ.)

Hymenolepis anatina (KRABBE)

Hymenolepis octacantha (KRABBE)

Hymenolepis abortiva v. LINSTOW

Hymenolepis trifolium v. LINSTOW

Aploparaksis furcigera (RUD.)

Diploposthe laevis (BLOCH)

Fimbriaria fasciolaris (PALLAS)

Fimbriaria plana v. LINSTOW

Taenia conica MOLIN.

Anas boschas dom.

Davainea anatina FUHRMANN

Hymenolepis collaris (BATSCH)

Hymenolepis gracilis (RUD.)

Hymenolepis tenuirostris (RUD.)

Hymenolepis anatina (KRABBE)

Hymenolepis lanceolata (BLOCH)
Hymenolepis coronula (DUJARDIN)
Hymenolepis megalops (NITZSCH)
Hymenolepis parvula KOWALEWSKI
Hymenolepis (Echinocotyle) rosseteri (BLANCHARD)
Hymenolepis sagitta (ROSSETER)
Taenia brachysoma SETTI
Diploposthe laevis (BLOCH)
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS)
Taenia conica MOLIN.

Anas obscura GM.

Geographische Verbreitung: Nordamerika; im Winter Bermudas.

Hymenolepis lanceolata (BLOCH)
Diploposthe laevis (BLOCH).

Anas superciliosa GM.

Geographische Verbreitung: Sunda-Inseln, Neuguinea, Polynesien, Neuseeland, Australien.

Taenia cylindrica KREFFT
Taenia pediformis KREFFT
Taenia flavescens KREFFT
Taenia bairdii KREFFT
Fimbriaria fasciolaris (PALL.).

Anas moschata dom.

Fimbriaria fasciolaris (PALL.).

Sarcidiornis carunculata ILLIG.

Geographische Verbreitung: Brasilien, Argentinien.

Lateriporus biuterinus FUHRMANN.

Chenoplax pubatus (SPIX).

Geographische Verbreitung: Amazonia, Guyana.

Lateriporus biuterinus FUHRMANN.

Mareca penelope (LINN.).

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter bis Nordost-Afrika, Persien, Nord-Indien, China, Japan; selten Nordamerika.

- Hymenolepis gracilis* (RUD.)
Hymenolepis fasciata (RUD.)
Hymenolepis collaris (BATSCH)
Hymenolepis coronula (DUJARDIN)
Hymenolepis fallax (KRABBE)
Diorchis acuminata CLERC
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

Nettion brasiliense (GM.).

Geographische Verbreitung: Ganz Südamerika.

- Hymenolepis collaris* (BATSCH)
Hymenolepis megalops (NITZSCH)
Hymenolepis bisaccata FUHRMANN
Lateriporus propeteres FUHRMANN
Lateriporus biuterina FUHRMANN
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

Nettion crecca (LINN.).

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter Nord-Afrika, Arabien, Indien, China, Japan.

- Hymenolepis gracilis* (ZEDER)
Aploparaksis fureigera (RUD.)
Hymenolepis megalops (NITZSCH)
Hymenolepis fragilis (KRABBE)
Hymenolepis octacantha (KRABBE)
Diorchis acuminata CLERC
Diploposthe laevis (BLOCH)
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

Dafila acuta (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordhemisphäre; im Winter Nord-Afrika, Indien, China, Japan, Zentralamerika, Westindien.

- Hymenolepis collaris* (BATSCH)
Hymenolepis megalops (NITZSCH)
Hymenolepis anatina (KRABBE)
Hymenolepis octacantha (KRABBE)

Poecilometta bahamensis (LINN.).

Geographische Verbreitung: Tropisches Südamerika, Westindien.

Hymenolepis flagellata FUHRMANN

Hymenolepis lobata FUHRMANN.

Querquedula querquedula (LINN.).

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter Nord-Afrika, Indien, China, Japan.

Hymenolepis fallax (KRABBE)

Diploposthe laevis (BLOCH)

Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

Spatula clypeata (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordhemisphäre; im Winter Afrika, Arabien, Indien, Süd-China, Japan, Columbia, Westindien.

Hymenolepis gracilis (ZEDER)

Hymenolepis octacantha (KRABBE)

Hymenolepis anatina (KRABBE)

Hymenolepis echinocotyle FUHRMANN

Diploposthe laevis (BLOCH)

Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

Spatula rhynchotis LATH.

Geographische Verbreitung: Australien, Tasmanien, Neuseeland.

Taenia flavescens KREFFT.

Netta rufina (PALLAS).

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer, Zentral-Asien; im Winter Indien.

Hymenolepis lanceolata (BLOCH)

Diploposthe laevis (BLOCH)

Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

Aythya africana (GM.).

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region bis Nord-Afrika, Indien.

Hymenolepis lanceolata (BLOCH)

Hymenolepis megalops (NITZSCH)

Diploposthe laevis (BLOCH).

Aythya ferina (LINN.).

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter Süd-Europa, Nord-Afrika.

Hymenolepis lanceolata (BLOCH)

Hymenolepis furcigera RUD.

Hymenolepis collaris (BATSCH)

Hymenolepis setigera FRÖLICH

Diploposthe laevis (BLOCH).

Aythya australis (EYTON).

Geographische Verbreitung: Australien, Neuseeland, Neuguinea.

Diploposthe tuberculata KREFFT.

Fuligula fuligula (LINN.).

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter Japan, Nord-Indien, Sunda-Inseln, Philippinen, Süd-China, Mittelmeerländer.

Hymenolepis sinuosa (ZEDER)

Hymenolepis megalops (NITZSCH)

Diploposthe laevis (BLOCH).

Fuligula marila LINN.

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter Mittelmeerländer, Nordwest-Indien, China, Japan.

Hymenolepis tenuirostris (RUD.)

Hymenolepis aequabilis (RUD.)

Hymenolepis microsoma (CREPLIN)

Hymenolepis gracilis (ZEDER)

Hymenolepis megalops (NITZSCH)

Hymenolepis coronula (DUJARDIN)

Hymenolepis fallax (KRABBE)
Hymenolepis pigmentata (V. LINSTOW)
Hymenolepis tenerrima (V. LINSTOW)
Hymenolepis arcuata KOWALEWSKY
Hymenolepis sp. COHN
Diploposthe laevis (BLOCH)
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

***Aristonetta vallisneria* (WILS.).**

Geographische Verbreitung: Nordamerika; im Winter Zentralamerika, Westindien.

Hymenolepis compressa (LINTON).

***Clangula clangula* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nordhemisphäre, arktische und subarktische Region; im Winter Süd-Europa, Nord-Indien, China, Japan, Mexiko, Westindien.

Hymenolepis coronula (DUJARDIN)
Hymenolepis macracanthos (V. LINSTOW)
Diploposthe laevis (BLOCH)
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

***Harelda glacialis* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Arktische Region; im Winter Süd-Europa, Zentral-Asien, China, Nord- und Zentral-Vereinigte Staaten.

Choanotaenia borealis (V. LINSTOW)
Hymenolepis microsoma (CREPLIN)
Hymenolepis groenlandica (KRABBE)
Hymenolepis megalhystera (V. LINSTOW)
Lateriporus teres (KRABBE)
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

***Histrionicus histrionicus* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Island, nördliches Nordamerika; im Winter Californien, Japan.

Hymenolepis pachycephala V. LINSTOW.

***Oedemia fusca* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nord-paläarktische Region; im Winter Nord- und Zentral-Europa.

Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
Hymenolepis microsoma (CREPLIN)
Lateriporus biuterina FUHRMANN
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

***Oedemia nigra* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nord-paläarktische Region;
im Winter West-Europa.

Hymenolepis microsoma (CREPLIN)
Hymenolepis micraneristrola (WEDL.)
Diploposthe laevis (BLOCH).

***Oedemia americana* (Sw. et RICH.).**

Geographische Verbreitung: Nördliches Nordamerika,
Nord-Asien; im Winter Vereinigte Staaten, Japan.

Taenia macracantha LINTON
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

***Somateria mollissima* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Arktische Region; im Winter
Baltisches Meer und Nordwest-Europa.

Tetrabothrius arcticum v. LINSTOW
Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
Hymenolepis microsoma (CREPLIN)
Hymenolepis fallax (KRABBE)
Lateriporus teres (KRABBE)
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

***Erionetta spectabilis* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Arktische Region; im Winter
Vereinigte Staaten.

Hymenolepis microsoma (CREPLIN)
Hymenolepis retracta v. LINSTOW
Hymenolepis sibirica (v. LINSTOW)
Aploparaksis birulai v. LINSTOW.

***Cygnopsis cygnoides* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Ost-Sibirien, China, Japan.

Hymenolepis longicirrosa FUHRMANN
Diploposthe laevis (BLOCH).

Chauliastur streperus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordhemisphäre.

- Hymenolepis gracilis* (ZEDER)
Hymenolepis fragilis (KRABBE)
Hymenolepis octacantha (KRABBE)
Hymenolepis anatina (KRABBE)
Hymenolepis teresoides FUHRMANN
Diorchis acuminata CLERC
Diploposthe laevis (BLOCH).

Erismatura leucocephala (SCOP.).

Geographische Verbreitung: Mittelmeerländer; im Winter Nord-Westindien.

- Hymenolepis gracilis* (ZEDER)
Hymenolepis coronula (DUJARDIN)
Hymenolepis lanceolata (BLOCH)
Hymenolepis megalops (NITZSCH)
Diploposthe laevis (BLOCH)
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

Biziura lobata (TEMM.).

Geographische Verbreitung: Australien, Tasmanien.

- Taenia moschata* KREFFT.

Mergus albellus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-paläarktische Region im Winter Mittelmeerländer, China, Japan.

- Hymenolepis tenuirostris* (RUD.).

Merganser castor (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord-paläarktische Region; im Winter Süd-Europa, Japan, China.

- Hymenolepis gracilis* (RUD.)
Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
Hymenolepis tritesticulata FUHRMANN
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS).

***Merganser serrator* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nördliche Nordhemisphäre; im Winter Mittelmeerländer, Nordwest-Indien, China, Japan, Vereinigte Staaten.

Hymenolepis tenuirostris (RUD.)
Hymenolepis gracilis (ZEDER)
Diorechis parviceps v. LINSTOW
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS)
Ophryocotyle sp.¹⁾

Psittaciformes.

Cittotaenia psittacca FUHRMANN
Moniezia carrinoi DIAMARE
Moniezia ambigua FUHRMANN
Moniezia beauforti v. JANICKI
Aporina alba FUHRMANN
Davainea leptosoma (DIESING)
Davainea macroscolecina FUHRMANN
Davainea microscolecina FUHRMANN
Davainea ? *longissima* (GOEZE)
Taenia anoplocephaloides FUHRMANN.

***Lorius garrulus* (LINN.).²⁾**

Geographische Verbreitung: Brasilien.

Davainea macroscolecina FUHRMANN.

***Lorius erythrothorax* SALVAD.**

Fundort: Neuguinea.

Moniezia carrinoi (DIAMARE).

***Trichoglossus novae-hollandiae* (GM.).**

Geographische Verbreitung: Australien, Tasmanien.

Moniezia carrinoi (DIAMARE).

***Cyclopsittacus suavissimus* SCLAT.**

Geographische Verbreitung: Neuguinea.

Moniezia carrinoi (DIAMARE).

1) Nach LÖNNBERG.

2) Die Bestimmung dieses Vogels ist sicher unrichtig, da diese Art nicht in Brasilien, sondern nur auf den Molukken vorkommt.

Cyclopsittacus diophthalmus HOMBR.

Geographische Verbreitung: Neuguinea.

Monixia beauforti JANICKI.

Cacutua roseicapilla VIEILL.

Geographische Verbreitung: Australien.

Davainea leptosoma (DIESING).

Ara aureicollis CASS.

Geographische Verbreitung: Zentral-Brasilien, Argentinien, Paraguay, Bolivia.

Davainea leptosoma (DIESING).

Ara severa (LINN.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Guyana bis Panama.

Davainea leptosoma (DIESING).

Ara macao (LINN.).

Geographische Verbreitung: Mexiko, Guyana, Zentralamerika, Amazonia.

Davainea leptosoma (DIESING).

Ara maracana (VIEILL.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Paraguay.

Davainea leptosoma (DIESING).

Ara nobilis (LINN.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Amazonia.

Davainea leptosoma (DIESING).

Ara macarouana (GM.).

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia, Ecuador, Peru.

Davainea leptosoma (DIESING).

Amazona amazonica BOISS.

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Moniezia ambigua FUHRMANN. ¹⁾*Pyrrhua* sp.

Fundort: Brasilien.

Aporina alba FUHRMANN.*Conurus guarouba* (GM.).

Geographische Verbreitung: Nordost-Brasilien, Amazonia.

Davainca leptosoma (DIESING).*Pionospittacus pileatus* (SCOP.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Paraguay.

Davainca macrocolecina FUHRMANN. ²⁾*Pionus fuscus* (MÜLL.).

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia.

Davainca leptosoma (DIESING).*Psittacus erythacus* LINN. ³⁾

Geographische Verbreitung: Äquatoriales Afrika.

Davainca leptosoma (DIESING)*Taenia anoplocephaloides* FUHRMANN.*Eclectus rosatus* (P. L. MÜLLER).

Geographische Verbreitung: Molukken.

Taenia longissima GOEZE. ³⁾1) Von DIESING als *T. leptosoma* bestimmt.2) Von DIESING als *T. leptosoma* bestimmt.3) In diesem Vogel ist *T. longissima* gefunden worden, aber sie ist unkenntlich beschrieben, und die Typen existieren nicht mehr, so daß diese Art zu streichen.

Chrysotis purpurea?

Fundort: ?.

Davainea leptosoma (DIESING).

Grauer Papagei.

Fundort: Afrika.

Davainea leptosoma (DIESING).¹⁾*Stringops habroptilus* GRAY.

Geographische Verbreitung: Neuseeland.

Cittotaenia psittacea FUHRMANN.

Coccigiformes.

Davainea difformis (RUD.)*Davainea calcaria* FUHRMANN*Davainea undulata* FUHRMANN*Davainea macrocirrosa* FUHRMANN*Anomotaenia mutabilis* (RUD.)*Anomotaenia acollum* FUHRMANN*Hymenolepis intermedius* CLERC*Taenia cyclocephala* CHATIN.*Gallirex porphyreotophus* (VIG.).

Geographische Verbreitung: Süd-Afrika.

Taenia filiformis RUD.²⁾*Cuculus canorus* LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien; im Winter Afrika, Indien bis Australien.

Davainea difformis RUD.*Hymenolepis intermedius* CLERC.

1) Diese Bestimmung scheint mir zweifelhaft.

2) *Taenia filiformis* RUD. wurde in einem Papagei gefunden und wird auch als in *Gallirex* vorkommend zitiert; da diese Art aber nur benannt und nicht beschrieben, ist die Bestimmung wertlos und sicher unrichtig.

***Cuculus intermedius* (VAHL).**

Geographische Verbreitung: Von Sibirien bis Japan; im Winter Süd-China und Indien bis Malayischer Archipel, Neuguinea, Neubritannien, Australien.

Hymenolepis intermedius CLERC.

***Cocca gigas* (BODD.).**

Geographische Verbreitung: West- und Süd-Madagaskar.

Taenia cyclocephala CHATIN.

***Guira guira* (GM.).**

Geographische Verbreitung: Brasilien, Paraguay.

Anomotaenia mutabilis (RUD.).

***Crotophaga ani* LINN.**

Geographische Verbreitung: Vereinigte Staaten, Zentralamerika, Westindien, Südamerika.

Anomotaenia mutabilis (RUD.)

Anomotaenia acollum (FUHRMANN).

***Crotophaga major* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Südamerika von Columbien bis Peru.

Anomotaenia mutabilis (RUD.).

***Corythaeola cristata* VIEILL.**

Geographische Verbreitung: West- und Zentral-Afrika.

Davainea calcaria FUHRMANN

Davainea undulata FUHRMANN.

***Turacus buffoni* VIEILL.**

Geographische Verbreitung: Vom Congo bis zum Senegal.

Davainea macrocirrosa FUHRMANN.

Coraciiformes.

Bertia pinguis FUHRMANN

Davainea magnicoronata FUHRMANN

Ophryocotyle zeylanica v. LINSTOW

Choanotaenia megacantha (RUD.)
Choanotaenia pauciamulata FUHRMANN
Choanotaenia asymetrica FUHRMANN
Dilepis caprimulgorum FUHRMANN
Biuterina meropina (KRABBE)
Biuterina meropina (KRABBE) var. *macrancristota* FUHRMANN
Biuterina rectangula FUHRMANN
Biuterina lobata FUHRMANN
 ? *Biuterina trapezoides* FUHRMANN
Hymenolepis septaria v. LINSTOW
Hymenolepis brasiliensis FUHRMANN
Hymenolepis caprimulgorum FUHRMANN
Hymenolepis parvirostellata (v. LINSTOW)
Taenia simpla LEIDY
Taenia intricata KRABBE
Taenia caprimulgi KRABBE.

Coraciae.

Coracias garrulus LINN.

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa;
im Winter Afrika und Nordwest-Indien.

Biuterina rectangula FUHRMANN.

Eurystomus afer (LATH.).

Geographische Verbreitung: Zentral-Afrika.

Hymenolepis parvirostellata (v. LINSTOW).

Caprimulgi.

Lurocalis semitorquatus (GM.).

Geographische Verbreitung: Süd-Brasilien, Guyana.

Choanotaenia megacantha (RUD.)

Nyctibius jamaicensis (GM.).

Geographische Verbreitung: Mexico, Columbia, Jamaica.

Choanotaenia megacantha (RUD.).

Caprimulgus europaeus (Linn.).

Geographische Verbreitung: Europa, Süd-Sibirien; im Winter Ost- und Süd-Afrika.

Choanotaenia megacantha (RUD.)

Caprimulgus ruficollis TEMM.

Geographische Verbreitung: Nord-Afrika, Südwest-Europa.

Choanotaenia megacantha (RUD.).

Caprimulgus carolinensis (GM.).

Geographische Verbreitung: Süden der Vereinigten Staaten; im Winter Westindische Inseln, Zentralamerika bis Brasilien.

Hymenolepis brasiliensis FUHRMANN

Taenia simpla LEIDY.

Caprimulgus lineatus?

Fundort: Brasilien.

Hymenolepis brasiliensis FUHRMANN.

Caprimulgus sp.

Fundort: Brasilien.

Choanotaenia asymetrica FUHRMANN.

Caprimulgus sp.

Fundort: Turkestan.

Taenia caprimulgi KRABBE.

Caprimulgus sp.

Fundort: Brasilien.

? *Biuterina trapezoides* FUHRMANN.

Caprimulgus sp.

Fundort: Brasilien.

Choanotaenia megacantha (RUD.).

Hydropsalis climacocereus (Tsch.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Peru und Ecuador.

Dilepis caprimulgorum FUHRM.

Podager nacunda (VIEILL.).

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Davainea magnicoronata FUHRMANN

Choanotaenia pauciannulata FUHRMANN

Hymenolepis caprimulgorum FUHRMANN.

Nyctiprogne leucopygia (SPIX).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Cayenne.

Hymenolepis brasiliensis FUHRMANN.

Chordeiles virginianus (GM.).

Geographische Verbreitung: Östliches Nordamerika; im Winter Zentral- und Südamerika, Westindien.

Dilepis caprimulgorum FUHRMANN.

Chordeiles rupestris (SPIX).

Geographische Verbreitung: Amazonia, Bolivia, Peru.

Hymenolepis caprimulgorum FUHRMANN.

Bucerotidae.*Ocyeros gingalensis* SHAW.

Geographische Verbreitung: Nur Ceylon.

Ophryocotyle zeylanica v. LINSTOW.

Bucorax abyssinius (BODD.).

Geographische Verbreitung: Nordwest- und West-Afrika.

Bertia pinguis FUHRMANN.

Upupidae.***Upupa epops* LINN.**

Geographische Verbreitung: Südpaläarktische Region.

Biuterina lobata FUHRMANN

Taenia intricata KRABBE.

***Upupa indica* REICH.**

Geographische Verbreitung: Indien, Ceylon.

Hymenolepis septaria v. LINSTOW.

Meropidae.***Merops apiaster* LINN.**

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Zentral-Asien; im Winter Afrika und Asien.

Biuterina meropina var. *macrancristota* FUHRMANN.

***Merops superciliosis* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Madagascar, Afrika.

Biuterina meropina (KRABBE).

***Melitophagus albifrons* (CAB. et HEINE).**

Geographische Verbreitung: Süd- und Ost-Afrika.

Biuterina meropina var. *macrancristota* FUHRMANN.

Strigiformes.

Paruterina candelabraria (GOEZE)

Paruterina angustata FUHRMANN

Taenia strigis-acadiae LEIDY.

***Syrnium aluco* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa, Kleinasien, Nord-Afrika.

Paruterina candelabraria (GOEZE).

Asio accipitrinus PALL.

Geographische Verbreitung: Kosmopolit.

Paruterina candelabraria (GOEZE).

Asio otus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Sibirien, China, Japan.

Paruterina candelabraria (GOEZE).

Bubo innavus FORST.

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien, selten Nordost-Afrika.

Paruterina candelabraria (GOEZE).

Scops scops (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien, Nordwest-Indien.

Paruterina candelabraria (GOEZE).

Scops brasiliana (GM.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Columbien, Guyana, Venezuela.

Paruterina angustata FUHRMANN.

Nyctale tengmalmi (GM.).

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Nord-Asien.

Paruterina candelabraria (GOEZE).

Nyctale acadica (GM.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika bis Mexico.

Tacnia strigis-acadiae LEIDY.

Brachyotus palustris FORST.

Geographische Verbreitung:

Paruterina candelabraria (GOEZE).

Pici.

- Moniezia variabilis* FUHRMANN
Davainea cruciata (RUD.)
Davainea frontina (DUJ.)
Davainea lutzi PARONA.
Davainea longispina FUHRMANN
Liga punctata WEINLAND
Choanotaenia producta (KRABBE)
Choanotaenia brevis CLERC
Choanotaenia crassitestata FUHRMANN
Fuhrmannia brasiliensis PARONA
Monopygidium crateriforme (SCHRANK)
Anochotaenia conica FUHRMANN
Taenia vexata LEIDY.

***Rhamphastos culminatus* GOULD.**

Geographische Verbreitung: Peru, Bolivia, Ecuador, Columbia.

Moniezia variabilis FUHRMANN.

***Rhamphastos bicolorus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Südost-Brasilien, Paraguay.

Moniezia variabilis FUHRMANN.

***Rhamphastos erythrorhynchus* GM.**

Geographische Verbreitung: Guyana, Unter-Amazonia, Nord-Brasilien.

Moniezia variabilis FUHRMANN.

***Rhamphastos toco* (MÜLL.).**

Geographische Verbreitung: Guyana, Unter-Amazonia, Brasilien, Bolivia, Paraguay, Nord-Argentinien.

Moniezia variabilis FUHRMANN.

***Pteroglossus inscriptus* SWAINS.**

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia.

Choanotaenia crassitestata FUHRMANN.

Colaptes campestris (VIEILL.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Uruguay, Argentinien.

Davainea frontina (DUJ.)

Colaptes auratus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika.

Liga punctata WEINLAND.

Dendrocopus major (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Kleinasien, Süd-Sibirien.

Davainea frontina (DUJ.)

Monypylidium crateriforme (GOEZE)

Choanotaenia brevis CLERC

Anonchotaenia conica FUHRMANN.

Celeus elegans (MÜLLER).

Geographische Verbreitung: Venezuela, Trinidad, Nord-Brasilien.

Davainea longispina FUHRMANN.

Celeus flavescens (GM.).

Geographische Verbreitung: Brasilien.

Davainea longispina FUHRMANN

Davainea lutzii PARONA.

Dryotomus pileatus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika.

Taenia vexata LEIDY.

Ceophilocus lineatus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Guyana, Panama, Peru, Brasilien, Paraguay.

Davainea cruciata (RUD.)

Davainea longispina FUHRMANN.

***Picus martius* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien, Japan.

Davainea frontina (DUJ.)

Monopylidium crateriforme (DUJ.).

***Gecinus viridis* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Kleinasien, Persien, Europa.

Davainea frontina (DUJ.)

Monopylidium crateriforme (GOEZE)

Choanotaenia producta (KRABBE).

***Gecinus canus* (GM.).**

Geographische Verbreitung: Nordost-Europa, Süd- und Ost-Sibirien, Nord-China, Japan.

Davainea cruciata (RUD.)

Monopylidium crateriforme (GOEZE).

Picus sp.

Fundort: Brasilien.

Davainea frontina (DUJ.)

Davainea lutzii PARONA

Fuhrmannia brasiliensis PARONA.

Picus sp.

Fundort: Brasilien.

Davainea longispina FUHRMANN.

Picus sp.

Fundort: Brasilien.

Davainea longispina FUHRMANN.

Passeriformes.

Mesocestoides alaudae STOSSICH

Davainea spinosissima v. LINSTOW

Davainea compacta CLERC

Davainea paradisea FUHRMANN

Davainea uniueterina FUHRMANN

Davainea corvina FUHRMANN

Davainea globocephala FUHRMANN

Choanotaenia galbulae (ZEDER)

- Choanotaenia parina* (DUJARDIN)
Choanotaenia parvirostris (KRABBE)
Choanotaenia macracantha FUHRMANN
Dilepis undula (SCHRANK)
Dilepis attenuata (DUJARDIN)
Dilepis modigliani (PARONA)
Anomotaenia quadrata (RUD.)
Anomotaenia cyathiformis (FRÖLICH)
Anomotaenia constricta (MOLIN)
Anomotaenia depressa (v. SIEBOLD)
Anomotaenia ovolaciniata (v. LINSTOW)
Anomotaenia dehiscens (KRABBE)
Anomotaenia borealis (KRABBE)
Anomotaenia trigonocephala (KRABBE)
Anomotaenia vesiculigera (KRABBE)
Anomotaenia brevis (CLERC)
Anomotaenia brasiliensis FUHRMANN
Anomotaenia isacantha FUHRMANN
Anomotaenia penicillata FUHRMANN
Anomotaenia cyathiformoides FUHRMANN
Anomotaenia undulatoides FUHRMANN
Anomotaenia hirundina FUHRMANN
Anomotaenia (?) *paucitesticulata* FUHRMANN
Parvirostrum reticulatum FUHRMANN
Angularia beema CLERC
Acanthocirrus macrorostratus FUHRMANN
Monopylidium musculosum FUHRMANN
Monopylidium unicoloratum FUHRMANN
Monopylidium passerinum FUHRMANN
Biuterina campanulata (RUD.)
Biuterina longiceps (RUD.)
Biuterina clarulus (v. LINSTOW)
Biuterina triangula (KRABBE)
Biuterina trigonacantha FUHRMANN
Biuterina distincta FUHRMANN
Biuterina trapezoides FUHRMANN
Biuterina passerina FUHRMANN
Biuterina globosa FUHRMANN
Biuterina motacilla FUHRMANN
Biuterina cylindrica FUHRMANN ¹⁾
Biuterina (?) *planirostris* (KRABBE)
Paruterina parallelepipedata (RUD.)
Anonchotaenia globata (v. LINSTOW)

1) Diese Art steht nicht in der Liste der *Biuterina*-Arten (p. 68), sie ist nachträglich gefunden worden und ist mit den andern *Biuterina*-Arten in einer im Druck befindlichen Arbeit beschrieben (s. Literaturverzeichnis).

- Anonchotaenia bobica* CLERC
Anonchotaenia longiorata FUHRMANN
Anonchotaenia brasiliensis FUHRMANN
Anonchotaenia macrocephala FUHRMANN
Anonchotaenia trochili FUHRMANN
Hymenolepis stylosa (RUD.)
Hymenolepis fringillarum (RUD.)
Hymenolepis farciminoso (GOEZE)
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK)
Hymenolepis naja (DUJARDIN)
Hymenolepis bilharzii (KRABBE)
Hymenolepis petrocinciae (KRABBE)
Hymenolepis orientalis (KRABBE)
Hymenolepis hemignathi SHIPLEY
Hymenolepis polygramma (v. LINSTOW)
Hymenolepis dahurica v. LINSTOW
Hymenolepis pellucida FUHRMANN
Hymenolepis microscolecina FUHRMANN
Hymenolepis brevis FUHRMANN
Hymenolepis interruptus CLERC
Hymenolepis passerina FUHRMANN
Hymenolepis parina FUHRMANN
Hymenolepis tichodroma WOLFFHÜGEL
Aploparaksis dujardini (KRABBE)
Anonchotaenia oriolina CHOLODKOVSKY
Taenia platycephala RUD.
Taenia pyramidata RUD.
Taenia motacillae-cayanae RUD.
Taenia motacillae-provincialis RUD.
Taenia motacillae brasiliensis RUD.
Taenia exigua DUJARDIN
Taenia purpurata DUJARDIN
Taenia pestifera LEIDY
Taenia urnigera LEIDY
Taenia oporornis LEIDY
Taenia chlamydoderae KREFFT
Taenia colliculorum KRABBE
Taenia praecox KRABBE
Taenia polyarthra KRABBE
Taenia pyramidalis SINITZINE
Taenia muscipae v. LINSTOW
Taenia caracina PARONA.

Tyrannidae.

Taenioptera velata (LICHT.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Bolivia.

Buiterina campamulata RUD.

Synallaxis phryganophila (VIEILL.).

Geographische Verbreitung: Brasilien, Bolivia, Paraguay, Uruguay.

Biuterina trigonacantha FUHRMANN.

Dendroornis elegans PELZ.

Geographische Verbreitung: Zentral-Brasilien.

Parvirostrum reticulatum FUHRMANN.

Dendroornis rostripalleus DES MURS.

Geographische Verbreitung: Nördl. Südamerika.

Parvirostrum reticulatum FUHRMANN.

Picolaptes fuscicapillus PELZ.

Geographische Verbreitung: Brasilien, Ecuador.

Parvirostrum reticulatum FUHRMANN.

Chamaeza brevicauda (VIEILL.).

Geographische Verbreitung: Südost-Brasilien.

Taenia pyramidata RUD.

? *Thamnophilus sulfuratus* TEMM.

Fundort: Brasilien.

Biuterina campanulata RUD.

Cotungidae.

Tityra semifasciata (SPIX).

Geographische Verbreitung: Süd-Mexico, Zentralamerika, Nördl. Südamerika.

Biuterina globosa FUHRMANN.

Rupicola rupicola (LINN.).

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia.

Darainea winterina FUHRMANN

Hymenolepis microscoleca FUHRMANN.

Pyroderus scutatus (SHAW).

Geographische Verbreitung: Südost-Brasilien, Paraguay.

Taenia caracina PARONA.

Myothera sp.

Fundort: Brasilien.

Choanotaenia macracantha FUHRMANN.

? *Myothera campanisona*.

Fundort: Brasilien.

Taenia pyramidata RUD.

Turdidae.

Sylvia atricapilla (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Persien; im Winter Süd-Europa und Nord-Afrika.

Taenia platycephala RUD.

Sylvia sylvia (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien; im Winter Afrika.

Taenia platycephala RUD.

Taenia purpurata DUJ.

Sylvia curruca (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa; im Winter Nord-Afrika.

Taenia platycephala RUD.

Sylvia hortensis BECHST.

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Kleinasien, Nord-Afrika.

Taenia platycephala RUD.

Sylvia nisoria (BECHST.).

Geographische Verbreitung: Süd-Europa und Zentral-Asien; im Winter Nordost-Afrika.

Taenia platycephala RUD.

Agrobates galactodes TEMM.

Geographische Verbreitung: Westliche Mittelmeerländer.

Hymenolepis bilharzii (KRABBE).

Melizophilus undatus (BODD.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa im Winter Nord-Afrika.

Taenia motacillae-provincialis RUD.

Locustella fluviatilis (WOLF).

Geographische Verbreitung: Ost- und Zentral-Europa, Kleinasien, Palästina; im Winter Nordost-Afrika.

Hymenolepis brevis FUHRMANN

Taenia ptatycephala RUD.

Turdus musicus LINN.

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter Süd-Europa und Nord-Afrika.

Anomotaenia constricta (MOLIN)

Dilepis undula (SCHRANK)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK)

Aploparaksis dujardini KRABBE.

Turdus merula LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Afrika, Persien, Turkestan.

Davainea spinosissima (V. LINSTOW)

Anomotaenia constricta (MOLIN)

Dilepis undula (SCHRANK)

Monopylidium unicoloratum FUHRMANN

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Turdus pilaris* LINN.**

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter Süd-Europa, Zentral-Asien, Nordwest-Indien.

Biuterina triangula (KRABBE)

Dilepis undula (SCHRANK)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Turdus iliaca* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Grönland, Europa; im Winter Zentral- und Süd-Europa.

Anomotaenia constricta (MOLIN)

Dilepis undula (SCHRANK)

Aploparaksis dujardini (KRABBE).

***Turdus viscivorus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Zentral-Europa; im Winter Süd-Europa, Zentral-Rußland.

Dilepis undula (SCHRANK)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Turdus albiventris* SPIX.¹⁾**

Geographische Verbreitung: Columbia, Venezuela, Guyana, Brasilien.

Taenia pyramidata RUD.

***Turdus atrigularis* (TEMM.).**

Geographische Verbreitung:

Dilepis undula (SCHRANK)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Turdus torquatus* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nord-Europa; im Winter Zentral- und Süd-Europa.

Dilepis undula (SCHRANK)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

1) In der helminthologischen Literatur mit dem Museumsnamen *Turdus humilis* LICHT. benannt.

Turdus migratorius LINN.

Geographische Verbreitung: Arktisches Amerika.

? *Hymenolepis serpentulus* (SCHRANK).

***Turdus* sp.**

Fundort: ?.

Buteo triangularis (KRABBE).

? *Turdus parochus*.

Fundort: Ägypten.

Hymenolepis passerina FUHRMANN.

Aedon luscinioides (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa bis Zentral-Asien; im Winter Nordost-Afrika.

Taenia pyramidalis SINITZINE.

Petrochelidon cyanus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Süd-Europa und Zentral-Asien; im Winter in Nordost-Afrika, Indien, Süd-China.

Hymenolepis petrocincloae (KRABBE).

Monticola saxatilis (LINN.).

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Turkestan, Nordost-Sibirien, Nord-China; im Winter Ost-Afrika, Nordwest-Indien.

Dilepis undula (SCHRANK).

Phoenicurus phoenicurus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Paläarktische Region; im Winter West- und Äquatorial-Afrika.

Taenia platycephala RUD.

Phoenicurus erythrogastra (GÜLD.).

Geographische Verbreitung: Kaukasus.

Taenia praecox KRABBE.

Saxicola oenanthe (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Sibirien bis Alaska; im Winter Ost-Afrika, Nord-Indien.

Anomotaenia trigonocephala (KRABBE)

Hymenolepis orientalis (KRABBE)

Taenia platycephala RUD.

? *Saxicola rubicola* BECHST.

Taenia platycephala RUD.

Timelidae.

Anothura troglodytes (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord- und Zentral-Europa, Mittelmeerländer.

Dilepis attenuata (DUJARDIN)

Taenia exigua DUJARDIN.

Cinclus aquaticus BECHST.

Geographische Verbreitung: Zentral- und West-Europa.

Anomotaenia dehiscens KRABBE

Taenia polyarthra KRABBE.

Chlamydera maculata GOULD.

Geographische Verbreitung: Süd- und West-Australien.

Taenia chlamydoderae KREFFT.

Certhiidae.

Certhia familiaris LINN.

Geographische Verbreitung: Skandinavien, Zentral- und Süd-Europa.

Hymenolepis naja (DUJARDIN).

Tichodroma muraria (LINN.).

Geographische Verbreitung: Alpine Region von Europa und Nord-Afrika.

Hymenolepis tichodroma WOLFFHÜGEL.

Sitta europaea LINN.

Geographische Verbreitung: Skandinavien und Rußland.
Hymenolepis naja (DUJARDIN).

Sitta uralensis LICHT.

Geographische Verbreitung: West-Sibirien.
Ananchotaenia bobica CLERC.

Paridae.

Periparus ater (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa.
Ananchotaenia globata (v. LINSTOW)
Hymenolepis fringillarum (RUD.).

? *Parus coeruleus* LINN.

Ananchotaenia globata (v. LINSTOW)
Choanotaenia parina (DUJARDIN)
Hymenolepis fringillarum (RUD.).

Parus major LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Sibirien.
Ananchotaenia globata (v. LINSTOW)
Ananchotaenia bobica CLERC
Hymenolepis fringillarum (RUD.)
Hymenolepis polygramma (v. LINSTOW)
Hymenolepis parina FUHRMANN.

Parus palustris LINN.

Geographische Verbreitung: West- und Zentral-Europa,
 Kleinasien.
Ananchotaenia globata (v. LINSTOW)
Hymenolepis fringillarum (RUD.).

Lophophanes cristatus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord- und Ost-Europa.
Hymenolepis fringillarum (RUD.).

Aegithalus caudatus (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nord- und Zentral-Europa, Sibirien.

Hymenolepis fringillarum (RUD.).

Nectarinidae.

? *Nectarinia calcarata*.

Fundort: Afrika.

Anochotaenia globata (V. LINSTOW).

Alaudidae.

Alauda arvensis LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien bis China.

Mesocestoides alaudae STOSSICH

Biuterina passerina FUHRMANN

Anochotaenia globata (V. LINSTOW)

Taenia platycephala RUD.

Alauda sp.

Fundort: Turkestan.

Biuterina (?) *planirostris* (KRABBE).

Galerita cristata LINN.

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Afrika, Nord-Indien.

Biuterina passerina FUHRMANN

Anochotaenia globata FUHRMANN

(?) *Hymenolepis serpentulus* (SCHRANK)

(?) *Dilepis undula* (RUD.)

Taenia platycephala RUD.

Sylvicolidae.***Motacilla alba* LINN.**

Geographische Verbreitung: Ganz Europa, Nord-Asien;
im Winter Afrika, Indien.

Anomotaenia borealis (KRABBE)

Taenia muscipae v. LINSTOW.

***Motacilla fulva* L.**

Geographische Verbreitung: Europa; im Winter Afrika.

Anomotaenia trigonoccephala KRABBE

Taenia platycephala RUDOLPHI.

***Motacilla* sp.**

Fundort: Brasilien.

Taenia motacillae-brasiliensis RUD.

***Anthus spipoletta* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Süd- und Zentral-Europa,
Turkestan, Persien, Ost-Sibirien, China.

Taenia platycephala RUD.

***Anthus trivialis* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nord- und Zentral-Europa,
Sibirien; im Winter Afrika und Indien.

Taenia platycephala RUD.

***Anthus campestris* LINN.**

Geographische Verbreitung: Süd- und Zentral-Europa;
im Winter Nordost-Afrika und Indien.

Taenia platycephala RUD.

***Anthus pratensis* LINN.**

Geographische Verbreitung: Ganz Europa; im Winter
Nord-Afrika.

Dilepis attenuata (DUJARDIN)

Taenia platycephala RUD.

Acanthocirrus macrostratus FUHRMANN.

Coerebidae.***Dacnis cayana* LINN.**

Geographische Verbreitung: Südliches Südamerika.

Biuterina motacilla FUHRMANN

Taenia motacillae-cayanae RUD.

Fringillidae.***Coccothraustes coccothraustes* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa.

Taenia sp.

***Fringilla coelebs* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa.

Anochotaenia globata (v. LINSTOW)

Dilepis attenuata (DUJARDIN)

Hymenolepis fringillarum (RUD.)

Taenia exigua DUJARDIN.

***Spermophila caerulescens* BONN.**

Geographische Verbreitung: Süd-Brasilien. Paraguay, Bolivia, Argentinien.

Anochotaenia globata (v. LINSTOW).

***Acanthis linaria* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Sibirien, Nordamerika.

Hymenolepis fringillarum (RUD.)

Anochotaenia globata (v. LINSTOW).

***Fringilla montifrigilla* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien bis Japan.

Hymenolepis fringillarum RUD.

? *Fringilla ruficeps.*

Fundort: Agypten.

Monopylidium passerinum FUHRMANN.***Chrysomitris spinus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa und Nord-Asien bis Japan.

Anochotaenia globata (V. LINSTOW)*Anochotaenia bobica* CLERC.*Hymenolepis fringillarum* (RUD.).***Acanthis cannabina* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa bis Turkestan, Nordost-Afrika.

Hymenolepis fringillarum (RUD.).***Passer domesticus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien, Indien.

Dilepis attenuata (DUJARDIN)*Choanotaenia parina* (DUJARDIN)*Monopylidium passerinum* FUHRMANN*Anochotaenia globata* (V. LINSTOW)*Hymenolepis fringillarum* (RUD.).***Passer montanus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa bis Japan, Nord-Afrika.

Dilepis attenuata (DUJARDIN)*Choanotaenia parina* (DUJARDIN)*Anochotaenia globata* (V. LINSTOW)*Hymenolepis fringillarum* (RUD.).***Loxia curvirostra* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien bis Japan, Nordamerika.

Anochotaenia globata (V. LINSTOW).

Emberiza citrinella LINN.

Geographische Verbreitung: Europa bis West-Sibirien.

Anomotaenia borealis (KRABBE)

Buiterina passerina FUHRMANN.

Emberiza melanocephala SCOP.

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Zentral-Indien.

Anonchotaenia globata (v. LINSTOW)

Taenia platycephala RUD.

Emberiza sp.

Fundort: Brasilien.

Anomotaenia isacantha FUHRMANN.

*Emberiza sp.*¹⁾

Fundort: Brasilien.

Buiterina trapezoides FUHRMANN.

Plectrophenax nivalis (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nördl. Hemisphäre.

Anomotaenia borealis (KRABBE).

Zonotrichia pileata (BODD.).

Geographische Verbreitung: Brasilien.

Anonchotaenia globata (v. LINSTOW).

Loxops sp.

Fundort: Sandwich-Inseln.

Anonchotaenia longiovata (FUHRMANN).

1) Es ist fraglich, ob dieser Vogel wirklich eine *Emberiza* und nicht eine *Mniotilide* ist.

Drepanidae.***Hemignathus procerus* CAB.**

Geographische Verbreitung: Sandwich-Inseln.

Hymenolepis hemignathi (SHIPLEY).

Tanagridae.***Tachyphonus cristatus* GM.**

Geographische Verbreitung: Südamerika bis Rio grande do Sul.

Biuterina cylindrica FUHRMANN.

***Tachyphonus melaleucus* (SPAR.).**

Geographische Verbreitung: Panama, Süd-Amerika.

Biuterina cylindrica FUHRMANN

Anonchotaenia sp.

***Tanagra* sp.**

Fundort: Mexico.

Anonchotaenia sp.

***Eucometis pendeillatus* SCL.**

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia, Ost-Peru.

Anonchotaenia sp.

Ploceidae.***Spermestes cucullata* SWAINS.**

Geographische Verbreitung: West-Afrika.

Taenia sp.

Icteridae.***Gymnostinops juracarium* D'ORB.**

Geographische Verbreitung: Bolivia, Brasilien, Ecuador.

Anomotaenia penicillata FUHRMANN

Hymenolepis pellucida FUHRMANN.

***Ostinops decumanus* (PALL.).**

Geographische Verbreitung: Panama, Südamerika bis Bolivia.

Biuterina longiceps (RUD.)

Hymenolepis pellucida FUHRMANN.

***Ostinops viridis* MÜLL.**

Geographische Verbreitung: Britisch Guyana, Amazonia, Ecuador.

Anomotaenia penicillata FUHRMANN

Hymenolepis pellucida FUHRMANN.

***Cassicus affinis* Sw.**

Geographische Verbreitung: Guyana, Cayenne, Amazonia.

Biuterina longiceps (RUD.)

Davainea globocephala FUHRMANN

Ananchotaenia brasiliensis FUHRMANN.

***Cassidix oryzivora* GM.**

Geographische Verbreitung: Nord- und Südamerika.

Ananchotaenia sp.

***Dolichonyx oryzivorus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Nordamerika, Zentralamerika, Brasilien, Peru.

Taenia pestifera LEIDY.

***Curacus aterrimus* (KITTL.).**

Geographische Verbreitung: Chili bis Magalhaens-Straße.

(?) *Ananchotaenia longiorata* (FUHRMANN).

***Molothrus pecoris* GM.**

Geographische Verbreitung: Nordamerika bis Mexico und Californien.

Biuterina trapezoides FUHRMANN

Taenia pestifera LEIDY

Taenia urnigera LEIDY.

Icterus cayennensis LINN.

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia.

Anochotaenia longiovata FUHRMANN.

Icteria viridis GM.

Geographische Verbreitung: Vereinigte Staaten, Mexico, Guatemala.

Taenia pestifera LEIDY.

Tyrannidae.

Serphophaga hypoleuca SCL.

Geographische Verbreitung: Östl. Peru.

Anochotaenia sp.

Tyrannus melancholicus VIEILL.

Geographische Verbreitung: Mexico, Zentralamerika, Südamerika bis Buenos Ayres.

Anochotaenia sp.

Sturnidae.

Sturnus vulgaris LINN.

Geographische Verbreitung: West- und Zentral-Europa, Nord-Afrika, Persien.

Monopylidium musculosum FUHRMANN

Dilepis undula (SCHRANK)

Hymenolepis farciminosa (GOEZE)

Aploparaksis dujardini (KRABBE)

(?) *Choanotoenia parina* DUJARDIN.

Sturnus unicolor TEMM.

Geographische Verbreitung: Länder des Mittelmeeres.

Hymenolepis farciminosa (GOEZE).

Oriolidae.***Oriolus galbula* LINN.**

Geographische Verbreitung: Ganz Europa, Persien, Südwest-Asien; im Winter in Afrika.

Davainea compacta CLERC

Dilepis undula SCHRANK

Choanotaenia galbulae (ZEDER) COHN

Anochotaenia oriolina CHOLODKOVSKY

Hymenolepis stylosa (RUD.)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK)

Hymenolepis farciminosa (GOEZE).

Paradiseidae.***Psilorchis alberti* ELLIOT.**

Geographische Verbreitung:

Biuterina clavulus (v. LINSTOW).

***Paradisea raggiana* SCLATER.**

Geographische Verbreitung: Neuguinea.

Biuterina clavulus (v. LINSTOW).

***Manucodia chalybeata* PENN.**

Geographische Verbreitung: Neuguinea.

Davainea paradisea FUHRMANN.

Corvidae.***Trypanocorax frugilegus* LINN.**

Geographische Verbreitung: Ganz Europa, Zentral-Asien, Nordwest-Indien.

Dilepis undula (SCHRANK)

Anomotaenia constricta (MOLIN)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Corvus corax* LINN.**

Geographische Verbreitung: Ganz Europa, Nord- und Zentral-Asien, Nordamerika bis Mexico.

Dilepis undula (SCHRANK)

Anomotaenia constricta (MOLIN)

Hymenolepis stylosa (RUD.)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Corvus culminatus* SYK.**

Geographische Verbreitung: Indien.

Davainea corvina FUHRMANN.

***Corvus macrorhynchus* WAGL.**

Geographische Verbreitung: Malakka, Sunda-Inseln.

Davainea corvina FUHRMANN.

***Corvus dahuricus* PALL.**

Geographische Verbreitung: Sibirien, Baikal-See.

Hymenolepis dahurica v. LINSTOW.

***Coloeus monedula* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Afrika.

Dilepis undula (SCHRANK)

Anomotaenia constricta (MOLIN)

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK)

Hymenolepis stylosa (RUD.).

***Corone cornix* LINN.**

Geographische Verbreitung: Großbritannien, Zentral- und Süd-Europa.

Dilepis undula (SCHRANK)

Anomotaenia constricta (MOLIN)

Choanotaenia galbulae (ZEDER) COHN

Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Corone corone* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa, Nord-Asien, Nord-west-Indien, China.

Dilepis nudula (SCHRANK)
Anomotaenia constricta (MOLIN)
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Corone levaillanti* LESS.**

Geographische Verbreitung: Indien, China, Ost-Sibirien.

Dilepis modiglianii (PAR.).

***Nucifraga caryocatactes* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nord- und Zentral-Europa,
 Nord-Asien bis Nord-China.

Dilepis nudula (SCHRANK)
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Pica pica* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien, Japan,
 Nord-China, Nordamerika.

Dilepis nudula (SCHRANK)
Anomotaenia constricta (MOLIN)
Hymenolepis stylosa (RUD.)
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Garrulus glandarius* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Europa.

Dilepis nudula (SCHRANK)
Hymenolepis stylosa (RUD.)
Hymenolepis farcimiosa (GOEZE)
Hymenolepis serpentulus (SCHRANK).

***Perisoreus infaustus* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Nord-Europa und Asien.

Anomotaenia brevis (CLERC).

***Gracula* (?).**

Fundort: Brasilien.

Butorina distincta FUHRMANN.

Laniidae.**? *Vanga rufa* GM.**

Geographische Verbreitung: Madagascar.

Paruterina parallepipeda RUD.

***Enneoctonus collurio* LINN.**

Geographische Verbreitung: Europa bis Zentral-Asien, Persien, Arabien; im Winter Ost- und Süd-Afrika.

Anomotaenia borealis (KRABBE)

Paruterina parallepipeda (RUD.).

***Lanius excubitor* LINN.**

Geographische Verbreitung: Nord-Europa, Nord-Asien.

Paruterina parallepipeda (RUD.).

***Lanius minor* GM.**

Geographische Verbreitung: Südost-Europa, Zentral-Asien; im Winter Ost- und Süd-Afrika.

Paruterina parallepipeda (RUD.).

Muscicapidae.***Hedymela atricapilla* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Europa, Persien; im Winter West- und Nordost-Afrika.

Anomotaenia quadrata (RUD.)

Hymenolepis interruptus CLERC.

***Hedymela collaris* (BECHST.).**

Geographische Verbreitung: Zentral- und Süd-Europa, Mittelmeerländer.

Anomotaenia quadrata (RUD.).

? *Muscicapa audax*.

Fundort: Brasilien.

Biuterina campanulata (RUD.).

? Muscicapa columbina.

Fundort: Brasilien.

Butorina campanulata (RUD.).**Hirundinidae.***Chelidonaria urbica* (LINN.).

Geographische Verbreitung: Europa, Zentral-Asien; im Winter Afrika, Indien.

Choanotaenia parvirostris (KRABBE)*Anomotaenia depressa* (v. SIEBOLD).*Hirundo rustica* LINN.

Geographische Verbreitung: Europa bis China; im Winter Afrika, Indien, Süd-China.

Choanotaenia parvirostris (KRABBE)*Anomotaenia ovolaciniata* (v. LINSTOW)*Anomotaenia cyathiformis* (FRÖLICH)*Anomotaenia vesiculigera* (KRABBE)*Anomotaenia depressa* (v. SIEBOLD)*Angularia beema* CLERC.¹⁾*Hirundo sp.*

Fundort: Brasilien.

Anomotaenia cyathiformis (FRÖLICH).*Hirundo sp.*

Fundort: Brasilien.

Ananchotaenia macrocephala FUHRMANN.*Hirundella sp.*

Fundort: Brasilien.

Ananchotaenia macrocephala FUHRMANN.

1) CLERC 1906b sagt, daß er diese Art in einigen Schwalben des Urals gefunden, ohne die Artnamen derselben anzugeben; ich nehme an, daß es diese beiden auch in Rußland vorkommenden Arten waren.

Clivicola riparia (LINN.).

Geographische Verbreitung: Norden von Europa und Asien, Nordamerika; im Winter Afrika, Nordwest-Indien, Zentral- und Südamerika.

Anomotaenia cyathiformis (FRÖLICH)

Anomotaenia hirundina FUHRMANN

Angularia beema CLERC¹⁾

Taenia colliculorum KRABBE.

Progne chalybea (GM.).

Geographische Verbreitung: Zentralamerika, Brasilien, Guyana, Venezuela, Bolivia.

Anochotaenia macrocephala FUHRMANN.

Progne purpurea (LINN.).

Geographische Verbreitung: Nordamerika bis Zentralamerika; im Winter Brasilien, Cuba.

Anochotaenia macrocephala FUHRMANN.

Progne tapera (LINN.).

Geographische Verbreitung: Südamerika.

Anochotaenia macrocephala FUHRMANN.

Atticora fasciata (GM.).

Geographische Verbreitung: Guyana, Amazonia, Ecuador, Peru, Bolivia.

Anomotaenia undulatoides FUHRMANN.

Macrochires.**Trochilidae.***Eupetomena macrura* (GM.).

Geographische Verbreitung: Ost-Brasilien.

Anochotaenia trochili FUHRMANN.

1) s. vor. Seite Anm. 1.

Cypselidae.***Cypselus melba* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Süd-Europa, Nord-Afrika, Süd-Indien, Ceylon.

Anomotaenia cyathiformis (FRÖLICH)

Anomotaenia vesiculigera (KRABBE)

Anomotaenia depressa (v. SIEBOLD).

***Cypselus streubeli* (HARTL.).**

Geographische Verbreitung: Nordost-Afrika.

Anomotaenia depressa (v. SIEBOLD).

***Cypselus apus* (LINN.).**

Geographische Verbreitung: Europa; im Winter Afrika.

Anomotaenia cyathiformis (FRÖLICH)

Anomotaenia vesiculigera (KRABBE)

Anomotaenia depressa (v. SIEBOLD).

***Chaetura zonaris* (SHAW.).**

Geographische Verbreitung: Zentralamerika, Süd-Brasilien, Ecuador, Peru.

Anomotaenia cyathiformis (FRÖLICH).

***Cypseloides senex* (TEMM.).**

Geographische Verbreitung: Brasilien.

Anomotaenia cyathiformoides FUHRMANN

Anomotaenia paucitesticulata FUHRMANN.

Mniotiltidae.***Opornis formosa* (WELS.).**

Geographische Verbreitung: Vereinigte Staaten bis Zentralamerika; Cuba.

Taenia oporornis LEIDY.

Trogonidae.*Trogon surucura* VIEILL.

Geographische Verbreitung: Uruguay und Paraguay.

Anomotaenia brasiliensis FUHRMANN.

Alphabetisches Verzeichnis der Vogelgruppen.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Accipitres 11, 15, 142 | Lari 11, 13, 123 |
| Anseriformes 11, 15, 147 | Otidiformes 11, 12, 106 |
| Aptenodytiformes 11, 14, 135 | Passeriformes 11, 16 171 |
| Apterygiformes 11, 12, 99 | Phoenicopteri 11, 15, 141 |
| Casuariformes 11, 12, 99 | Pici 11, 16, 169 |
| Charadriiformes 11, 13, 107 | Podicipediformes 11, 14, 131 |
| Ciconiiformes 11, 14, 137 | Procellariiformes 11, 14, 133 |
| Coccygiformes 11, 15, 162 | Psittaciformes 11, 15, 159 |
| Columbiformes 11, 13, 128 | Ralliformes 11, 12, 105 |
| Coraciiformes 11, 16, 163 | Rheiformes 11, 12, 98 |
| Crypturiformes 11, 12, 99 | Steganopodes 11, 14, 136 |
| Galliformes 11, 12, 100 | Strigiformes 11, 16, 167 |
| Gruiformes 11, 12, 106 | Struthioniformes 11, 12, 98 |
-

**Alphabetisches Verzeichnis der Familien, Genera
und Arten sowie ihrer Synonyme.**

Die Synonyme und die zu streichenden Artnamen sind durch fetten Druck hervorgehoben.

- abbreviata*, **Taenia** 97
abortiva, *Hymenolepis* 78, 147
Acanthocirrus 29, 63
acanthorhynchus, *Tatria* 90, 131
Acoleinidae 29, 85
Acoleinae 13, 26, 31
Acoleus 29, 85, 26
acollum, *Anomotaenia* 58, 162
acotyhus, *Dioicocestus* 88, 131
acuminata, *Dioerchis* 81, 148, 7, 105
acuminata, ***Drepanidotaenia*** 81
acutissima, **Taenia** 76
aequabilis, *Hymenolepis* 76, 147
aequabilis, ***Dicranotaenia*** 76
aequabilis, **Taenia** 76
aegyptica, *Choanotaenia* 55, 107
aegyptica, **Taenia** 55
affinis, **Taenia** 58
agama, **Taenia** 44
alaudae, *Mesocestoides* 35, 171
alaudae, ***Amerina*** 70
alaudae, **Taenia** 70, 96
alba, *Aporina* 39, 159
alcae picae, **Taenia** 93
alcae tordae, **Taenia** 97
alternans, *Fuhrmannia* 59, 108
alternans, **Taenia** 59
ambigua, *Moniezia* 38, 159
Amabilia 29, 88, 15, 27
Amabilinidae 29, 88
Amabiliinae 27, 31
amadinae, **Taenia** 95
ambiguus, *Hymenolepis* 73, 106
Amerina 69
Amoebotaenia 27, 60, 28
amphigya, **Taenia** 94
amphitricha, *Hymenolepis* 74, 108
amphitricha, **Taenia** 74
Amphoterocotyle 33
anatina, *Davainea* 45, 147
anatina, *Hymenolepis* 77, 147, 105, 7
anatina, ***Dilepis*** 77
anatina, ***Drepanidotaenia*** 77,
anatina, **Taenia** 77
anatis maritae, **Taenia** 77
anatis β -lineata, **Taenia** 94
anatis tadornae, **Taenia** 94
Andrya 27, 28
Angularia 29, 62
angulata, *Dilepis* 52
angulata, ***Hymenolepis*** 79
angulata, **Taenia** 52, 79
angustata, *Paruterina* 67
Anomotaenia 28, 56, 13, 15, 16

- Anonchotaenia* 29, 69, 17
Anoplocephala 27, 28
anoplocephaloides, *Taenia* 94, 159
Anoplocephalidae 27, 36
Anoplocephalinae 27, 28, 36, 31
anseris, *Taenia* 76
anserum, *Taenia* 76
Aphanobothrium 88
Aploparaksis 29, 82, 13
Aporina 28, 38
appendiculata, *Tatria* 90, 131
apterycis, *Taenia* 92, 99
apterygis, *Choanotaenia* 54, 99
apterygis, ***Drepanidotaenia*** 54
arcticum*, *Notobothrium 91
arcticus, *Tetrabothrius* 35, 147
arcuata, *Hymenolepis* 78, 148
ardeae, *Hymenolepis* 75
argentina, *Taenia* 50
arionis, *Anomotaenia* 57, 107
arionis, *Choanotaenia* 57
arionis, *Taenia* 57
armata, *Hymenolepis* 75, 129
armatus*, *Acoelus 85, 86
armigera, *Taenia* 84
armillaris*, *Taenia 58
arquata, *Choanotaenia* 55, 108
aspera, *Dioicocestus* 7, 88, 131
aspera, *Taenia* 88
asymmetrica, *Choanotaenia* 56, 164
attenuata, *Dilepis* 53, 172
attenuata, *Taenia* 53
aurita, *Anomotaenia* 58, 137
aurita, *Taenia* 58
auriculatus*, *Tetrabothrius 34
australis, *Davainea* 43, 99
australis, *Taenia* 43
avicola, *Cittotaenia* 37, 146
avicola, *Dipylidium* 65, 142
avium*, *Taenia 65, 79
baeilligera, *Anomotaenia* 57, 107
baeilligera, *Taenia* 57
bairdii, *Taenia* 95, 148
baschkiriensis, *Hymenolepis* 74, 123
baschkiriensis, ***Drepanidotaenia***
 74
beauforti, *Moniezia* 38, 159
beema, *Angularia* 62, 172
Bertia 27, 28, 36, 25, 30
bilateralis, *Choanotaenia* 55, 131
bicoronata, *Dilepis* 52, 137
bilateralis, *Hymenolepis* 78, 148
bilharzii, *Hymenolepis* 80, 173
bilharzii, *Taenia* 80
Binterina 29, 67, 16
biuterinus, *Lateriporus* 53, 147
bifaria*, *Cotugnia 85
bifaria*, *Taenia 85
biremis, *Tatria* 89, 90, 131
birostrata, *Trichocephaloides* 54, 107
birulai, *Aploparaksis* 83, 148
bisaccata, *Hymenolepis* 78, 148
bobica, *Anonchotaenia* 71, 172
borealis, *Choanotaenia* 55, 147
borealis, *Aporina* 55
borealis, *Anomotaenia* 59, 172
borealis, *Taenia* 59
bothrioplitis*, *Taenia 44
bothrioplitis*, *Davainea 44
Bothriotaenia 33, 42
***brachium globulosum*,**
Taenia 84
brachyarthra, *Dilepis* 53
brachycephala, *Hymenolepis* 74
brachycephala, *Taenia* 74
brachyrhyncha, *Davainea* 44, 106
brachyrhyncha, *Taenia* 44
brachysoma, *Taenia* 84, 147
brachyphallos, *Aploparaksis* 82, 83, 108
brachyphallos, *Hymenolepis* 83
brachyphallos, *Taenia* 83
brasiliensis, *Hymenolepis* 78, 164
brasiliensis, *Anonchotaenia* 71, 173
brasiliensis, *Anomotaenia* 89, 172
brasiliensis, *Fuhrmannia* 59, 169
breviannulata, *Hymenolepis* 76, 137
brevicollis, *Amoebotaenia* 60, 108
brevicollis*, *Taenia 45
brevirostris, *Taenia* 94, 137
brevis, *Amoebotaenia* 60, 108
brevis, *Taenia* 60
brevis, *Anomotaenia* 59, 169, 172
brevis, *Choanotaenia* 59
brevis, *Gryocoelia* 87, 108
brevis, *Hymenolepis* 80, 173
Brochocephalus 86

- calcaria, Davainea* 45, 162
calva, Davainea 43
calva, Taenia 43
campanulata, Davainea 44, 100
campanulata, Binterina 68, 172
campanulata, Taenia 68
campanulata, Choanotaenia 54, 101
campanulatus, Tetrabothrius 34, 133
campanulatus, Prosthecocotyle 34
campylacantha, Anomotaenia 58, 122
campylacantha, Taenia 58
campylancristrota, Dilepis 52, 76, 137
campylancristrota, Taenia 52
candelabraria, Paruterina 67
candelabraria, Halysis 67
candelabraria, Taenia 67
cantaniana, Davainea 43, 100
cantaniana, Taenia 43
capillaris, Davainea 43, 99
capillaris, Hymenolepis 75, 131
capillaris, Taenia 75
capillaroides, Hymenolepis 75, 131
capitellata, Hymenolepis 75
capitellata, Drepanido-
taenia 75
capitellata, Dilepis 75
capitellata, Taenia 75
capito, Cyclustera 61, 137
capito, Taenia 61
caprimulgi, Taenia 95, 164
caprimulgorum, Hymenolepis 78, 164
caprimulgorum, Dilepis 52, 164
Capsodavainea 50, 42
caracina, Taenia 96, 173
carioca, Hymenolepis 73, 101
carioca, Davainea 73
caroli, Hymenolepis 76
caroli, Taenia 76
carrinoides, Moniezia 38, 159
carrinoides, Paronia 38
carrinoides, Paronia ex parte 38
catenatum, Aphano-
bothrium 88
cayenmense, Monopylidium 66, 108
cesticillus, Davainea 6, 43, 100
cesticillus, Taenia 43
chaotica, Taenia 55, 97
Chapmania 28, 50, 42
charadrii, Taenia 93
charadrii, Halysis 86
charadriihiaticulae, Taenia
 55
charadrii himantopodis,
Taenia 86
cheilancristrota, Acanthocirrus 63, 137
cheilancristrota var. brevis, Taenia 63, 64
cheilancristrota var. longi-
rostris, Taenia 63, 64
chlamydoderae, Taenia 96, 173
Choanotaenia 28, 54, 13, 27, 56
chrysaeti, Taenia 35
cingulata, Anomotaenia 57, 107
cingulata, Dilepis 57
cinguliferum, Monopylidium 66, 108
cinguliferum, Taenia 66
circumvallata, Davainea 43, 100
circumvallata, Taenia 43
circumcincta, Davainea 45, 137
circumcincta, Taenia 45
cirrosa, Aploparaksis 83, 123
cirrosa, Monorchis 83
cirrosa, Taenia 83
citrus, Anomotaenia 57, 107
citrus, Choanotaenia 57
citrus, Taenia 57
Cittotaenia 28, 37, 25, 27, 30
Cladotaenia 29
clandestina, Hymenolepis 74, 108
clandestina, Taenia 74
clausa, Hymenolepis 78¹⁾, 148
clausa, Skorikovia 82, 83
clava, Anochotaenia 70
clavata, Taenia 71
clavigera, Anomotaenia 57, 107
clavigera, Taenia 57
clavulus, Binterina 68, 172
clavulus, Taenia 68
coccothraustis, Taenia 96
Coelodera 37
collari nigro, Taenia 77
collaris, Hymenolepis 77, 147

1) s. Berichtigungen.

- collaris*, **Taenia** 77
colliculorum, **Taenia** 96, 173
collini, *Cotugnia* 48, 99
columba, *Moniezia* 38, 128
columbae, *Davainea* 45, 128
columbae, **Alyselminthus** 74
columbae, *Davainea* 44
columbae, **Halysis** 74
columbae, **Taenia** 44
columbae, *Dipylidium* 65, 129
colymbi cornuti, **Taenia** 75
colymbi cristati, **Taenia** 75
compacta, *Davainea* 6, 46, 171
compressa, *Hymenolepis* 77, 148
compressa, **Taenia** 77
conardi, **Taenia** 73
conica, *Anonchotaenia* 70, 169
conica, **Taenia** 94, 148
conoidea, **Taenia** 65
constricta, *Anomotaenia* 58, 172
constricta, **Drepanidotaenia** 59
constricta, **Taenia** 58
constricta, **Taenia** 79
Copesoma 30, 27
Copesominae 30, 27
coraciae, *Hymenolepis* 95
coraciae, **Taenia** 95
cornicis, **Halysis** 79
coronata, *Choanotaenia* 55, 107
coronata, **Taenia** 55
coronata, **Taenia** 93, 108
coronina, **Taenia** 58
coronula, *Hymenolepis* 77, 147
coronula, **Dicranotaenia** 77
coronula, **Taenia** 77
corvi cornicis, **Taenia** 79
corvi frugilegi, **Taenia** 79
corvina, *Davainea* 46, 171
corrorum, **Taenia** 79
Cotugnia 28, 48, 27, 31
crassa, *Cotugnia* 48, 101
crassa, *Culcitella* 69, 142
crassirostrata, *Dilepis* 52, 137
crassirostris, *Aploparaksis* 82, 108
crassirostris, **Monorchis** 82
crassirostris, **Dicranotaenia** 82
crassirostris, **Taenia** 82
crassilestata, *Choanotaenia* 56, 169
crassula, *Davainea* 44, 6, 74, 128
crassula, **Taenia** 44
crassus, *Acoelus* 86, 108
crateriforme, *Monopyliidium* 16, 7, 66, 169
crateriformis, **Taenia** 66, 46, 56
crateriformis, **Halysis** 66
crenata, **Taenia** 46, 56, 66
crenata, **Halysis** 76
crenatus, **Alyselminthus** 76
crenulata, **Taenia** 84
creplini, *Hymenolepis* 77, 147
creplini, **Dicranotaenia** 77
creplini, **Taenia** 77
cruciata, *Davainea* 46, 169, 56, 66
cruciata, **Taenia** 46
cryptacantha, *Davainea* 45, 128
cryptacantha, **Taenia** 93, 109
crypturi, *Davainea* 43, 99
Culcitella 29, 68, 15
cuneata, *Anoebotaenia* 60, 101
cuneata, **Taenia** 65
cyathiformis, *Anomotaenia* 17, 58, 172
cyathiformis, **Drepanidotaenia** 58
cyathiformis, **Taenia** 58
cyathiformoides, *Anomotaenia* 59, 172
cyclocephala, **Taenia** 95, 162
Cyclorehida 29, 63
Cyclustera 28, 61, 15
cylindrica, *Biuterina* 173
cylindrica, *Dilepis*? 52, 123
cylindrica, **Taenia** 94, 148
cylindracca, **Taenia** 84, 142
cylindraceus, *Tetrabothrius* 33, 123, 5, 6
cylindracea, **Prosthocotyle** 33
cylindraceus, **Bothriocephalus** 33
dahurica, *Hymenolepis* 80, 173
dahurica, **Taenia** 80
Davainea 28, 42, 12, 13, 27, 15, 16, 30, 31
Davaineidae 28, 40, 13
Davaineinae 28, 41, 12, 13, 14, 27, 31
dehiscens, *Anomotaenia* 59, 172
dehiscens, **Taenia** 59
delafondi, *Bertia* 36, 128
delafondi, **Taenia** 36
dendrocolaptis, **Taenia** 96

- dentatus*, *Hymenolepis* 73
depressa, *Anomotaenia* 59, 172
depressa, **Taenia** 17, 59
destituata, *Taenia* 95, 148
diaphana, *Taenia* 84, 123
diaphoracantha, *Taenia* 84, 135
difformis, *Davainea* 45, 162
difformis, **Taenia** 45
digonopora, *Cotugnia* 48, 100
digonopora, **Taenia** 48
Dilepininae 31, 51
Dilepinidae 28, 51, 12, 13, 31
Dilepis 28, 51, 13, 14, 27, 30, 56, 72
diminuens, *Aploparaksis* 83, 108
Diococestus 29, 14, 15, 26, 87
diomedaeae, *Tetrabothrius* 34, 133
diomedaeae, *Prosthecocotyle* 34
diomedeae, **Taenia** 34
Diorchis 29, 81
Diplacanthus 72, 82
Diplochetos 56
Diplophallus 29, 87
Diploposthe 29, 85, 26
Dipylidiinae 29, 64, 27, 31
Dipylidium 29, 64, 27, 30
discoidea, *Anomotaenia* 58, 75, 137
discoidea, **Taenia** 58
distincta, *Bütererina* 68, 172
distincta, *Taenia* 93, 123
dodecantha, *Choanotaenia* 55, 123
dodecantha, **Taenia** 55
Drepanidotaenia 27, 54, 72, 82
dujardini, *Aploparaksis* 83, 173
dujardini, **Taenia** 83
echinata, *Taenia* 92, 101
echinobothrida, *Davainea* 44, 100
echinobothridi, **Taenia** 44
Echinocotyle 80, 29, 27, 31
echinocotyle, *Hymenolepis* 78, 148
elegans, *Amphoterocotyle* 34
elongata, *Davainea* 43, 99
elongata, *Hymenolepis* 76, 137
emberizarum, **Taenia** 96
embryo, *Choanotaenia* 55, 107
embryo, **Taenia** 55
Epision 90
ericetorum, *Anomotaenia* 57, 107
ericetorum, **Taenia** 57
crostris, *Tetrabothrius* 5, 6, 33, 123
crostris, *Prosthecocotyle* 33
crostris, *Bothriotaenia* 33
crostris var. *eudypitidis*,
Bothriotaenia 34
crostris var. *minor*, *Bothriotaenia* 34
eudypitides, *Tetrabothrius* 34, 135
eudypitides, *Prosthecocotyle* 34
eurycephala, **Taenia** 97
exarticulata, **Taenia** 97
exigua, *Taenia* 96, 173
exilis, *Hymenolepis* 73, 101
exilis, **Taenia** 73
fallax, *Hymenolepis* 77, 147
fallax, *Lepidotrius* 77
fallax, **Taenia** 77
farciminalis, **Taenia** 79
farciminalis, *Diplacanthus*
79, 80
farciminosa, *Hymenolepis* 79, 173
farciminosa, **Taenia** 79
fasciata, *Hymenolepis* 76, 147
fasciata, *Drepanidotaenia* 76
fasciata, *Dilepis* 76
fasciata, **Taenia** 76
fasciolaris, *Fimbriaria* 95, 148, 9,
90, 91, 101
fasciolaris, **Taenia** 91
filiformis, **Taenia** 45, 94, 162, 6
filirostris, *Hymenolepis* 76, 137
filirostris, **Taenia** 76
filirostris, **Taenia** 97
filum, *Aploparaksis* 9, 82, 108
filum, *Monorchis* 82
filum, *Hymenolepis* 82
filum, *Diplacanthus* 82
filum, *Monopylidium* 82
filum, *Halysis* 82
filum, **Taenia** 82
filum var. *pseudofilum*, *Aploparaksis*
82, 108
filum var. *polybori*, **Taenia** 82
Fimbriaria 29, 90
Fimbriariidae 29, 90, 27
fimbriata, **Taenia** 73
flagellata, *Hymenolepis* 78, 148
flagellum, *Idiogenes* 49, 142

- flagellum*, **Halysis** 49
flavescens, *Taenia* 95 ¹⁾, 148
fragilis, *Hymenolepis* 77, 147
fragilis, **Taenia** 77
friedbergi, *Davainea* 44, 100
friedbergi, **Taenia** 44
fringillarum, *Hymenolepis* 79, 9, 95, 173
fringillarum, **Aploparaksis** 79
fringillarum, **Taenia** 79
früsiiana, *Taenia* 93, 108
frontina, *Davainea* 46, 169, 6, 16
frontina, **Taenia** 46
frustuleum, **Taenia** 97
Fuhrmannia 28, 59
fuhmanni, *Cyclostera* 61, 137
fulicae, **Taenia** 81
furcifera, *Hymenolepis* 75, 131
furcifera, **Dilepis** 75
furcifera, **Taenia** 75
furcigera, *Aploparaksis* 83, 94, 148
furcigera, **Dicranotaenia** 83
furcigera, **Taenia** 83
fuscus, *Hymenolepis* 74, 82, 123
fuscus, **Taenia** 74
galbulae, *Choanotaenia* 54, 56, 171
galbulae, **Taenia** 56
galbulae, **Halysis** 79
galli domestici, **Taenia** 97
gallinaginis, **Taenia** 93
gallinula, *Taenia* 92, 105
gallinulae, *Taenia* 92
gennaria, **Taenia** 55
glandarii, **Halysis** 79
glandularis *Anomotaenia* 58, 137
globata, *Anomotaenia* 70, 172
globata, **Taenia** 70
globifera, **Cladotaenia** 84
globifera, **Halysis** 84
globifera, **Taenia** 84
globirostris, *Davainea* 44, 100
globocaudata, *Davainea* 44, 100
globocephala, *Davainea* 46, 171
globosa, *Bütererina* 68, 172
globulosa, **Taenia** 84
globulus, *Anomotaenia* 57, 107
globulus, **Choanotaenia** 57
globulus, **Taenia** 57
gongyla, *Choanotaenia* 54, 55, 123
goura, *Davainea* 45, 129
gracilis, *Hymenolepis* 77, 147
gracilis, **Drepanidotaenia** 77
gracilis, **Dilepis** 77
gracilis, **Halysis** 77
gracilis, **Taenia** 77
grandiporus, *Idiogenes* 49
groenlandica, *Hymenolepis* 77, 147
groenlandica, **Taenia** 77
guevillensis, *Davainea* 44
guevillensis, **Taenia** 44
gutturosa, **Taenia** 58, 97
Gyrococlia 29, 86, 26
haematopodis ostralegi,
Taenia 97
hemignathi, *Hymenolepis* 80, 173
hertwigi, *Davainea* 45
heteracantha, *Taenia* 84, 152
heteroclitus, *Tetrabothrius* 34, 133
heteroclita, **Prostherocotyle** 34
heterosoma, **Taenia** 34
himantopodis, *Hymenolepis* 74, 108
himantopodis, **Taenia** 74
himantopodis melanopteri,
Taenia 86
hirsuta, *Aploparaksis* 82, 108
hirsuta, **Monorchis** 82
hirsuta, **Taenia** 82
hirundina, *Anomotaenia* 59, 172
hirundinis urticae, **Taenia**
58
hoplites, *Dilepis* 52, 137
hoplites, **Taenia** 52
horridus, *Idiogenes* 49, 106
Hymenolepinidae 29, 71, 13, 15
Hymenolepis 29, 72, 12, 13, 14, 15,
16, 27, 30, 31
juncea, **Prostherocotyle** 35
junceus, *Tetrabothrius* 35, 142
Idiogenes 28, 49, 12, 27, 31
Idiogeninae, 28, 48, 31
imbutiformis, **Mesocestoides**
94

1) s. Berichtigungen.

- imbutiformis*, *Taenia* 94
inaequalis, *Cotugnia* 48, 128
increscens, *Taenia* 93, 109
inermis, *Amerina* 70, 71
inermis, *Metroliasthes* 71
inermis, *Shipleya* 87, 108
inermis, *Trichocephaloides* 53
innominata, *Taenia* 96
inflata, *Diorchis* 81, 105
inflata, *Dilepis* 81
inflata, *Drepanidotaenia* 81
inflata, *Hymenolepis* 81
inflata, *Taenia* 81, 92
infundibuliformis, *Alyselminthus* 65
infundibuliformis, *Choanotaenia* 65
infundibuliformis, *Drepanidotaenia* 65
infundibuliformis, *Halysis* 65
infundibuliformis, *Monopygidium* 6
infundibuliformis, *Taenia* 43, 54, 65
infundibuliformis var. *phasianorum*, *Taenia* 44
infundibulum, *Monopygidium* 6, 65, 101
infundibulum, *Choanotaenia* 54, 65
infundibulum, *Taenia* 54, 65
insignis, *Davainea* 45, 128
insignis, *Taenia* 45
insignis, *Ophryocotyle* 41, 107
intermedia, *Choanotaenia* 55, 107
intermedius, *Hymenolepis* 78, 162
intermedius, *Tetrabothrius* 34, 133
intermedia, *Prostheocotyle* 34
interrupta, *Hymenolepis* 74, 108
interrupta, *Taenia* 74
interruptus, *Hymenolepis* 80, 173
intricata, *Taenia* 95, 164
isacantha, *Anomotaenia* 59, 172
ischnorhyncha, *Leptotaenia* 60
ischnorhyncha, *Amoebotaenia* 60
ischnorhyncha, *Taenia* 60
inversa, *Choanotaenia* 55, 123
inversa, *Taenia* 55
krabbei, *Taenia* 84, 147
kuvaria, *Cittotaenia* 37, 128
kuvaria, *Coelodola* 37
lacazei *Ophryocotyle* 41
laevigata, *Choanotaenia* 65, 107
laevigata, *Taenia* 55
laevis, *Diploposthe* 85, 148
laevis, *Halysis* 85
laevis, *Taenia* 85
lagenicollis, *Taenia* 66
lamelligera, *Amabilia* 88
lamelligera, *Taenia* 88
lanceolata, *Hymenolepis* 76, 4, 7, 147
lanceolata, *Drepanidotaenia* 77
lanceolata, *Dilepis* 77
lanceolata, *Halysis* 77
lanceolata, *Taenia* 76
lanceolata, *Taenia* 88
lari cani, *Taenia* 93
larina, *Anomotaenia* 58, 123
larina, *Taenia* 58
lata, *Polycoelia* 47, 100
lata, *Linstowia* 47, 24
Lateriporus 28, 53
Laterotaenia 28, 61, 15
Lepidotrias 72
leptacantha, *Davainea* 44, 100
leptodera, *Taenia* 79
leptoptili, *Hymenolepis* 76, 137
leptoptili, *Taenia* 76
leptosoma, *Davainea* 20, 45, 159
leptosoma, *Taenia* 45
Leptotaenia 28, 59, 15
leuce, *Gyrocoelia* 86, 108
leuckarti, *Taenia* 94, 137
Liga 28, 60
liguloides, *Hymenolepis* 76
liguloides, *Drepanidotaenia* 76
liguloides, *Dilepis* 76
liguloides, *Halysis* 76
liguloides, *Taenia* 76
limosa, *Dilepis* 52, 107
linea *Hymenolepis* 73, 101
linea, *Halysis* 73
linea, *Alyselminthus* 73
linea, *Taenia* 73
lineata, *Taenia* 83, 94

- linstowii*, *Zschokkea* 40, 100
linstowii, ***Linstowia*** 40
linstowii, ***Hymenolepis*** 40
linstowii, ***Taenia*** 40, 48
Linstowia 27, 28
Linstowinae 28, 39, 31
liophallos, ***Hymenolepis*** 77, 147
liophallus, ***Taenia*** 77
lobata, *Biuterina* 68, 164
lobata, ***Hymenolepis*** 78, 148
lobata, *Proorchida* 62, 137
lobatum, *Tetrabothrius* 34
longiceps, *Biuterina* 68, 147, 172
longiceps, ***Taenia*** 68
longicirrosa, *Chapmania* 50
longicirrosa, ***Hymenolepis*** 78, 148
longicollis, *Davainea*? 43, 100
longicollis, ***Bothriotaenia*** 42, 43
longiorata, *Anonchotaenia* 70, 71, 7, 137, 173
longiorata, ***Amerina*** 70
longirostris, ***Hymenolepis*** 94, 74, 108
longirostris, ***Taenia*** 83
longispiculus, *Acoelus* 86, 105
longispicula, ***Bothriotaenia*** 86
longispina, *Davainea* 46, 169
longissima, *Davainea*? 48, 159
longissima, ***Taenia*** 45, 94, 6
longissima, ***Taenia*** 95
longivaginata, ***Hymenolepis*** 78, 148
loxiae, ***Halysis*** 96
loxiae curvirostrae, ***Taenia*** 96
lucida, *Metroliasthes* 69, 101
lutzii, *Tetrabothrius* 34, 135
lutzi, *Davainea* 46, 169
macracantha, *Choanotaenia* 56, 172
macracantha, *Anomotaenia* 57, 107
macracantha, ***Taenia*** 95, 148
macracanthoides, *Anomotaenia* 57, 107
macracanthos, ***Hymenolepis*** 78, 147
macracanthos, ***Taenia*** 78
macracanthum, *Monopylidium* 66, 108
macrocephala, *Anonchotaenia* 71, 173
macrocephala, ***Dilepis*** 51, 106
macrocephala, ***Taenia*** 97
macrocephalus, *Tetrabothrius* 33, 58, 14, 107, 131
macrocephala, ***Prosthecoctyle*** 34
macrocephalus, ***Bothriocephalus*** 33, 34
macrocirrosa, *Davainea* 45, 162
macropeus, *Acanthocirrus* 63, 137
macropeus, ***Dilepis*** 63, 64
macropeus, ***Dilepis*** 63, 64
macrorhyncha, *Schistotaenia* 89, 131
macrorhyncha, ***Taenia*** 89, 75
macrorhyncha, ***Amabilia*** 89
macrorhyncha, ***Drepanidotaenia*** 89
macrorhyncha, ***Amoebotaenia*** 90
macrostratus, *Acanthocirrus* 63, 64, 172
macroscolecina, *Davainea* 45, 159
macroscolecina, *Tetracysticotyla* 91, 92, 137
maculata, ***Taenia*** 79
magnicoronata, *Davainea* 46, 163
malleus, *Fimbriaria* 91
malleus, ***Alyselminthus*** 91
malleus, ***Halysis*** 91
malleus, ***Taenia*** 91
marchali, *Monopylidium* 66, 105
marchali, ***Taenia*** 66
marchii, ***Taenia*** 66
margaritifera, ***Taenia*** 35
mastigodes, ***Taenia*** 97
mastigophora, *Idiogenes* 49
mastigophora, ***Taenia*** 49
medici, ***Hymenolepis*** 75, 136
medici, ***Taenia*** 75
megacantha, *Choanotaenia* 55, 164
megacantha, ***Taenia*** 55
megaloptera, ***Hymenolepis*** 77
megalcephala, *Trichocephaloides* 53, 107
megalcephala, ***Taenia*** 53
megalops, ***Hymenolepis*** 77, 147
megalops, ***Taenia*** 77, 97
megalorchis, ***Hymenolepis*** 76
megalorchis, ***Dilepis*** 76
megalorhyncha, ***Taenia*** 93, 109
meleagris, ***Hymenolepis*** 73, 101
meleagris, ***Drepanidotaenia*** 73
meropina, *Biuterina* 68, 164
meropina, *Biuterina* 68

- meropina*, **Taenia** 68
meropina var. *macrankistota*, *Biuterina* 68, 164
Mesocestoides 27, 35, 26, 30, 31
Mesocestoididae 27, 35
Mesocestoidinae 26
Metroliaesthes 29, 69
micracantha, *Anomotaenia* 8, 58¹⁾, 123
micracantha, **Taenia** 57
micracantha, *Davainea* 45, 128
micraneristota, *Hymenolepis* 77, 147
micraneristota, **Taenia** 77
microcephala, *Hymenolepis* 75, 137
microcephala, **Taenia** 75
microphallos, *Anomotaenia* 57, 107
microphallos, **Choanotaenia** 57
microphallos, **Taenia** 57
microps, *Hymenolepis* 73, 101
microps, **Taenia** 73
microsoma, *Hymenolepis* 77, 8, 74, 123, 147
microsoma, **Taenia** 77, 74
microrhyncha, *Anomotaenia* 56, 57, 107
microrhyncha, **Taenia** 56, 57
microscolecina, *Davainea* 45, 159
microscolecina, *Hymenolepis* 80, 173
microscopica, **Taenia** 94
minuta, *Anomotaenia* 56, 99
minuta, **Drepanidotaenia** 56
minuta, *Davainea* 44, 107
minuta, *Hymenolepis* 74, 108
minuta, **Taenia** 74, 75
mitra, *Fimbriaria* 91
modiglianii, *Dilepis* 53, 172
modiglianii, **Hymenolepis** 53
modiglianii, **Taenia** 53
mollis, *Anomotaenia* 58, 142
mollis, **Taenia** 58
Moniczia 28, 37, 25, 27, 30
Monopylidium 29, 65, 13, 27, 54
Monorchis 82
monticelli, *Tetrabothrius* 34, 133
monticelli, **Prostheocotyle** 34
moschata, **Taenia** 94, 148
motacilla, *Biuterina* 68, 172
motacilla cayanae, **Taenia** 96, 173
motacilla brasiliensis, **Taenia** 96, 173
motacilla provincialis, **Taenia** 96, 173
multiformis, **Hymenolepis** 75, 58
multiformis, **Anomotaenia** 75
multiformis, **Taenia** 75
nullistriata, *Hymenolepis* 75, 131
nullistriata, **Dicranotaenia** 75
nullistriata, **Taenia** 75, 64
muricata, **Taenia** 97
muscapae, **Taenia** 96, 173
musculosa, *Hymenolepis* 73, 101
musculosum, *Monopylidium* 65, 66, 54, 79, 172
musculosa, **Davainea**? 66
mutabilis, *Anomotaenia* 58, 162
mutabilis, **Taenia** 58
mutabilis, *Davainea* 44, 100
naja, *Hymenolepis* 79, 173
naja, **Taenia** 79
nasuta, *Dilepis*? 52, 137
nasuta, **Taenia** 95
nattereri, *Laterotaenia* 62, 142
nattereri, *Laterotaenia* 62
Nematotaenia 27, 29
nigropunctata, *Rhabdometra* 69, 92, 101
nigropunctata, **Taenia** 69
nilotica, **Taenia** 93, 108
nitida, *Hymenolepis* (*Echinocotyle*) 74, 81, 108
nitida, **Echinocotyle** 74
nitida, **Taenia** 74, 81
nitidulans, *Hymenolepis* (*Echinocotyle*) 74, 81, 108
nitidulans, **Echinocotyle** 74
nitidulans, **Taenia** 74, 81
nitzschi, **Taenia** 97
nodosa, **Taenia** 79
Notobothrium 90
novae-hollandiae, *Dioicocestus*? 88, 131
novae-hollandiae, **Taenia** 88
nymphaea, *Anomotaenia* 57, 107
nymphaea, **Halysis** 57
nymphaea, **Taenia** 57

1) s. Berichtigungen.

- nymphoides*, *Dilepis* 51, 107
obrelata, *Taenia* 93, 128
occlusa, *Diorchis* 76
octacantha, *Hymenolepis* 77, 147
octacantha, ***Drepanidotaenia*** 77
octacantha, *Taenia* 77
octacanthoides, *Hymenolepis* 74, 128
octacantha, ***Drepanidotaenia*** 74
odiosa, *Taenia* 92, 101
oligocantha, *Davainea* 43, 99
oligotoma, *Taenia* 55, 93, 97
oligophora, *Davainea* 43
oligorchida, *Dilepis* 52, 142
Oligorchis 29, 71, 15
omalancristrota, *Cyloorchida* 63, 137
omalancristrota, *Taenia* 63
Oochoristica 29, 25, 27
Ophryocotylinae 31, 40
Ophryocotyle 28, 40, 12, 13, 27, 31
oporornis, *Taenia* 96, 173
orientalis, *Hymenolepis* 80, 173
orientalis, *Taenia* 80
orioli galbuli, *Taenia* 56, 79
oriolina, *Anonchotaenia* 71, 173
orthacantha, *Hymenolepis* 78, 48
otidis, *Idiogenes* 6, 49, 106
otidis, *Taenia* 73
ovolaciniata, *Anomotaenia* 59, 172
ovolaciniata, *Taenia* 59
pachycephala, *Hymenolepis* 78, 147
pachycephala, *Taenia* 78
Panceria 29, 27
papilla, *Taenia* 94, 137
papilla, ***Drepanidotaenia*** 94
papillata, *Hymenolepis* 78, 148
papillifera, *Dilepis* 52, 137
papillosum, *Copesoma* 91, 108
paradisea, *Davainea* 46, 171
paradisea, *Biuterina* 68
paradoxa, *Choanotaenia* 55, 107
paradoxa, ***Drepanidotaenia*** 55
paradoxa, *Taenia* 55, 74
paradoxa, *Taenia* 93, 131
paradoxa, *Gyrococelia* 87, 108
paradoxus, ***Brochocephalus*** 87
parallelepipedata, *Paruterina* 67, 172
parallelepipedata, ***Drepanidotaenia*** 67
parallelepipedata, *Taenia* 67
parechinobothrida, *Davainea* 44, 100
pari, ***Alyselminthus*** 95
pari, ***Halysis*** 95
parina, *Choanotaenia* 56, 172
parina, ***Drepanidotaenia*** 56
parina, *Taenia* 56
parina, *Hymenolepis* 80, 173
Paronia 37
paronai, *Dioicocestus* 87, 88, 137
Paruterina 29, 67
Paruterinae 29, 66, 31
parviceps, *Diorchis* 81, 148
parviceps, *Hymenolepis* 81
parvirostellata, *Hymenolepis* 78, 164
parvirostellata, ***Drepanidotaenia*** 78
parvirostris, *Choanotaenia* 56, 172
parvirostris, *Taenia* 56
Parvirostrum 28, 61
parvula, *Hymenolepis* 78, 148
passerina, *Biuterina* 68, 173
passerina, *Hymenolepis* 172
passerinum, *Monopylidium* 66, 172
passeris, ***Halysis*** 79
passeris, *Taenia* 79
pauciannulata, *Choanotaenia* 56, 164
pauciovata, *Hymenolepis* 72, 99
paucitesticulata, *Davainea* 45, 129
paucitesticulata, *Anomotaenia*? 59, 172
pediformis, *Taenia* 95, 148
pediformis, *Taenia* 91
pelecani, *Tetrabothrius* 34, 136
pelecani, ***Prosthecotyle*** 34
pellucida, *Hymenolepis* 80, 173
penelopina, *Davainea* 44, 100
penetrans, *Aploparaksis* 83, 108
penetrans, ***Monorchis*** 83
penicillata, *Anomotaenia* 59, 172
perdicis saxatilis, *Tetrathyridium* 92, 101
perlata, ***Halysis*** 35
perlatus, *Mesocostoides* 35, 142
perlatus, *Taenia* 35
perverse, *Gyrococelia* 86, 108

- pestifera*, *Taenia* 96, 173
petrocinclae, *Hymenolepis* 80, 173
petrocinclae, *Taenia* 80
***pseudofilum*, *Monorchis* 82**
phasianina, *Hymenolepis* 73, 101
***pici*, *Taenia* 95**
pigmentata, *Hymenolepis* 77, 147
pigmentata, *Taenia* 77
pinguis, *Berti* 36, 163
pinleri, *Davainca* 44, 100
plana, *Fimbriaria* 91, 148
***planiceps*, *Taenia* 96**
planirostris, *Biuterina*? 68, 172
planirostris, *Taenia* 68
platycephala, *Taenia* 95, 173
platyrhyncha, *Anomotaenia* 57, 107
platyrhyncha, *Taenia* 57
***plicatus*, *Epision* 91**
***pluriuncinata*, *Davainca* 43**
poculifera, *Hymenolepis* 73, 105
poculifera, *Taenia* 73
podicipina, *Hymenolepis* 75, 131
polyacantha, *Cotugnia* 48, 129
polyartha, *Taenia* 96, 173
***polycalcaria*, *Davainca* 46**
Polycoelia 28, 47
polygramma, *Hymenolepis* 80, 173
polygramma, *Taenia* 80
polymorphus, *Diplohallus* 87, 108
polymorpha, *Gyrocotyle* 87
polymorphus, *Taenia* 87
polyuterina, *Davainca* 44, 100
porosa, *Choanotaenia* 54, 55, 123
porosa, ***Drepanidotaenia* 55**
porosa, *Taenia* 55
porrigens, *Tetrabothrius* 35, 5, 134
porrigens, ***Prostheocotyle* 35**
praecox, *Taenia* 96, 173
***previceps*, *Taenia* 71**
producta, *Choanotaenia* 56, 169
producta, *Taenia* 56
proglottina, *Davainca* 43, 100
proglottina, *Taenia* 43
proglottina var. *dublanensis*, *Davainca* 43, 100
Proorchida 29, 62
propeteres, *Lateriporus* 53, 147
proteus, *Ophrycotyle* 40, 41, 9, 107, 123
***Prostheocotyle* 33**
pseudofilum, ***Monorchis* 82**
psittacea, *Cittotaenia* 37, 159
***psittaci*, *Taenia* 94**
***pubescens*, *Taenia* 82¹⁾**
puncta, *Anomotaenia* 58
puncta, *Taenia* 58
punctata, *Liga* 60, 61, 169
purpurata, *Taenia* 96, 173
***pusilla*, *Taenia* 79**
***pustulum*, *Taenia* 59**
***pyramidalis*, *Hymenolepis* 53**
pyramidalis, *Taenia* 96, 173
pyramidalis, ***Hymenolepis* 96**
***pyramidalis*, *Taenia* 96**
pyramidata, *Taenia* 96, 173
pyriformis, *Anomotaenia* 57, 92, 105
pyriformis, *Taenia* 57
quadrata, *Anomotaenia* 58, 172
quadrata, *Taenia* 58
***ralli*, *Taenia* 92**
***ralli*, *Halysis* 92**
rapacicola, *Culeitella* 69, 142
recapta, *Dilepis* 52, 107
rectacantha, *Hymenolepis* 74, 108
rectangula, *Biuterina* 68, 164
recurvirostrae, *Hymenolepis* 74
recurvirostrae, *Taenia* 74
reticulatum, *Parvirostrum* 61, 172
retirostris, *Dilepis* 51, 107
retirostris, *Taenia* 51
retracta, *Hymenolepis* 78, 148
retusa, *Davainca* 44, 100
Rhabdometra 29, 69
rhae, *Cittotaenia* 37, 98
***rhomboidea*, *Aploporaksis* 83, 94**

1) KRABBE 1882 zeichnet unter dem Namen *T. hirsuta* eine *Taenia*, welche er im Text derselben Arbeit *T. pubescens* nennt. Letzteres Synonym ist S. 82 anzugeben vergessen worden.

- rhomboidea*, *Taenia* 83
rhynchopis, *Choanotaenia* 55, 123
rosseteri, *Hymenolepis* (*Echinocotyle*)
 78, 81, 148
rosseteri, *Echinocotyle* 78, 80
rosseteri, *Taenia* 81
rostellatum, *Monopylidium* 66, 108
rostellata, *Hymenolepis* 75, 131
rostellata, *Halysis* 75
rostellata, *Taenia* 75
rudolphiana, *Taenia* 71
rugosa, *Taenia* 93, 108
rugosus, *Hymenolepis* 75, 129
sagitta, *Hymenolepis* 78, 148
sagitta, *Drepanidotaenia* 78
Schistotaenia 29, 89, 14
Schizotaenia 28
scolecina, *Dilepis* 52, 136
scolecina, *Taenia* 52
scolopacis, *Taenia* 93
scolopendra, *Schistotaenia* 89
scolopendra, *Tatria* 89
scolopendra, *Taenia* 89
secundum, *Monopylidium* 66, 108
septaria, *Hymenolepis* 78, 164
serpentata, *Diorchis* 83
serpentiformis, *Taenia* 79
serpentiformis, *Taenia* 57, 79
serpentiformis turturis,
Taenia 74
serpentiformis collaris,
Taenia 79
serpentulus, *Hymenolepis* 79, 173, 9, 17
serpentulus, *Diplacanthus* 79
serpentulus, *Alyselminthus* 79
serpentulus, *Choanotaenia* 54
serpentulus, *Choanotaenia*
 56
serpentulus, *Halysis* 79
serpentulus, *Taenia* 79
serpentulus, *Taenia* 52, 56, 79
scerrata, *Hymenolepis* 75, 129
serrata, *Taenia* 65
setigera, *Hymenolepis* 76, 147
setigera, *Drepanidotaenia* 76
setigera, *Dilepis* 76
setigera, *Halysis* 76
setigera, *Taenia* 76
setigerus, *Alyselminthus* 76
Shipleya 29, 87
sibirica, *Hymenolepis* 78, 147
sibirica, *Diorchis* 78
silicula, *Taenia* 93
silicula, *Halysis* 93
simpla, *Taenia* 95, 164
simplex, *Hymenolepis* 78, 148
sinuosa, *Hymenolepis* 77
sinuosa, *Drepanidotaenia* 77
sinuosa, *Dilepis* 77
sinuosa, *Halysis* 77
sinuosa, *Alyselminthus* 77
sinuosa, *Taenia* 77, 83
Skorikowia 82
slesvicensis, *Choanotaenia* 55, 107
slesvicensis, *Taenia* 55
socialis, *Anomotaenia* 58, 123
socialis, *Taenia* 58
sp., *Ophryocotyle* 147
sp., *Taenia* 73
sphaerooides, *Davainea* 45, 142
sphaerophora, *Hymenolepis* 74, 93, 108
sphaerophora, *Taenia* 74
sphenocephala, *Hymenolepis* 74, 129
sphenocephala, *Taenia* 74
sphenocephala, *Taenia* 36
sphenooides, *Amoebotaenia* 60
sphenooides, *Dicranotaenia*
 60
sphenooides, *Taenia* 60
spiculigera, *Taenia* 92, 97
spiculigera, *var. varsovien-*
sis, *Taenia* 92
spinosa, *Hymenolepis* 74, 108
spinossissima, *Davainea* 45, 171
spinossissima, *Taenia* 46
spinosus, *Lateriporus* 53, 54, 137
stellifera, *Choanotaenia* 55, 107
stellifera, *Hymenolepis* 55
stellifera, *Taenia* 55
stentorea, *Anomotaenia* 57, 107
stentorea, *Taenia* 57
stercoreus, *Globus* 65
sternae, *Taenia* 33
sternae dougalli, *Taenia* 97
sternae hirundinis, *Taenia*
 93

- sternina*, *Choanotaenia* 55, 123
sternina, **Taenia** 55
strangulatus, *Oligorchis* 71, 72, 142
striata, **Taenia** 97
strigis, **Taenia** 67
strigis acadiae, *Taenia* 95
Stlesia 27, 28
struthionis, *Davainea* 43, 6, 19, 25, 98
struthionis, **Taenia** 43
sturni, **Taenia** 79
styloides, *Hymenolepis* 74, 108
stylosa, *Hymenolepis* 79, 173
stylosa, **Taenia** 79
stylosus, *Diplacanthus* 79
sulae fuscae, **Taenia** 34
su generis, *Diploposthe* 85
sulciceps, *Tetrabothrius* 34
sulciceps, **Hymenolepis** 34
Taenia 29, 84, 27, 32, 82
Taeniinae 27
Taeniidae 26, 29, 83
tapika, *Chapmania* 50, 106
tapika, *Idiogenes* 50
tardae, **Taenia** 73
Tatria 29
Tatria 89, 14
tauricollis, *Chapmania* 50, 98
tauricollis, *Idiogenes* 50
tauricollis, *Davainea* 42, 50
tauricollis, **Taenia** 42, 50
tenerrima, *Hymenolepis* 78, 147
tenerrima, **Taenia** 78
tenuis, *Hymenolepis* (*Echinocotyle*) 74, 81, 108
tenuis, **Echinocotyle** 74
tenuis, **Taenia** 35
tenuirostris, *Hymenolepis* 76, 6, 7, 147
tenuirostris, *Drepanidotaenia* 76
tenuirostris, **Taenia** 76
teres, *Lateriporus* 53, 147
teres, **Taenia** 53
teresoides, *Hymenolepis* 78, 148
tenuis nodis instructa, **Taenia** 79
Tetrabothriidae 27, 32
Tetrabothriinae 27
tetrabothrioides, *Taenia* 93, 109
Tetrabothrius 27, 33, 13, 14, 15, 30, 31
Tetracisdictotyle 30
tetracis, *Hymenolepis* 73, 106
tetragona, *Davainea* 43, 100
tetragona, **Taenia** 43
tetraonis, *Hymenolepis* 73
tetraonis scotici, **Taenia** 97
Thysanosoma 27, 28
Thysanosominae 28, 31
tichodroma, *Hymenolepis* 80, 173
tomica, *Rhabdometra* 69, 92, 101
tordae, *Anomotaenia* 58, 123
tordae, **Halysis** 58
tordae, **Taenia** 58
torquata, **Halysis** 77
torquata, **Taenia** 77
torulosa, *Tetrabothrius* 34, 133
torulosus, **Prosthecocotyle** 34
totani, **Taenia** 93
transfuga, *Dilepis* 52, 137
transfuga, **Taenia** 52
transverse elliptica, **Taenia** 94
trapezoides, *Biuterina* 68, 164, 172
trapezoides, *Anomotaenia* 58, 142
triangula, *Biuterina* 68, 172
triangula, **Taenia** 68
triangularis, **Taenia** 97
Trichocephaloides SINITZ. 27, 28, 30, 53
trichoglossi, **Taenia** 38
trichosoma, **Taenia** 85
trigonocantha, *Biuterina* 68, 172
trigonocephala, *Anomotaenia* 59, 172
trigonocephala, **Taenia** 59
trifolium, *Hymenolepis* 78, 148
trilineata, **Halysis** 94
trilineata, **Taenia** 83
tringae, **Taenia** 93
Triplotaenia 28
trilesticulata, *Hymenolepis* 78, 148
trochili, *Anonchotaenia* 71, 173
tuberculata, *Diploposthe* 95, 148
tuberculata, **Ophryocotyle** 85
tuberculata, **Taenia** 85
tumens, **Taenia** 73

- turdi*, *Taenia* 95
turdi musici I, *Taenia* 95
turdi musici II, *Taenia* 95
turdorum, *Taenia* 79
undula, *Dilepis* 51, 52, 79, 172
undula, *Taenia* 52, 79
undulata, *Davainea* 45, 162
undulata, *Dilepis* 52, 79
undulata, *Hymenolepis* 52
undulata, *Taenia* 52, 79, 80
undulatoides, *Anomotaenia* 59, 172
uncinata, *Hymenolepis* 80
unguicula, *Taenia* 64, 75
unicoronatum, *Monopylidium* 66, 172
unilateralis, *Dilepis* 51
unilateralis, *Dilepis* 52, 107
unilateralis, *Taenia* 52
unilateralis, *Hymenolepis* 75, 137
unilateralis, *Taenia* 75
uniterina, *Davainea* 46, 171
umbrella, *Tetrabothrius* 34, 133
umbrella, *Prosthecocotyle* 34
uliginosa, *Hymenolepis* 74
uliginosa, *Taenia* 74
uralensis, *Hymenolepis* (*Echinocotyle*)
 74, 81, 108
uralensis, *Echinocotyle* 74
urceus, *Dilepis* 52, 137
urceus, *Taenia* 52
urnigera, *Taenia* 96, 173
urogalli, *Davainea* 43, 100
urogalli, *Taenia* 43
vallei, *Hymenolepis* 74
vallei, *Taenia* 74
vanelli, *Anomotaenia* 60, 108
vanelli, *Halysis* 57
vaginatus, *Acoelus* 4, 85, 86, 108
vaginatus, *Taenia* 86
variabilis, *Moniezia* 38, 169
variabilis, *Choanotaenia* 57
variabilis, *Taenia* 57
vesiculigera, *Anomotaenia* 17, 172
vexata, *Taenia* 95, 169
viator, *Taenia* 94, 142
villosa, *Hymenolepis* 8, 10, 73, 101,
 106
villosa, *Halysis* 73
villosa, *Taenia* 73
volvulus, *Anomotaenia* 57, 107
volvulus, *Diplochetos* 57
volvi, *Davainea* 44, 100
zederi, *Taenia* 93, 135
zeylanica, *Ophryocotyle* 41, 163
Zschokkea 28, 40

Literaturverzeichnis.

1793. ABILDGARD, P. C., Allgemeine Betrachtungen über Eingeweidewürmer, in: Schr. naturf. Ges. Kopenhagen, Vol. 1, Abt. 1, p. 24—59, 1 Taf.
1901. ARIOLA, V., Revisione della famiglia Bothriocephalidae s. str., in: Arch. Parasitol., Vol. 3, No. 3.
Spricht p. 443 unter dem Namen *Bothriocephalus longispiculus* STOSSICH von einer Taenie, welche in das Genus *Acoleus* gehört.
1875. ARLOING, Note sur la place d'un Ténia de la poule (*Phasianus gallus*) incomplètement étudié par DUJARDIN, in: Rec. Méd. vét. Alfort (6), Vol. 2, p. 427—431.
1902. —, Sur la place d'un Ténia de la poule incomplètement observé par M. DUJARDIN, in: Bull. Soc. Sc. vét., p. 268, mit fig.
1857. AUBERT, H., Ueber *Gryporhynchus pusillus*, eine freie Cestodenamme, in: Z. wiss. Zool., Vol. 8, p. 274—293, 1 Taf., Nachtrag *ibid.*, p. 525—526.
Spricht von der Larve von *T. macropeos* WEDL.
- 1853a. BAIRD, W., Catalogue of Entozoa in the British Museum Collection, in: Proc. zool. Soc. London, Vol. 21, 132 p., tab. 1—2.
- 1853b. —, Descriptions of some new species of Entozoa, *ibid.*, Vol. 21, p. 18—25, 2 pl.
- 1859a. —, Description of a new species of Taenia, *ibid.*, Vol. 27, p. 111, tab. 56.
- 1859b. —, Abdruck der beiden vorhergehenden Abhandlungen ohne Tafeln, in: Ann. Mag. nat. Hist. (2), Vol. 15, 1855, p. 69, (3), Vol. 4, 1859, p. 240.
1862. —, Description of some new species of Entozoa, in: Proc. zool. Soc. London, 1862, p. 113—115.
1786. BATSCH, A. J. G., Naturgeschichte der Bandwurm-gattung überhaupt und ihrer Arten im besonderen, nach den neueren Beobachtungen in einem systematischen Auszuge, Halle, 298 p., 5 Taf.

1844. BELLINGHAM, O. B., Catalogue of Irish Entozoa, in: Ann. Mag. nat. Hist., Vol. 14, p. 251—255, 317—324.
1881. VAN BENEDEN, E., Recherches sur le développement embryonnaire de quelques ténias, in: Arch. Biol., Vol. 2, p. 183 avec 2 pl.
1858. VAN BENEDEN, P. J., Mémoire sur les Vers intestinaux, Paris, 376 p., 27 pl., Suppl. (Vol. 2), aux: CR. Acad. Sc. Paris.
1868. —, Sur la cigogne blanche et ses parasites, in: Bull. Acad. Belg. (2), Vol. 25, p. 294, tab. 2, fig. 1—5.
1900. BENHAM, W. BL., The structure of the rostellum in two new species of tapeworm, from Apteryx, in: Quart. Journ. microsc. Sc. (N. S.), Vol. 43, p. 83—96, 2 pl.
- 1891a. BLANCHARD, R., Notices helminthologiques (2), in: Mém. Soc. zool. France, Vol. 4, p. 420 avec 38 fig.
- 1891b. —, Note sur les migrations du *Taenia gracilis*, in: Bull. Soc. zool. France, Vol. 16, p. 119; — CR. Soc. Biol. Paris (9), Vol. 3, p. 330.
- 1891c. —, Histoire zoologique et médicale des Téniaïdes du genre *Hymenolepis* WEINLAND, Paris, 112 p., 22 fig.
- 1899a. —, Sur deux Téniaïdes récemment décrits par M. MÉGNIN. *Dav. guevillensis* et *T. longicollis*, in: Arch. Parasitol., Vol. 2, p. 144.
- 1899b. —, Un cas inédit de *Davainea madagascariensis*, considérations sur le genre *Davainea*, *ibid.*, Vol. 2, p. 200.
1779. BLOCH, M. E., Beitrag zur Naturgeschichte der Würmer, welche in anderen Thieren leben, in: Beschäft. Berlin. Ges. nat. Freunde, Vol. 4, p. 534, 3 Taf.
1782. —, Abhandlung von der Erzeugung der Eingeweidewürmer und den Mitteln wider dieselben, Berlin, 54 p., 10 Taf.
- 1894—1900. BRAUN, M., Vermes. Abth. Ib. Cestodes, in: BRONN, Klass. Ordn. Thierreich, 1731 p., 24 Taf.
1901. BREAZZANO, ANT., Sul rostelllo delle *Davaeineae*, in: Atti Accad. Sc. fis. mat. Napoli (2), Vol. 11, 5 p., 1 pl.
1824. BREMSER, J. G., Icones helminthum, systema RUDOLPHI entozoologicum, Vienne, 12 p., 16 pl.
1857. CARUS, J. V., Icones Zootomicae. 1. Hälfte, Leipzig, tab. 7, fig. 18 u. 19.
1901. CERRUTI, ATT., Di un Tenoide dell' *Alauda arvensis* con riguardo speciale ad un organo parauterina, in: Atti Accad. Sc. fis. mat. Napoli (2), Vol. 11, No. 6, 6 p., 1 pl.
1876. CHAPMAN, H. C., Description of a new *Taenia* from *Rhea americana*, in: Proc. Acad. nat. Sc. Philadelphia, p. 14.
1880. CHATIN, J., Description d'une nouvelle espèce de *Taenia*, in: Bull. Soc. philomat. Paris (7), Vol. 4, p. 31.
- 1884/85. —, Helminthes de l'île Campbell et de la nouvelle Zélande, *ibid.* (7), Vol. 9, p. 36; CR. Soc. Biol. Paris (8), Vol. 1, p. 770.

1905. CHOLODKOVSKY, N., Eine Idiogenes-Species mit wohlentwickeltem Scolex, in: Zool. Anz., Vol. 29, p. 580—583, mit 5 Fig. im Text.
1906. —, Cestodes nouveaux ou peu connus I, in: Arch. Parasitol., Vol. 10, p. 332—345, mit 3 Taf.
1902. CLERC, W., Contribution à l'étude de la faune helminthologique de l'Oural I, II, in: Zool. Anz., Vol. 25, p. 569—575, 658—664, mit 10 Fig.
1903. —, Contribution à l'étude de la faune helminthologique de l'Oural, in: Rev. suisse Zool., Vol. 2, p. 241—368, tab. 8—11.
- 1904a. —, Quelques remarques à propos d'une critique, in: Zool. Anz., Vol. 28, 1904, p. 243.
- 1904b. —, Courte notice sur mes excursions zoologiques en 1903 et 1904 (russe) 11 p.
- 1904c. —, Notice sur quelques collections helminthologiques inédites (russe), 6 p.
- 1906a u. b. —, Notes sur les Cestodes d'oiseaux de l'Oural I et II, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 42, a) p. 433—436, 532—537, b) 713—730.
1907. —, Notes sur les cestodes d'oiseaux de l'Oural III. Quelques observations sur *Dioicocestus aspera* FUHRMANN et sur les organes génitaux de *Schistotaenia macrorhyncha* RUD., *ibid.*, Vol. 43, p. 703 bis 708, avec 2 pl.
1870. CLOUET, J., Note sur le *Taenia crassula* du pigeon sur la gapes; maladie des jeunes poulets, in: Soc. Amis Sc. nat. Rouen 6^e et 7^e année, p. 49—53.
- 1859a. COBBOLD, T. Sp., On some new forms of Entozoa, in: Trans. Linn. Soc. London, Vol. 23, p. 363, tab. 63.
- 1859b. —, Observations on Entozoa with notices of several new species, including on account of two experiments in regard to the breeding of *T. serrata* and *T. cucumerina*, *ibid.*, Vol. 22, p. 155 (über Vogelcestoden siehe p. 164—165, tab. 33).
- 1861 et 1869. —, List of Entozoa, including Pentastomes, from animals dying at the Society's Menagerie between the years 1857—1860 inclusive, with descriptions of several new species, in: Proc. zool. Soc. London 1861, p. 117, Supplement: London 1869.
1898. COHN, L., Zur Anatomie der *Amabilia lamelligera* (OWEN), in: Zool. Anz., Vol. 21, p. 557—562, mit 3 Fig.
- 1899a. —, Zur Systematik der Vogeltaenien. Vorl. Mitteilung, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 25, p. 415—422.
- 1899b. —, Zur Systematik der Vogeltaenien II, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 26, p. 222—227.
- 1899c. —, Zur Systematik der Vogeltaenien III, in: Zool. Anz., Vol. 22, p. 405—408.
- 1900a. —, Zur Systematik der Vogeltaenien IV, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 27, p. 325—328.

- 1900b. COHN, L., Zur Kenntnis einiger Vogeltaenien, in: Zool. Anz., Vol. 23, p. 91—98.
- 1900c. —, Untersuchungen über das centrale Nervensystem der Cestoden, in: Zool. Jahrb., Vol. 12, Anat.
- 1900d. —, Zur Anatomie der Vogelcestoden I, in: Z. wiss. Zool., Vol. 67.
1901. —, Zur Anatomie und Systematik der Vogelcestoden, in: Nova Acta Leop. Carol. Akad., Vol. 79, 171 p., 8 tab.
1904. —, Helminthologische Mitteilungen II, in: Arch. Naturg., Jg. 70, Bd. 1, p. 243—248 m. Taf.
1887. COMINI, E., in: Die internationale Polarfahrt 1882/83; die österr. Polarstation Jan Mayen, Beobacht. Ergebnisse, Vol. 3.
1875. CORNELIUS, Taubenbandwurm, in: Verh. naturhist. Ver. preuß. Rheinlande Westfalen, Vol. 32, p. 182—183.
1825. CREPLIN, FR. CHR., Observationes de entozois, P. 1, Gryphiswald., 86 p., 1 pl.
1829. —, Novae observationes de entozois, Berolini, 134 p., 2 pl.
1839. —, Artikel Eingeweidewürmer, in: J. J. ERSCH u. J. G. GRUBER, Allgem. Encykl. Wiss. u. Künste, 32. Theil, Leipzig, p. 293—301.
1846. —, Nachträge zu GURLT's Verzeichniss der Thiere, bei welchen Entozoen gefunden worden sind, in: Arch. Naturgesch., 1846, p. 129—146.
1851. —, *ibid.*, 1851, Bd. 1, p. 287.
Identität von *T. multiformis* und *T. unguicula*.
1853. —, Eingeweidewürmer des *Dicholophus cristatus*, in: Abh. naturf. Ges. Halle, Vol. 1, p. 59—68.
1890. CRETÉY, C., Cestodi della *Coturnix communis*, in: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, Vol. 5, 16 p., 1 tav.
- v. DADAY, E., Helminthologische Studien über einige in Süßwasser-Entomostriken lebende *Cercocystis*-Formen, in: Zool. Jahrb., Vol. 14, Syst., p. 161—209.
1860. DAVAINE, C., Traité des Entozoaires et de maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques, Paris, 88 Fig.
- 1893a. DIAMARE, V., Le funzioni dell' ovaria nella *Davainea tetragona* MOL., in: Rend. Accad. Sc. fis. mat. Napoli, fasc. 8—12, 7 p.
- 1893b. —, Note su' Cestodi, in: Boll. Soc. Naturalisti Napoli (1), Vol. 7.
- 1897a. —, Anatomie der Genitalien des Genus *Amabilia mihi*, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 21, p. 862—872.
- 1897b. —, Die Genera *Amabilia* und *Diploposthe*, *ibid.*, Vol. 22, p. 98—99.
1898. —, Ueber die weiblichen Geschlechtsteile der *Davainea tetragona* (MOLIN), eine kurze Antwort an Herrn Dr. HOLZBERG, *ibid.*, Vol. 24, p. 480—483.

- 1899a. DIAMARE, V., Ueber *Amabilia lamelligera* (OWEN), in: *Contr. Bakteriologie*, Vol. 25, p. 357—359.
- 1899b. —, Einige Bemerkungen zur Antwort an Herrn Dr. L. COHN, *ibid.*, Vol. 26, p. 780—782.
- 1900a. —, *Paronia Carrinoi* n. g. n. sp. di Tenioide a duplici organi genitali, in: *Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Genova*, No. 91.
- 1900b. —, *Paronia Carrinoi* n. g. n. sp. von Taenioiden mit doppelten Geschlechtsorganen, in: *Contr. Bakteriologie*, Vol. 28, p. 846—850, 4 Fig.
1901. —, Zur Kenntnis der Vogelcestoden (Ueber *Paronia Carrinoi* mihi), *ibid.*, Vol. 30, p. 369—373, 4 Fig.
1850. DIESING, K. M., *Systema helminthum*, Vol. 1, p. 478—608.
1854. —, Ueber eine naturgemässe Vertheilung der Cephalocotylen, in: *SB. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Cl.*, Vol. 13, p. 556—616.
1856. —, Zwanzig Arten von Cephalocotylen, in: *Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Cl.*, Vol. 12, p. 23—38, 6 Taf.
1864. —, Revision der Cephalocotylen, *Abth. Cyclocotylen*, in: *SB. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Cl.*, Vol. 49, p. 357—430.
1845. DUJARDIN, F., *Histoire des Helminthes ou vers intestinaux*, Paris, 12 pl.
1780. FABRICIUS, O., *Fauna grönlandica, systematice, sistens animalia Groenlandiae occidentalis hactenus indagata*, Hafena et Lips.
1868. FEUEREISEN, J., Beitrag zur Kenntniss der Taenien, in: *Z. wiss. Zool.*, Vol. 28, p. 161—205, 1 Taf.
1892. DE FILIPPI, C., Nota preliminare sul sistema riproduttore della *T. botrioplitis* P., in: *Bull. Soc. nom. Stud. zool.*, An. 1, p. 75—79 e 1 pl.
1840. FISCHER DE WALDHEIM, G., Notata quaedam de Enthelminthis una cum recensione specierum, quarumque novarum, a MIRAM museo academico donatarum, in: *Bull. Soc. Naturalistes Moscou*, p. 139—163.
1877. FRIEDBERGER, Bandwurmseuche unter den Fasanen, in: *Ztschr. Veterin. Wiss.*, p. 97—112.
1869. FRIS, En hidtil ubeskrevne Bændelorme hos Fugle, in: *Vidensk. Meddel. naturh. Foren. Kjöbenhavn* (aar 1879) 1870, p. 121—124 med 1 tav.
1727. FRISCH, J. L., De taeniis in anserum intestinis, in: *Miscell. Berolinensia, ad incrementum scientiarum ex scriptis Soc. Reg. Sc. exh. Contin.*, Vol. 2, Berolini, p. 42. — *Phys. med. Abh. Acad. Wiss. Berlin*, p. 155—156.
1789. FRÖLICH, J. A., Beschreibungen einiger neuen Eingeweidewürmer, in: *Der Naturforscher*, St. 24, Halle, p. 101—162, 1 Taf.
1791. —, Beyträge zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer, *ibid.*, St. 25, Halle.

1802. FRÖLICH, J. A., Beiträge zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer, *ibid.*, St. 29.
1895. FUHRMANN, O., Beitrag zur Kenntnis der Vogeltaenien I, in: *Rev. suisse Zool.*, Vol. 2, 1895, p. 433—458, 1 Taf.
1896. —, Beitrag zur Kenntnis der Vogeltaenien II, *ibid.*, Vol. 4, 1896, p. 111—132.
1897. —, Sur un nouveau Ténia d'oiseaux, *ibid.*, Vol. 5, 1897, p. 107 bis 117, 1 pl.
1898. —, Ueber die Genera Prosthecoctyle MONTICELLI u. Bothriotaenia LÖNNBERG, in: *Zool. Anz.*, No. 561, 1898.
- 1899a. —, Das Genus Prosthecoctyle, in: *Zool. Anz.*, Vol. 22, p. 180.
- 1899b. —, Das Genus Prosthecoctyle, in: *Contr. Bakteriolog.*, Vol. 25, 3 Fig.
- 1899c. —, Mitteilungen über Vogeltaenien, *ibid.*, Vol. 26. I. Ueber *T. depressa* SIEBOLD, p. 83, 2 Fig. II. Zwei eigentümliche Vogeltaenien, p. 618. III. *T. musculosa* mihi u. *T. crateriformis* GOEZE (*Monopylidium* nov. gen.), p. 622.
- 1899d. —, Deux singuliers Ténias d'oiseaux, in: *Rev. suisse Zool.*, Vol. 7, p. 341, 1 pl.
- 1899e. —, On the anatomy of *Prosthecoctyle torulosa* (LINSTOW) and *P. heteroclitica* (DIES.), in: *Proc. Roy. Soc. Edinburgh*, Vol. 22, p. 642, 1 pl.
- 1900a. —, Neue eigentümliche Vogeltaenien, in: *Zool. Anz.*, Vol. 23, p. 48.
- 1900b. —, Zur Kenntnis der Acoleinae, in: *Contr. Bakteriolog.*, Vol. 28, p. 363, 12 Fig.
- 1901a. —, Bemerkungen über einige neuere Vogelcestoden, in: *Contr. Bakteriolog.*, Vol. 39, p. 757.
- 1901b. —, Sur plusieurs singuliers ténias d'oiseaux, in: *Arch. Soc. phys. nat. Genève*, Vol. 12, p. 505 (même, in: *CR. Soc. helvet. Sc. nat.*).
- 1901c. —, Neue Arten und Genera der Vogeltaenien, in: *Zool. Anz.*, Vol. 24, p. 271. Druckfehlerberichtigung, p. 320.
- 1902a. —, Sur deux nouveaux genres de cestodes d'oiseaux, in: *Zool. Anz.*, Vol. 25, p. 357, 2 Fig.
- 1902b. —, Die Anoplocephaliden der Vögel, in: *Contr. Bakteriolog.*, Vol. 32, p. 122, 25 Fig.
- 1904a. —, Ein merkwürdiger getrenntgeschlechtiger Cestode, in: *Zool. Anz.*, Vol. 27, p. 327.
- 1904b. —, Ein getrenntgeschlechtiger Cestode, in: *Zool. Jahrb.*, Vol. 20, *Syst.*, p. 131, tab. 10.
- 1904c. —, Neue Anoplocephaliden der Vögel, in: *Zool. Anz.*, Vol. 27, p. 384.

- 1905a. FUHRMANN, O., Ueber ost-asiatische Vogel-Cestoden, in: Zool. Jahrb., Vol. 22, Syst., p. 303—320, m. 2 Taf.
- 1905b. —, Das Genus *Diploposthe* JACOBI, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 40, p. 217—224.
- 1906a. —, Die Taenien der Raubvögel, *ibid.*, Vol. 41, p. 79—89 u. 212—221, mit 32 Fig. im Text.
- 1906b. —, Die Hymenolepisarten der Vögel I, *ibid.*, Vol. 41, p. 352 bis 358, 442—452, mit 39 Fig. im Text.
- 1906c. —, Die Hymenolepisarten der Vögel II, *ibid.*, Vol. 42, p. 620 bis 621, 730—755.
- 1907a. —, Bekannte und neue Arten und Genera von Vogeltaenien, *ibid.*, Vol. 45, p. 516—536, mit 43 Fig.
- 1907b. —, Die Systematik der Ordnung der Cyclophyllidea, in: Zool. Anz., Vol. 32, p. 289—297.
- 1908a. —, Das Genus *Anonchotaenia* und *Biuterina*, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 46, p. 622—631, mit 16 Fig., Fortsetzung im Druck.
- 1908b. —, Nouveau *Tenias* d'oiseaux, in: Rev. suisse Zool., Vol. 16, p. 27—73, mit 60 Fig.
- 1908c. —, Neue *Davaineiden*, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 47, im Druck.
1847. GERVAIS, P., Sur quelques Entozoaires taenioides et hydatides, in: Mém. Acad. Sc. Lettres Montpellier, Sect. Sc., p. 85.
1857. GIEBEL, C., CHR. L. NITZSCH's helminthologische Untersuchungen, in: Ztschr. ges. Naturwiss., Vol. 9, p. 264.
1866. —, Die im zoologischen Museum der Universität Halle aufgestellten Eingeweidewürmer, nebst Beobachtungen über dieselben, *ibid.*, Vol. 28, p. 253.
1790. GMELIN, *Systema naturae*, Vol. 1, Pars 6, p. 3021.
1782. GOEZE, J. A. E., Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer thierischer Körper, Blankenburg, 44 Taf.
1888. GRASSI, B. u. G. ROVELLI, Bandwürmerentwicklung, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 3, p. 173.
- 1889a. —, Embryologische Forschungen an Cestoden, *ibid.*, Vol. 5, p. 370 u. p. 401.
- 1889b. —, Intorno allo sviluppo dei Cestodi, in: Bull. Mensile Accad. Sc. nat. Catania, fasc. 8, p. 4.
1892. —, Ricerche embriologiche sui Cestodi, in: Atti Accad. Sc. nat. Catania, Vol. 4, 108 p., 4 pl.
1845. GROS, Observations et inductions microscopiques sur quelques parasites, in: Bull. Soc. Natural. Moscou, Vol. 18, p. 380, 1 pl.
1845. GURLT, Verzeichniss der Thiere, bei welchen Entozoen gefunden worden sind, in: Arch. Naturgesch., Jg. 11, p. 223; Nachträge dazu von CREPLIN, *ibid.*, p. 325; Jg. 12, 1846, p. 129; Jg. 13, 1847, p. 289; Jg. 17, 1851, p. 269.

1890. HAMANN, O., In *Gammarus pulex* lebende Cysticercoiden mit Schwanzanhängen, in: Jena. Z. Naturwiss., Vol. 24, p. 1—10, 1 Taf.
1891. —, Neue Cysticercoiden mit Schwanzanhängen, *ibid.*, Vol. 25, p. 553.
- 1896a. HASSALL, AL., Check list of the animal parasites of Chickens, in: Bureau anim. Industry U. S. Dep. Agriculture, Circular No. 9, p. 1—7.
- 1896b. —, Check list of animal parasites of Turkey, *ibid.*, Circular No. 12, p. 1—3.
- 1896c. —, Bibliography of the tapeworms of poultry, *ibid.*, Bull. No. 12, p. 81—88.
- 1896d. —, Check list of the animal parasites of geese, *ibid.*, Circular No. 14.
- 1896e. —, Check list of the animal parasites of pigeons, *ibid.*, Circular No. 15.
1898. HOLZBERG, F., Der Geschlechtsapparat einiger Taenien aus der Gruppe *Davainea* BL., in: Zool. Jahrb., Vol. 11, Anat., p. 153 bis 188, 2 Taf.
1773. HOUTTOUYN, in: LINNÉ's Natursystem von H. MÜLLER, Vol. 2, p. 904.
1896. JACOBI, A., Diploposthe, eine neue Gattung von Vogeltaenien, in: Zool. Anz., Vol. 19.
- 1897a. —, Diploposthe laevis, eine merkwürdige Vogeltaenie, in: Zool. Jahrb., Vol. 10, Anat., 2 Taf.
- 1897b. —, Amabilia und Diploposthe, in: Ctrbl. Bakteriologie, Vol. 21, p. 873—874.
1898. —, Ueber den Bau der *Taenia inflata* RUD., in: Zool. Jahrb., Vol. 12, Syst., p. 95—104, 1 Taf.
1904. v. JANICKI, C., Bemerkungen über Cestoden ohne Genitalporus, in: Ctrbl. Bakteriologie, Vol. 36, p. 222—223, 1 Fig.
1906. —, Die Cestoden Neu-Guinea's, in: Nova Guinea, Rés. Expéd. sc. Néerlandaise Nouvelle Guinée, Vol. 5.
1893. JANSON, Die Haustiere in Japan IV. Die Krankheiten der Haustiere in Japan, in: Arch. wiss. prakt. Thierheilkunde, Vol. 19, p. 241—276.
1902. v. IHERING, H., Die Helminthen als Hilfsmittel der zoogeographischen Forschung, in: Zool. Anz., Vol. 26, p. 42—51.
1900. KHITROW, M., Sur la présence de la *Cotugnia digonopora* à Kharkow et de son parasite vers rond, in: Travaux Naturalistes Univ. Kharkow, Vol. 25, p. 3—10.
1906. KLAPTOCZ, BRUNO, Ergebnisse der mit Subvention aus der Erbschaft TREITL unternommenen zoologischen Forschungsreise Dr. FRANZ WERNER's in den ägyptischen Sudan und nach Nord-Uganda. Cestoden aus *Numida ptilorhyncha* LEBT., in: SB. Akad. Wiss. Wien, Vol. 115, 1906, 22 p., 1 Taf.

- 1894a. KOWALEWSKI, M., Materyaly do fauny helmintologicznej pasorzytniczej polskiej I, in: Ber. physiograph. Commission Akad. Wiss. Krakau.
- 1894b. —, Fauna helminthologiczna pasorzytnicza krajowa naszych zwierzat i roslinuy tecznych oraz czlowicka, *ibid.*, p. 214—227.
- 1894c. —, Studya helmintologiczne I, *ibid.*, p. 278—280.
1895. —, Studya helmintologiczne I, in: Abh. Akad. Wiss. Krakau, math.-nat. Abt., Vol. 29, p. 349—367.
1896. —, Materyaly do fauny helmintologicznej pasorzytniczej polskiej II, in: Ber. physiograph. Commission Akad. Wiss. Krakau, Vol. 32, 8 p.
1898. —, Sur la tête du *Ténia malleus* GOEZE, in: Arch. Parasitol., Vol. 1, p. 326—329 avec 6 fig.
- 1902a. —, Materyaly do fauny helmintologicznej pasorzytniczej polskiej III, in: Ber. physiograph. Commission Akad. Wiss. Krakau, Vol. 36.
- 1902b. —, Spis roboków pasorzytnych znalezionych w ptactwie domowym, w Dublanoch, w ciagu lat. 1894—1901.
1903. —, Studya helmintologiczne VII, in: Abh. Akad. Wiss. Krakau, math.-nat. Abt., 26 p., 2 Taf.
- 1904a. —, Materyaly do fauny helmintologicznej pasorzytniczej polskiej IV, in: Ber. physiograph. Commission Akad. Wiss. Krakau, Vol. 28, p. 2.
- 1904b. —, Studya helmintologiczne VIII. O nowyna tasciemcu: *Tatria biremis* gen. nov. sp. nov. Englisches Resumé, in: Abh. Akad. Wiss. Krakau, math.-nat. Abt., Vol. 44, p. 284—304 u. p. 367—369, 2 Taf.
1905. —, Helminthological studies IX. On two species of tapeworms of the Genus *Hymenolepis* (polnisch, Resumé englisch), in: Bull. Acad. Cracovie, 16 p., Taf. 24.
1906. —, Mitteilungen über eine *Idiogenes*-Species, in: Zool. Anz., Vol. 29, p. 683—686 mit 3 Fig.
1867. KRABBE, H., Om nogle Bændelormerners Udvikling til Bændelorme, in: Vidensk. Meddel. naturh. Foren. Kjöbenhavn, p. 1—10.
1868. —, Trappens Bændelorme, *ibid.*, 1868, p. 122—126, 1 tab., übersetzt in: Ann. Mag. nat. hist., Vol. 4, p. 47—51, 1 pl.
1869. —, Bidrag til Kundskab om Fuglenes Bændelorme, in: Dansk. Vidensk. Selsk. Skr., naturvid. math. Afd. (5), Vol. 8, p. 249—363, 10 Tavll.
1879. —, Cestodes ges. von A. P. FEDSCHENKO auf seiner Reise in Turkestan, in: Verh. Ges. Freunde Natur, Anthropol. Ethnographie Moskau, Vol. 34, 19 p., mit 88 Fig. (russisch).
1882. —, Nye Bidrag til Kundskab om Fuglenes Bændelorme, in: Dansk. Vidensk. Selsk. Skr., naturvid. math. Afd. (6), Vol. 1, p. 349—366, 2 Tavll.

1873. KREFFT, G., On australian Entozoa, in: Trans. entomol. Soc. New South Wales, Vol. 2, p. 206—232, 3 pl.
1853. KÜCHENMEISTER, F., Ueber Cestoden im Allgemeinen und die des Menschen insbesondere, Zittau.
1899. LATHROP, H. B., A Taenia in the muscle of a Fowl, in: Med. Record., No. 1478, Fig. (Résumé in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 26, p. 518.)
1855. LEIDY, J., Notices of some tapewormes, in: Proc. Acad. nat. Sc. Philadelphia, Vol. 7.
1887. —, Tapeworms of birds, in: Journ. comp. Med. Surg., Vol. 8, 1887.
1904. —, Researches in Helminthology and Parasitology, arranged and edited by J. LEIDY jr., in: Smithson. miscell. Coll., Vol. 46, 1904.
1898. LEONARDI, C., Un caso di Taenia mediocanellata in un Himantopus candidus, in: Avicula, Anno 2, p. 59.
1819. LEUCKART, FR. S., Zoologische Bruchstücke 1, Helmstädt.
1886. LEUCKART, R., Die thierischen Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten.
- 1872a. v. LINSTOW, O., Ueber den Cysticercus Taeniae gracilis, eine freie Cestodenname des Barsches, in: Arch. mikrosk. Anat., Vol. 8, p. 535—537, tab. 21, fig. 1—5.
- 1872b. —, Sechs neue Taenien, in: Arch. Naturgesch., Jg. 38, p. 55—58, 1 Taf.
1875. —, Beobachtungen an neuen und bekannten Helminthen, *ibid.*, Jg. 41, p. 183—207, 3 Taf.
1876. —, Helminthologische Beobachtungen, *ibid.*, Jg. 42, p. 1—18, 2 Taf.
- 1877a. —, Helminthologica, *ibid.*, Jg. 43, p. 1—18, 1 Taf.
- 1877b. —, Enthelminthologica, *ibid.*, Jg. 43, p. 173—197, 3 Taf.
1878. —, Compendium der Helminthologie, Hannover, 381 p.
- 1879a. —, Helminthologische Untersuchungen, in: Jahresh. Vers. vaterl. Naturkde. Württemberg, Jg. 35, p. 313—342, 1 Taf.
- 1879b. —, Helminthologische Studien, in: Arch. Naturgesch., Jg. 45, p. 165—188, 2 Taf.
1882. —, Helminthologische Studien, *ibid.*, Jg. 48, p. 1—25, 2 Taf.
1884. —, Helminthologisches, *ibid.*, Jg. 50, p. 125—145, 4 Taf.
1887. —, Helminthologische Untersuchungen, in: Zool. Jahrb., Vol. 3, Syst., p. 97—114, 1 Taf.
1888. —, Report on the Entozoa, in: Rep. sc. Res. Challenger, Zool., Vol. 23, 18 p., 2 pl.

1889. v. LINSTOW, O., Compendium der Helminthologie. Nachtrag, Hannover, 151 p.
1890. —, Beitrag zur Kenntniss der Vogeltaenien nebst Bemerkungen über neue und bekannte Helminthen, in: Arch. Naturgesch., Jg. 56, p. 171—188, 1 Taf.
- 1892a. —, Beobachtungen an Vogeltaenien, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 12, p. 501—504, 1 Fig.
- 1892b. —, Beobachtungen an Helminthenlarven, in: Arch. mikrosk. Anat., Vol. 39, p. 325—343, 1 Taf.
- 1893a. —, Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Taenien, *ibid.*, Vol. 42, p. 442—459, 2 Taf.
- 1893b. —, Helminthologische Studien, in: Jena. Z. Naturwiss., Vol. 28, p. 328—342, 1 Taf.
1896. —, Helminthologische Mitteilungen, in: Arch. mikrosk. Anat., Vol. 48, p. 375—397, 2 Taf.
- 1900a. —, Tetrabothrium cylindraceum RUD. und das Genus Tetrabothrium, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 27, p. 364.
- 1900b. —, On Tetrabothrium torulosum and Tetrabothrium auriculatum, in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh, Vol. 23.
- 1901a. —, Taenia horrida, Tetrabothrium macrocephalum und Heterakis distans, in: Arch. Naturgesch., Jg. 1901, 1 Taf.
- 1901b. —, Entozoa des zoologischen Museums der Kais. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg (I), in: Bull. Acad. Sc. St. Pétersbourg (5), Vol. 15, p. 271—292, 2 Taf.
- 1901c. —, Helminthen von den Ufern des Nyassa-Sees, ein Beitrag zur Helminthen-Fauna von Süd-Afrika, in: Jena. Z. Naturw., Vol. 35, p. 426, fig. 29—31.
1902. —, Taenia Trichoglossi, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 31, p. 32.
1903. Entozoa des zoologischen Museums der Kais. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg (II), in: Annuaire Mus. zool. Acad. Sc. St. Pétersbourg, Vol. 8.
- 1904a. —, Neue Helminthen aus Westafrika, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 36, p. 379—383, Figg.
- 1904b. —, Beobachtungen an Nematoden und Cestoden, in: Arch. Naturgesch., p. 305—307, tab. 13.
- 1905a. —, Helminthologische Beobachtungen, in: Arch. mikrosk. Anat., Vol. 66, p. 355—366, 1 Taf.
- 1905b. —, Helminthen der russischen Polar-Expedition 1900—1903, in: Mém. Acad. Sc. St. Pétersbourg (8), Vol. 18, No. 1, 16 p., 3 Taf.
1906. —, Helminthes from the collection of the Colombo Museum, in: Spolia Zeylanica, Vol. 3, Part 11, p. 163—186, 3 pl.
- 1906a. —, Neue und bekannte Helminthen, in: Zool. Jahrb., Vol. 24, Syst., p. 15, tab. 1, fig. 17—18.

1908. V. LINSTOW, O., *Hymenolepis furcifera* und *Tatria biremis*, zwei Taenien aus *Podiceps nigricollis*, in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 46, p. 38—40 mit 5 Fig.
1892. LINTON, E., Notes on avian Entozoa, in: Proc. U. S. nation. Mus., Vol. 15, p. 87—113, 5 pl.
1889. LÖNNBERG, E., Bidrag till kännedomen om i Sverige förekommande Cestoder, in: Bih. Svensk. Vet. Akad. Handlingar, Vol. 14, Afd. 4, 69 p., 2 pl.
1890. —, Helminthologische Beobachtungen von der Westküste Norwegens. 1. Thl. Cestoden, *ibid.*, Vol. 16, Afd. 4, 47 p.
1893. —, Bemerkung über einige Cestoden, *ibid.*, Vol. 18, Afd. 4, 17 p., 1 pl.
1896. —, Cestoden, in: Hamburg. Magelhaen. Sammelreise.
1898. LÜHE, M., Beiträge zur Helminthenfauna der Berberei, in: SB. Akad. Wiss. Berlin, Vol. 40, 10 p., 4 Fig.
1899. —, Zur Anatomie und Systematik der Bothriocephaliden, in: Verh. deutsch. zool. Ges. (p. 43: Bemerkungen über das Genus *Tetrabothrius*).
- 1901a. —, Ueber die Fixierung der Helminthen an der Darmwandung ihrer Wirte und die dadurch verursachten pathologisch-anatomischen Veränderungen des Wirtsdarmes, in: Verh. 5. internat. Zoologenkongress (Berlin), p. 695—705.
- 1901b. —, Referat über V. ARIOLA's Revisione della famiglia Bothriocephalidae s. str. (*Bothriotaenia longispicula* STOSS. = *Acoelus longispiculus* (STOSS.)), in: Ctrbl. Bakteriol., Vol. 29, p. 415.
1892. LÜPKE, F., Parasitologisches: *Taenia crassula* in einem Papagei, in: Repert. Thierheilkunde, Jg. 53, p. 257—264.
1892. DE MAGALHÃES, P. S., Notes d'helminthologie brésilienne, in: Bull. Soc. zool. France, Vol. 17, p. 145—146.
1898. —, Notes d'helminthologie brésilienne. 8. Deux nouveaux *Ténias* de la poule domestique, in: Arch. Parasitol., Vol. 1, p. 442—451, 6 fig.
1899. —, *Davainea oligophora* DE MAGALHÃES 1898 et *T. cantaniana* POLONIO 1860, *ibid.*, Vol. 2, p. 480—482.
1869. MARCHI, P., Sopra una *Taenia* della *Loxia curvirostra*, in: Atti Soc. ital. Sc. nat., Vol. 12, p. 534—535, 1 pl.
1878. —, Sur le développement du *Cysticerque* des Geckos en Cestode parfait chez les *Strix noctua*, in: CR. Assoc. franc. Avanc. Sc. 7. sess. (Paris), p. 757; Rev. sc., Vol. 15.
1899. MAROTEL, G., Sur deux Cestodes parasites des oiseaux (note préliminaire), in: CR. Soc. Biol. Paris, Vol. 1, p. 935—937.
1878. MÉGNIN, P., Epizooties vermineuses chez les jeunes faisans, in: Recueil Méd. vét. (6), Vol. 5, p. 825—829, p. 927—928, tab. 4.

1880. MÉGNIN, P., De la caducité des crochets et du scolex lui même chez les Ténias, in: Bull. Soc. zool. France, Vol. 5, p. 117—120; Rec. Méd. vét., Vol. 57, p. 393—397; CR. Acad. Paris, Vol. 90, p. 715—717.
1881. —, Dasselbe, in: Journ. Anat. Physiol., p. 27—44, 2 pl.
1891. MÉGNIN, P., Un nouveau Taenia du pigeon ou plutôt une espèce douteuse de RUDOLPHI réhabilitée, in: CR. Soc. Biol. Paris (9), Vol. 3, p. 751—753, 6 fig.
1898. —, Epidémies de Ténias chez les Faisans et le Perdix, in: Bull. Acad. Méd., Vol. 40, p. 159.
1831. MEHLIS, E., Anzeige zu CREPLIN's Novae observationes de entozois, in: OKEN's Isis, p. 166—199.
1854. MEISSNER, G., Zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Bandwürmer, in: Z. wiss. Zool., Vol. 5.
1890. MESSEA, A., Note di elmintologia romana, in: Lo Spallanzani, Ann. 19, Roma, p. 216—225, 7 fig.
1899. MINGAZZINI, P., Osservazioni generali sul modo di adesione dei Cestodi alla parete intestinale, in: Atti Acad. Lincei, Vol. 81, p. 597—603, 6 fig.; Arch. ital. Biol., Vol. 32, p. 340—350.
1840. MIRAM, Notata quaedam de Enthelminthis, in: Bull. Soc. Natural. Moscou, p. 160.
1790. MODEER, A., Tilläggnigar til SCHRANK's Afhandling, in: Vetenskaps Acad. Nya Handling., Vol. 11.
1907. MOLA, P., Sopra Davainea circumvallata KRABBE, in: Zool. Anz., Vol. 32, p. 126—130, 7 Fig.
1907. —, Di un nuovo cestode del genere Davainea BLANCH., in: Biol. Ctrbl., Vol. 27, p. 575—578, mit 5 Fig.
1907. —, Les organes génitaux de Taenia nigropunctata CRETY et, en particulier, l'organe parautérin, in: CR. Acad. Sc. Paris, Vol. 145, p. 87—90, mit 2 Fig.
1907. —, Un nuovo elminto della Gallinula chloropus, in: Bull. Acad. Roy. Belg., p. 886—893, mit 1 Taf.
1858. MOLIN, R., Prospectus helminthum quae in prodromo faunae helminthologicae Venetiae continentur, in: SB. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Cl., Vol. 30; Vol. 33, 1859.
1861. —, Prodomus faunae helminthologicae venetae adjectis disquisitionibus anatomicis et criticis, in: Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Cl., Vol. 19, p. 189—338, 15 tab.
1891. MONIEZ, R., Notes sur les Helminthes. II. Sur les Cysticerquès des Ostracodes d'eau douce, in: Rev. biol. Nord. France, Vol. 4, p. 25—26.
1889. MONTICELLI, F. S., Notes on some Entozoa in the collection of the British Museum, in: Proc. zool. Soc. London, p. 321—325, 1 pl.

1891. MONTICELLI, F. S., Notizie su di alcune specie di Taenia, in: Boll. Soc. Sc. nat. Napoli (1), Vol. 5, p. 151—174, 1 tav.
1893. —, Intorno ad alcuni elminti del Museo zoologico della R. Università di Palermo, in: Naturalista Siciliano Ann. 12, 24 p., 1 tav.
1899. —, Sul Tetrabothrium Gerrardii BAIRD, in: Atti Soc. Nat. Mat. Modena (4), Vol. 1, siehe Fußnote p. 17.
1896. MOORE, V. A., A nodular Taeniasis in fowls, in: Bureau animal. Industry U. S. A. Dept. Agric., Circular No. 3, 4 p., fig. 1—2. — Abstr. in: New York Med. Journ., Vol. 42, p. 373—374.
1895. MORELL, A., Anatomisch-histologische Studien an Vogeltaenien, in: Arch. Naturgesch., Jg. 1895, 27 p., 1 pl.
1890. MRAZEK, AL., O cysticerkoidech našich korýšu sladkovodnich, in: Abh. böhm. Ges. Wiss. Prag, p. 226—248, 2 Taf.
1891. —, Recherches sur le développement de quelques Ténias des oiseaux, in: SB. böhm. Ges. Wiss. Prag, p. 97—131, avec 2 pl.
1896. —, Zur Entwicklungsgeschichte einiger Taenien, *ibid.*, 1896, 16 p., 1 pl.
1905. —, Ueber Taenia acanthorhyncha WEDL. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Tatria KOW., *ibid.*, 24 p., 2 Textfig., 2 Taf.
1898. MÜHLING, P., Die Helminthen-Fauna der Wirbeltiere Ostpreußens, in: Arch. Naturgesch., Jg. 1898, 4 pl.
1877. MÜLLER, JOS., Ueber den Bandwurm einer Lerche, in: SB. Ges. Isis Dresden, Jg. 1877, p. 110—112.
1888. NEUMANN, Traité des maladies parasitaires non-microbiennes des animaux domestiques, 673 p., 306 fig., Paris.
1832. v. NORDMANN, A., Mikroskopische Beiträge zur Naturgeschichte der wirbellosen Thiere, Heft 1.
1824. NITZSCH, C. L., Art. Bothriocephalus, in: ERCH u. GRUBER, Allg. Encyklop. Wiss. Künste, Vol. 12, p. 94.
1893. OLSSON, P., Bidrag till Scandinaviens helminthfauna II, in: Svensk. Vetensk. Akd. Handl., Vol. 25, No. 12, 41 p., 5 tav.
1834. OWEN, R., On the anatomy of Corythaix porphyreolopha, in: Proc. zool. Soc. London 1834, p. 3—5; Isis 1835, p. 1021.
1835. —, Description of a new species of tapeworm, in: Trans. zool. Soc. London, Vol. 1, p. 385—386; Isis 1835, p. 434; Proc. zool. Soc. London 1835, p. 86; Résumé in: Arch. Naturgesch. 1835, p. 336 (v. SIEBOLD).
1858. PAGENSTECHER, H. A., Beitrag zur Kenntniss der Geschlechtsorgane der Taenien, in: Z. wiss. Zool., Vol. 9, p. 523—528, tab. 21.
1781. PALLAS, P. S., Bemerkungen über Bandwürmer in Menschen und Thieren, in: Neue nord. Beyträge physik. geogr. Erd- u. Völkerbeschreibung, Naturg. Oeconomie, Vol. 1, Petersburg und Leipzig, p. 39—112, 2 Taf.

1884. PARONA, C., Materiali per la fauna della Sardegna IX. Vermi parassiti in animali di Sardegna, in: Boll. sc. Ann. 6, p. 14—20.
1885. —, Di alcuni elminti raccolti nel Sudan orientale da O. BECCARI et P. MAGRETTI, in: Ann. mus. civ. Stor. nat. Genova (2), Vol. 2, p. 424—445, 2 tav.
- 1887a. —, Elmintologia Sarda. Contribuzione allo studio dei Vermi parassiti in animali di Sardegna, *ibid.*, Vol. 4, p. 275—384, 3 tav.
- 1887b. —, Res ligusticae II. Vermi parassiti in animali della Liguria, *ibid.*, Vol. 4, p. 483—501.
1890. —, Sopra alcuni elminti di Vertebrati Birmani raccolti da L. FEA, *ibid.*, Vol. 7, p. 765—780, 1 tav.
1894. —, L'elmintologia italiana. Da suoi primi tempi all' anno 1890, in: Atti Univ. Genova, Vol. 13, 733 p.
1896. —, Note intorno agli elminti del Museo zoologico di Torino, in: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, Vol. 11, 6 p.
1898. —, Elminti raccolti dal Dott. E. MODIGLIANI, alle Isole Mentawai, Engano e Sumatra, in: Ann. Mus. civ. Stor. nat. Genova (2), Vol. 19, p. 102—124.
1899. —, Catalogo di elminti raccolti in Vertebrati dell' Isola d'Elba dal Dott. G. DAMIANI, in: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Genova, No. 77.
1900. —, Di alcuni Elminti del Museo Nacional di Buenos Aires, in: Comunic. Mus. nat. Buenos Aires, Vol. 1, No. 6, p. 190—196.
- 1900a. —, Helminthum ex Conardi Paronae Museo — Cestodes, Genova.
1901. —, Di alcuni Cestodi brasiliani raccolti dal Dott. AD. LUTZ, in: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Genova, Vol. 102, 12 p.
1902. —, Catalogo di elminti raccolti in Vertebrati dell' Isola d'Elba, in: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Genova, No. 113, 2 p.
1903. —, Elminti, in: Osserv. sc. eseg. dur. la sped. pol. di S. A. R. LUIGI AMEDEO di Savoia, Duca d. Abruzzi 1899—1900, Milano 1903, 3 p.
1890. PASQUALE, A., Le tenie dei polli di Massaua, in: Giorn. intern. Sc. med. Napoli Ann. 12, 6 p., 1 tav.
1882. PERRONCITO, E., I parassiti dell' uomo e degli animali utili, 506 p., 233 fig., Milano.
1886. —, Trattato teorico, pratico sulle malattie piu comuni degli animali domestici, 434 p., 220 fig., Torino.
1869. PEYL, J., Zur Kenntnis des Schnepfenkothes, in: Lotos, Vol. 19, Prag, p. 96.
1882. PIANA, G. P., Di una nuova specie di Taenia del Gallo domestico e di un nuovo cisticerco etc., in: Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna (4),

- Vol. 2, p. 387—394, 1 tav. — Note prelim., in: Rend. Accad. Sc. Istit. Bologna 1880—1881, p. 84—85.
1860. POLONIO, A. F., *Novae helminthum species*, in: *Lotos*, Vol. 6, Prag, p. 21—23.
1860. —, *Catalogo dei Cefalocotilei Italiani e alcune osservazioni sul loro sviluppo*, in: *Atti Soc. ital. Sc. nat.*, Vol. 2, Milano.
1886. RAILLIET, A., *Éléments de zoologie médicale et agricole*, Paris.
- 1892a. —, *Sur un Taenia du pigeon domestique représentant une espèce nouvelle*, in: *CR. Soc. Biol. Paris* (9), Vol. 4, p. 49—53.
- 1892b. —, *Notices parasitologiques. T. tenuirostris RUD. chez l'oie domestique; remarques sur la classification des Cestodes parasites des oiseaux*, in: *Bull. Soc. zool. France*, Vol. 17, p. 110—117.
- 1892c. RAILLIET, A. et A. LUCET, *Sur le Davainea proglottina*, *ibid.*, Vol. 17, p. 105—106.
1893. RAILLIET, A., *Traité de zoologie médicale et agricole*.
1896. —, *Quelques rectifications de nomenclature des parasites*, in: *Rec. Méd. vét.* (8), Vol. 3, No. 5, p. 157—161.
- 1899a. —, *Sur la classification des Téniaidés*, in: *Ctrbl. Bakteriöl.*, Vol. 26, p. 32—34.
- 1899b. RAILLIET, A. et A. LUCET, *Sur l'identité du Dav. oligophora MAG. 1898 et du Dav. catataniana POLONIO 1860*, in: *Arch. Parasitol.*, Vol. 2, p. 144—146.
- 1899c. —, *Encore un mot sur le Davainea oligophora POLONIO*, *ibid.*, Vol. 2, p. 482.
1900. RANSOM, B. H., *A new Avian Cestode. Metroliasthes (n. g.) lucida (n. sp.)*, in: *Trans. Amer. microsc. Soc.*, Vol. 21, p. 213—226, 2 pl.
1902. —, *On Hymenolepis carioeca (MAG.) and H. megalops (NITZSCH) with remarks on the classification of the group*, in: *Studies zool. Lab. Lincoln Nebr.*, No. 47, p. 151—172, tab. 23—25.
1904. —, *Notes on the spiny-suckered tapeworms of Chickens (Dav. echinobothrida [= T. bothrioplites] and T. tetragona)*, in: *U. S. Dep. Agriculture, Bureau anim. Industry, Washington*, p. 55—69.
1905. —, *The tapeworms of american Chickens and Turkeys*, in: *21. Ann. Rep. Bureau anim. Industry* (1904), p. 268—285, mit 32 Fig.
1892. RICHARD, J., *Sur la présence d'un cysticercoïde chez un Calanide d'eau douce*, in: *Bull. Soc. zool. France*, Vol. 17, p. 17—18.
1881. RIVOLTA, S. e P. PRATO, *L'ornitoiatria, o la medicina degli uccelli domestici e semi-domestici*, Pisa.
1794. ROSA, V., *Lettere zoologiche, ossia osservazioni sopra diversi animali*, in: *Giorn. fis. med. Brugnattelli*, Vol. 4, p. 258—269, Pavia.

1890. ROSSETER, T. B., Cysticercoids parasitic in *Cypris cinerea*, in: Journ. microsc. nat. Sc., p. 241—247, tab. 16—17.
1891. —, Sur un cysticercoïde des Ostracodes capable de se développer dans l'intestin du canard, in: Bull. Soc. Biol. Paris, Vol. 16, p. 224—229.
1892. —, On a new *Cysticercus* and a new tapeworm, in: Journ. Queckett microsc. Club London, Vol. 4, No. 30, p. 361—366, 2 pl.
1893. —, On the *Cysticercus* of *T. microsoma* and a new *Cysticercus* from *Cyclops agilis*, *ibid.*, Vol. 5, No. 32, p. 179—182, 1 pl.
1894. —, On *Cysticercus quadricurvatus* Ross., *ibid.*, Vol. 5, No. 34, p. 338—343, tab. 17.
1900. —, The anatomy of *Dicranotaenia coronula*, *ibid.*, Vol. 7, No. 47, p. 355—370.
1903. —, On the anatomy of *Drepanidotaenia tenuirostris*, *ibid.*, Vol. 8, p. 399—406, 1 pl.
1904. —, The genital organs of *Taenia sinuosa*, *ibid.*, Vol. 9, p. 81—90, 1 pl.
- 1906a. —, On *Drepanidotaenia undulata* (KRABBE), *ibid.*, Vol. 9, p. 269 bis 274, 1 pl.
- 1906b. —, On a new tapeworm, *Drepanidotaenia sagitta*, *ibid.*, Vol. 9, p. 275—278, 1 pl.
1793. RUDOLPHI, K. A., *Observationes circa vermes intestinales*, Diss. In., Gryphiswald., 46 p.
1801. —, Beobachtungen über die Eingeweidewürmer, in: Arch. Zool. Zoot., Vol. 2, 1 St., p. 1—65, 2 St., p. 1—67; Vol. 3, 1 St., p. 61—125, mit Taf.
- 1808—1810. —, *Entozoorium sive vermium intestinalium historia naturalis*, Vol. 1, Amstel.
1814. —, Erster Nachtrag zu meiner Naturgeschichte der Eingeweidewürmer, in: Ges. naturf. Frde. Berlin; Magazin neuest. Entd. ges. Naturkde., Jg. 6, Berlin, p. 83—113.
1819. —, *Entozoorium Synopsis cui accedunt mantissa duplex et indices locupletissimi*, Berolini, 3 Taf.
1901. RÜTHER, R., *Davainea mutabilis*, Inaug.-Diss. Gießen, 20 p., 3 Taf.
1860. SCHLOTTHAUBER, Beiträge zur Helminthologie, in: Amtl. Ber. 31. Vers. Naturf. Aerzte (Göttingen) (1854) 1860, p. 121—133.
1831. SCHMALZ, È., 19 Tabulae anatomiam entozoorum illustrantes, Dresden.
1894. SCHMIDT, JOH. EM., Die Entwicklungsgeschichte und der anatomische Bau der *Taenia anatina* (KRABBE), in: Arch. Naturg., Jg. 60, p. 65—112, tab. 6 (Inaug.-Diss. Leipzig).

1788. v. SCHRANK-PAULA, Fr., Verzeichniss der bisher hinlänglich bekannten Eingeweidewürmer nebst einer Abhandlung über ihre Anverwandtschaften, München.
1790. —, Förtekning på några hittills obeskrifne Intestinal-Kräk, in: Svensk. Vetensk. Acad. nya Handl., Vol. 11.
1796. —, Helminthologische Beobachtungen, in: v. SCHRANK, Sammlung naturhistorischer und physikalischer Aufsätze, Nürnberg.
- 1798—1803. —, Fauna boica, durchgedachte Geschichte der in Bayern einheimischen und zahmen Thiere, Nürnberg, Vol. 3, Abth. 2, p. 229.
1825. SCHULTZE, TH. F. S., Ueber die Begattung der Bandwürmer, in: Ann. ges. Heilkunde, Vol. 2, p. 127—128.
1891. SCOTT, TH., Notes on a small collection of fresh-water Ostracoda from the Edinburgh district, in: Proc. phys. Soc. Edinburgh, p. 313.
1829. SCOLAR, J., Account of the Taenia found in the intestines of the common grouse (*Tetrao scoticus*), in: Edinburgh new phil. Journ., Vol. 20, p. 81—83.
- 1899a. SETTI, E., Una nuova Tenia nel cane (*T. brachysoma* n. sp.), in: Atti Soc. Ligust. Sc. nat. Geograf., Vol. 10, 10 p., 1 tav.
- 1899b. —, La pretesa Taenia mediocanellata dell' *Himantopus candidus* é invece la *T. variabilis*, in: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Genova, No. 69, 4 p.
1898. SHIPLEY, E. A., On *Drepanidotaenia hemignathi*, a new species of tapeworm, in: Quart. J. microsc. Sc. (N. S.), Vol. 40, p. 613—621, 1 pl.
- 1900a. —, Entozoa, in: Fauna Hawaiiensis, Vol. 2, Part 4, p. 427—441, tab. 13.
- 1900b. —, A description of the Entozoa collected by Dr. WILLEY during his sojourn in Western Pacific, in: WILLEY, Zool. Results, Part 5.
1902. —, On a collection of parasites from the Soudan, in: Arch. Parasitol., Vol. 6, p. 604—612, tab. 7.
1836. v. SIEBOLD, C. TH., Ueber die Spermatozoen der Crustaceen, Insecten, Gasteropoden und einiger anderer wirbelloser Thiere, in: Arch. Anat. Physiol., Jg. 1836, p. 15—53.
1837. —, Zur Entwicklungsgeschichte der Helminthen, in: K. F. BURDACH, Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft, Leipzig, Vol. 2, p. 183 bis 213.
1848. v. SIEBOLD, C. TH. u. STANNIUS, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie, Berlin, Vol. 1, p. 147.
1854. v. SIEBOLD, C. TH., Ueber die Band- und Blasenwürmer nebst einer Einleitung über die Entstehung der Eingeweidewürmer, Leipzig.
1896. SINITZINE, Würmer, Endoparasiten der Vögel aus der Umgebung von Warschau (russisch), in: Arb. zool. Inst. Universität Warschau.

1877. STEUDENER, F., Untersuchungen über den feineren Bau der Cestoden, in: Abh. naturf. Ges. Halle, Vol. 13, p. 277—316, 4 Taf.
1894. STILES, C. W. and AL. HASSALL, A preliminary catalogue of the parasites contained in the collections of U. S. Bureau of animal Industry, U. S. Army Medical Museum, Biol. Departement of the University of Pennsylvania (Coll. LEIDY) and in Coll. STILES and Coll. HASSALL, in: Veterin. Mag., p. 245—354.
1896. STILES, C. W., Report upon the present knowledge of the tape-worms of poultry, in: Bull. No. 12 Bureau of animal Industry U. S. Dep. of Agric. Washington, p. 1—79, tab. 1 à 21.
- 1889a. STOSSICH, M., Vermi parassiti in animali della Croazia, in: Soc. Hist. nat. Croatica Ann. 4, Agram, 8 p., 2 tav.
- 1889 et 1890. —, Brani di elmintologia tergestina, in: Boll. Soc. adriat. Sc. nat. Trieste, Vol. 11, 8 p., 2 tav.; Vol. 12, 9 p., 2 tav.
- 1890a. —, Elminti della Croazia, in: Soc. Hist. nat. Croatica Ann. 5, Agram, p. 129—136, 2 tav.
- 1890b et 1891. —, Elminti veneti raccolti dal Dr. A. P. NINNI I, II, in: Boll. Soc. adriat. Sc. nat. Trieste, Vol. 12, p. 49—56 et Vol. 13, 8 p., 1 tav.
1891. —, Nuova serie di elminti veneti raccolti del Dr. P. NINNI, in: Soc. Hist. nat. Croatica Ann. 6, Agram, 4 p., 1 tav.
- 1892a. —, Osservazioni elmintologiche, *ibid.*, Ann. 7, Agram, 2 tav.
- 1892b. —, Osservazioni elmintologiche, in: Boll. Soc. adriat. Sc. nat. Trieste, 1892.
1893. —, Note elmintologiche, *ibid.*, Vol. 14, 1 tav.
1895. —, Notizie elmintologiche, *ibid.*, Vol. 16.
1896. —, Ricerche elmintologiche, *ibid.*, Vol. 17.
1897. —, Note parasitologiche, *ibid.*, Vol. 18.
- 1899a. —, Saggio di una fauna elmintologica di Trieste e province contermini, in: Programma Scuola Reale sup. Trieste.
- 1899b. —, Appunti di Elmintologia, in: Boll. Soc. adriat. Sc. nat. Trieste, Vol. 19.
- 1900a. —, Contributo allo studio degli elminti, *ibid.*, Vol. 20.
- 1900b. —, Osservazioni elmintologiche, *ibid.*, Vol. 20, p. 98, Fig. 2.
1905. SZYMANSKI, M., Ein Beitrag zur Helminthologie, polnisch, 3 p., deutsches Resumé, in: Bull. Acad. Sc. Cracovie, p. 733—734, 1 Taf.
1899. TAROZZI, G., A proposito di un caso di *Taenia mediocanellata* in un *Himantopus candidus*, in: Avicula, Anno 2, p. 74—75.
1795. VIBORG, E., in: Nachricht von der Einrichtung der Königl. Dänischen Thierarzneischule, Vol. 1, Copenhagen 1795.
1875. VILLOT, E., Recherches sur les helminthes libres ou parasites des côtes de la Bretagne, in: Arch. Zool. expér., Vol. 4, p. 451 bis 482, 4 pl.; CR. Acad. Sc. Paris, Vol. 80, p. 679—681, 1090 bis 1101.

1899. VOLZ, W., Die Cestoden der einheimischen Corviden, in: Zool. Anz., Vol. 22, p. 265—268.
1900. —, Beitrag zur Kenntniss einiger Vogelcestoden, Inaug.-Diss. Basel, in: Arch. Naturg., Jg. 1900, 62 p., 3 Taf., 4 Textfig.
1854. WAGENER, G. R., Die Entwicklung der Cestoden, in: Verh. Leop.-Carol. Akad., Vol. 24, Suppl.
1898. WARD, H. B., The parasitic worms of domesticated birds, in: Stud. zool. Lab. Lincoln Nebr. (Feb.), 18 p.
1901. —, Internal parasites of Nebraska Birds, in: Proc. Nebraska Ornithol. Union, p. 63—70.
1856. WEDL. C., Charakteristik mehrerer grösstenteils neuer Taenien, in: SB. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Cl., Vol. 18, p. 5—27, 3 Taf.
1858. WEINLAND, F., An essay of the tapeworms of man, Cambridge U. S. 1858, 103 p.
1859. —, Observations on a new genus of Taenoids, in: Proc. Boston Soc. nat. Hist., Vol. 6, 1856—1859, p. 59—63.
1861. —, Beschreibung zweier neuer Taenioiden aus dem Menschen; Versuch einer Systematik der Taenien überhaupt, in: Nov. Act. Leop. Carol. Akad., Vol. 28.
1782. WERNER, P. C. F., Vermium intestinalium praesertim Taeniae humanae brevis expositio, Lipsiae.
1821. WESTRUMB, A. H. L., De Helminthibus acanthocephalis, Hanovrae.
- 1898a. WOLFFHÜGEL, K., Vorläufige Mitteilung über die Anatomie von *T. polymorpha* RUD., in: Zool. Anz., Vol. 21, p. 211—213.
- 1898b. —, *Taenia malleus* GOEZE, Repraesentant einer eigenen Cestodenfamilie Fimbriariidae. Vorl. Mitteilung, *ibid.*, Vol. 21, p. 388—389.
- 1899a. —, Beitrag zur Kenntnis der Anatomie einiger Vogelcestoden, *ibid.*, Vol. 22, p. 117—123.
- 1899b. —, Rechtfertigung gegenüber COHN's Publikation „Zur Systematik der Vogeltaenien II“, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 26, p. 632—635.
- 1900a. —, Beitrag zur Kenntnis der Vogelhelminthen, Inaug.-Diss. Basel, 204 p., 7 Taf.
- 1900b. —, *Drepanidotaenia lanceolata* BLOCH, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 28, p. 49—56, 6 Fig.
1904. —, Ein interessantes Exemplar des Taubenbandwurmes *Bertia Delafondi* (RAILLIET), in: Berlin. tierärztl. Wochenschr., Jg. 1904, No. 3.
1800. ZEDER, J. G. H., Erster Nachtrag zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer von J. A. E. GOEZE, Leipzig, 6 Taf.
1803. —, Anleitung zur Naturgeschichte der Eingeweidewürmer, Bamberg, 4 Taf.
- 1888a. ZSCHOKKE, F., Ein Beitrag zur Kenntniss der Vogeltaenien, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 3, p. 2—6 u. 41—66, 3 Fig.
- 1888b. —, Recherches sur la structure anatomique et histologique des Cestodes, Genève.

1902. ZSCHOKKE, F., *Hymenolepis (Drepanidotaenia) lanceolata* BLOCH als Schmarotzer im Menschen, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 31, p. 331 bis 335.
1903. —, Die arktischen Cestoden, in: Fauna Arctica, Vol. 3, p. 20—24.
1904. —, Die Darmcestoden der amerikanischen Beuteltiere, in: Ctrbl. Bakteriolog., Vol. 36, p. 57—59.
1882. ZÜRN, Die Krankheiten des Hausgeflügels, Weimar 1882, 237 p., 76 Fig.

Berichtigungen.

- Seite 29, Zeile 21 statt *Hymenolepis*: *Hymenolepis*.
- Seite 38, Zeile 18 statt Coraciiformes: Pici.
- Seite 41, Zeile 21 statt Passeriformes: Coraciiformes.
- Seite 41, Zeile 8 von unten statt *lucaxii*: *lucaxei*.
- Seite 43, Zeile 15 von unten statt *clava*: *calva*.
- Seite 44, Zeile 20 statt CLERC 1906b: FUHRMANN 1908c.
- Seite 52, Zeile 9 zu streichen.
- Seite 55, Zeile 22: in Coraciiformes sind die Pici mit inbegriffen.
- Seite 56, Zeile 2 zu streichen.
- Seite 57, Zeile 18 *A. micracantha* zu streichen und auf S. 58 nach Zeile 6 einfügen.
- Seite 57, Zeile 21 u. 22 statt *macrocanthoides* und *macrocantha*: *macracanthoides* und *macraecantha*.
- Seite 58, Zeile 7 von unten statt *ubricae*: *urbicae*.
- Seite 59, Zeile 7 statt *ovalacincata*: *ovalaciniata*.
- Seite 59, Zeile 11 von unten statt Coraciiformes: Pici.
- Seite 60, Zeile 1 von unten statt (RUD.): (RAILL.).
- Seite 61, Zeile 4 statt Coraciiformes: Pici.
- Seite 66, Zeile 4 zu streichen.
- Seite 67, Zeile 10 statt Accipitres: Strigiformes.
- Seite 74, Zeile 11 zu streichen.
- Seite 74, Zeile 21 zwischen Zeile 14 und 15 einzuschieben.
- Seite 77, Zeile 2 statt *sinuora*: *sinuosa*.
- Seite 77, Zeile 18 statt LINSTOW: LINTON.
- Seite 78, zwischen Zeile 8 und 9 einschieben: *Hymenolepis clausa* v. LINSTOW 1906.
- Seite 79, Zeile 13 von unten statt *glandorii*: *glandarii*.
- Seite 80, Zeile 6 statt *dahmica*: *dahurica*.
- Seite 80, Zeile 14 statt *trichodroma*: *tichodroma*.
- Seite 93, Zeile 5 statt *tetrabothroides*: *tetrabothrioides*.
- Seite 95 zwischen Zeile 2 und 3 einfügen: *Taenia flavescens* KREFFT 1873.
- Seite 96, Zeile 2 statt *cayanae*: *cayanae*.
- Seite 96, Zeile 16 statt *coracina*: *caracina*.
- Seite 107, Zeile 13 zu streichen.
- Seite 169, Zeile 9 und Seite 170, Zeile 10 statt *Choanotaenia*: *Anomotaenia*.